The background of the image is a traditional marbled paper pattern. It features a complex, organic design with swirling, feather-like shapes in a rich palette of red, blue, yellow, and green, all set against a light cream or off-white base. The pattern is dense and covers the entire surface except for a central rectangular area. This central area is a plain, off-white paper label that serves as a backdrop for the text.

DEBACQ LIBRARY



A. xvii. a
17180 | A | 3.

3




A. T. O. R. N. C. T. D. U. S.

EX LIBRIS A. T. O. R. N. C. T. D. U. S.



A. CORN. CELSUS.
EX ICONIBUS A SAMBUCO EDITIS





Small, faint, illegible text or signature in the bottom right corner.

AUR. CORN.

CELSI

DE

MEDICINA

LIBRI OCTO

Brevioribus ROB. CONSTANTINI,
IS. CASAUBONI ALIORUM ^{que}
Scholiis ac locis parallelis illustrati.

Cura & Studio

TIL. J. AB ALMELOVEEN.

M. D. ET PROFESSORIS.

Editio ultima, auctior & correctior.



Lib.

L. J. v. d. m.

AMSTELÆDAMI,

Apud JOANNEM WOLTERS. 1713.





VIRIS CELEBERRIMIS,

PETRO PETITO

E T

MATTH. SLADO

ILLI GALLORUM, HUIC
BATAVORUM MEDICORUM
PRINCIPIBUS,

THEOD. JANS. AB ALMELOVEEN

S. D.



Ntiquioris Medicinæ
parentes nobilissimos
licet, atque ob elegan-
* 3 ter

DEDICATIO.

ter fidelissimeque tradita præcepta summopere necessarios, à plurimis nostri seculi hominibus non modo negligi & contemni, verum etiam acerrimis proscindi dicteriis, usque adeo percrebruit, Viri Præstantissimi, ut hospes in literis, in Arte quoque nostra plane peregrinus sit oporteat, qui tam nota atque vulgaria se nescire fateatur. Nec tantum illi, verum etiam (en quo tandem pigrities desidiaque homines perduxit?) illorum cultores vel maximo odio, imo ludibrio habentur. Quod cum animadvertissem, quorum nominibus scriptorem hunc, quem

DEDICATIO.

quem ob innumera translata loca, non immerito quidam Latinum appellare solent Hippocratem, de novo nostra cura prodeuntem, inscribi gratum esset, non ita diu quærere debui, siquidem non alios nisi Vos, Viri eruditionis fama, multisque ac magnis in universam literarum rempublicam meritis celeberrimi, operis hujus patronos certissimos antiquissimosque potui eligere, quos ne Celsus ipse quidem, si in vitam ei daretur reditus, scriptorum suorum censores recusaret. Nunc itaque nihil mihi restat, quam ut obnixè Vos rogem, ut me

DEDICATIO.

in amicitiam Vestram recipere, hancque inscriptionem, tamquam benevolentiae observantiaeque erga Vos meae, qualecunque documentum admittere dignemini. Valete. Dabam Trajecti ad Rhenum a. d. xv. Kal. Febr. clo Id cxxcviij.

THOED.

THEOD. J. AB ALMELOVEEN
LECTORI
BENEVOLO

S. D.



*Ultos non modo proximi, verum
etiam hujus seculi eruditione at-
que fama praestantissimos viros
operam in emendandis atque illu-
strandis A. C. CELSI de Me-*

*dicina libris, non vulgarem posuisse, qui igno-
rat, nae scriptorem illum ignoret necesse est.*

*Quis enim est, qui vel primis labris Medici-
nam gustasse praeseferat, quem Casarii, Pan-
tini, Constantini nomen fugiat? quis Jeremiam
Threverium, quis Balduinum Ronssseum de
fama non noverit? quis de Fodoco Lommio,
Petro Pavio nil audivisse se ausit profiteri?
quis denique, quid Joannes Antonid. van der
Linden praestiterit non observarit? quorum
Virorum exemplis, quibus duci solemus, inci-
tatus incredibile quanto legendi, relegendique
flagrauerim desiderio? quod repetita aliquoties
lectione non leviter accrevit, adeo ut notare qua-*

P R Æ F A T I O

dam ab aliis prætermiffa, & hunc Autorem cum aliis conferre fcriptoribus fubinde cœperim, quod cum vidiffent Celfi noſtri cultores diligentiffimi, opera pretium me facturum exiſtimarunt, ſi cum orbe literato hunc noſtrum communicarem laborem, promiſſiſque abhinc fere anno datis ſatisfacerem. Quod cum altius in animum deſcendiſſet meum, protinus iſtis expoliendis mæmet applicui. Veruntamen quum variarum lectionum numerum in majorum molem excurrere viderem, editionem vero formæ commodioris, & ſi ita loqui liceat, portatilis deſiderari, conſilium mutavi, ſatis habens loca duntaxat ſive noſtri auctoris, ſive alterius medici, parallela indicare, ſcriptoris noſtri ſententiam quæ aut illuſtrarent aut confirmarent. Editioni autem huic rerum atque verborum indicem, quem in omnibus aliis deſiderari ſciebam editionibus adjicimus, de induſtria, ne nimiam in molem aſſurgeret nunquam è manibus deponendum hoc *Medicine* ἐγχειρίδιον, aliquanto contractiorem; quod præ manibus nobis ſit, ejuſmodi lexicon, quale una cum notis eruditiffimis in Celfum à viro fama ſuper æthera

ad LECTOREM.

thera noto, Joanne Rhodio confectum, incendio tristissimo absumptum summo opere dolemus, alii editioni subnectendum. Subjunximus, quæ loca difficiliora explicant R. Constantini annotationes selectas ex exemplari, alias rarissimo, è Cl. Grævii Bibliotheca deprompto. Scholia eruditorum facile principis Isaaci Casauboni, margini codicis quo fuerat usus, festinantissime illita, quæ ex τὸ πάλιν Isaaci Vossii Gazophylacio secum attulit Gothofredus Thomasius, ὁ χαρίεστος, pro amicitia atque necessitudine, quæ inter nos intercedit non vulgaris, quam benignissime mecum communicavit; quæ licet breviora, numero pauciora, minimeque publica luci ab Autore adaptata, ob religionem tamen, quæ summa eam colo, suppressere non potui aut minus grata fore putavi. Quid vero ipsi præstiterimus lectione ipsa consequetur H. Lector, quem duo monitum velimus, numerum margini impressum loci paralleli paginam versumque indicare, alterum in notulis, ubi citati libri sæpenumero auctoris reticetur nomen, Hippocratis debere intelligi.

CLA-

CLARISSIMO VIRO,
DOMINO
GUIDONI PATINO
BELLOVACO,
DOCTORI MEDICO PARISIENSI,
ET PROFESSORI REGIO,
AMICO SUO MAGNO
SALUTEM.

CLARISSIME VIR,



ICERONIS ista gloriatio est: *Latinos omnia invenisse melius, quam Græcos; aut ab illis accepta fecisse meliora.* Augusta profecto, & magno viro magnarumque rerum fiduciam habente digna! Quam & veram minimeque vanam apprehendit, quisquis à Romanis posteritati tradita comparat cum Græcis. Ne longum abeam, Oratorum quidem laus ita ducta fuit ab humili ad summum: fuere & Philosophiæ studia sic ad Latinos traducta, ut ne bibliothecis quidem Græcis egerint. Neque vulgare est, quod de nostra arte Celsus promeruit. Quam enim ab Hippocrate, ab Asclepiade, ab aliis Græcorum plurimis accepit scribendi de Medicina materiam, hoc ipso fecit meliorem, quod primus eam sic conceperit, ut esset ad discendum aptior, ad faciendum promptior. Græcorum antea nemini, quod sciam, id laudis datum, quod artem redegerit in systema, & corpus methodo consti-

tutum. Celsus præstitit, & res faciendæ medicinæ utiles ac solum necessarias ita ingeniose ac diligenter ex antiquis elegit, ita per partes digestis, hasque ipsas innexuit inter se, ut vel Recentiores inter non noverim, quem ipsi jure possis antepone. Neque ad eam laudem refert, sermone tantum, an etiam opere fuerit medicus. Si enim coire ista semper necesse est, quotusquisque hodie medicus est? Cathedrarios quippe videas medicinæ scientiam plerumque subtilius, quam ex usu, excolere, atque hoc per ambitionem, quam vocant veri scrutationem, agere, ut ingenio & facundia vincant. Contra, qui quæstui serviunt, bene gnari, morbos non eloquentia, sed remediis curari, ut populo placeant, ex quo ille major est, sufficere credunt secreta jactare & his curatorum longas ostentare tabellas. Hippocrates certe pro Medicis habet, qui veram artis sibi cognitionem compararunt: sed transferre ad usum suadet, & fructum eorum, quorum gratia est inventa. Saperene putandus est, qui lucernam accendit, & subter modium ponit? Sapit, & bene de se ac proximo meretur, qui accensam imponit candelabro, ut alluceat omnibus qui sunt in domo. Cæterum hoc dubitare de Celso docti solent, fueritne in operibus Artis exercitatus. Quo de quia meam aliquando sententiam rogasti, dicam paucis. Magnum quid medendi scientia est: majus, prudentia atque sapientia. illa quippe scientiæ oculus; hæc manus est. Absque prudentia si est, neque tempora lustrare Medicus rei bene gerendæ, neque præcipites captare occasiones potest. Absque sapientia si est, tractare homines ignorat, & suo quemque calopodio calceare. Uti vero scientia nisi discendo, hoc
est,

est, legendo, audiendo, cogitando; ita prudentia & sapientia, nisi faciendo & rebus se gerendis accommodando, non comparantur. Ex artis scientia Celsus si venit æstimandus, vix persuaderi potest, ut is non habeatur pro Medico, & quidem usu longo atque exercitatione perfectio, qui suis scriptis Medicinæ intima penetralia subiisse, abdita quæque enucleasse, penitus abstrusa rimatum esse, suam ubique de iis sententiam interponendo se prodit. Quod esse iudicium novisti ejus, qui præfatus olim ad Rubrum fuit. Probum mihi, & ex toto probatum. Si, quæ in nullius non morbi curatione elucet, prudentiam atque sapientiam spectemus, ubi, te quæso, unum Hippocratem si excipias, utriusque aut salubriora præcepta, aut fideliora monita reperisti? Quæ si numquam noster venit in rem, quemadmodum fuit affectus? Putasne secreta atque arcana artis, hoc est intimas & occultas ad salutem cuiusque pertinentes rationes scire posse eum, qui in conclave numquam penetravit? Quæ sola felicitis ingenii magnitudine complexum, & ob id alieni operis interpretem atque Hippocratis ejusque sectatorum discipulum, & exscriptorem habendum esse potius, quam medicinæ aliquem auctorem, iudicium est viri egregie eruditi. Cui per me subscribere, quibus libet, licet. nam à me non impetro. Si rectum tamen, heu! quantos auctores amissimus! Ex toto quippe Galeni oceano, si dicere per invidiam fas est, non tot interiora medendi consilia quis hauserit, quam ex ubere hoc Cornelli rivo Fateor, plus est in Galeno florum, ut & toliorum: sed fructuum plus in Celfo est. Taceo multis locis sic illum loqui, ut, se tecisse medicinam, liquido satis demonstrat: nullo sic, ut con-

Contrarium inde queat liquere. Solum obstare videtur, quod Plinius sua ætate, hoc est centum & viginti præter propter annis post, solam hanc artium Græcarum nondum exercuisse scribit Romanam gravitatem, & in tanto fructu paucissimos Quiritium attigisse, eosque ipsos statim ad Græcos transfugisse; imo vero auctoritatem aliter quam Græce eam tractantibus, etiam apud imperitos expertesque linguæ, non fuisse. Si ex vero ista, sicuti causam non credendi non habemus oculato testi, qui credimus Celsum, ex gente Cornelia, omnium Romæ nobilissima, oriundum, tactitasse artem, populus quam expertus damnavit? Non hoc ulli volo persuasum, fuisse *ἐν τῶν περιόδουτῶν*, quos vocat Modestinus l. 6. §. 1. ff. de Excusationibus; atque adeo solitum *ἀπὸ τῶν πόλιν φοιτᾶν*; & ægros visitatum circuire mercedis causa. M. Catonem meminit idem Secundus professum, esse commentarium sibi, quo mederetur filio, servis, familiaribus. Nec alia ratione medicinam exercuisse Cornelium puto; nec apud alios, nisi forte quod non-nemini video placere, in gravioribus casibus sit passus se adiri, & eam rogari operam, quæ virum nobilem non dedeceret. Verbo: talem opinor fuisse Medicum, qualis Cato fuit, aut quales sunt hodieque Regum archiatri. Qui, etiam non omnibus vigilant, miserabilibus tamen personis & ad se, ceu Æsculapium aliquem, confugientibus suam negare opem non sustinent; scientes, nulla re hominem magis accedere ad Deum, quam salutem hominibus dando. Præter hæc quæ aut elici in eandem sententiam, aut objici possunt, tam sunt ab aliis vel occupata vel refutata: ut necesse non sit illis repetendis vel tempus prodigere, vel doctas tuas aures & gravioribus intentas

* *

curis

curis obtundere. Hoc unum dicam, qualis qualis
noster fuerit, dignissimus est, vel doctrinæ cultu,
vel elegantiae nitore, non solum qui legatur, sed
qui numquam de manibus deponatur. Me, fateor,
nullius post Hippocratem lectione vel affici magis
vel erudiri. Quo factum, ut & sæpius relegerim,
& numquam sine voto, existeret aliquis, qui aut
daret eum nobis quam emendatissimum, aut
emendandi materiam suppeditaret. Quam tuo
tandem beneficio consecutus nobilem & locupletem,
statim operi admovi manum; quo & meæ
satisfacerem cupiditati, & expectationi eorum,
apud quos nulla non occasione & laudare Cornelium nostrum, & serio commendare sum solitus.
Quam autem feliciter mihi res sub manu successerit, te velim vel in primis judicare. Nam hæc
inter plurimas mihi causa est, quod Celsum
istum, quem meum imagine quadam adoptionis
feci, celeberrimo tuo nomini, & multis mihi nominibus suspiciendo colendoque consecrarim. In
seculi quippe hujus & tam antiquitatis fastidiosi,
quam novitatis omnis cupidi, conspectum proditurientem, nec sine patrono ausum, cujus in
clientelam potius, quam tuam debui dare? Absque
illis certe subsidiis, quæ mihi numquam sine
summa laude loquendum studium tuum juvandi
publicum tulit, si fuisset, vel animum non applicuissem ad recognitionem Authoris ut eruditissimi,
ita & corruptissimi. Quis credat, post Egnatii,
Cæsarii, Constantini, Stephani, Pantini,
Ronssei, Rubei, tot illustrium virorum diligentissimas
curas, fuisse mihi plusquam bis mille locis
corrigendum? Quo ipso quia fecisse me opus putabam
non poenitendum, aut tuo nomine & seculo
indignum, etiam hoc ausus sum illi inscribere.
quamvis non ignorem multo plura majora-

quæ

que me debere amorì & beneficiis in me tuis. Itaque te rogo, Vir Clarissime, hanc cautionem accipere crediti, & animi ad omnem se gratitudinis memoriam obligantis. Certe hunc, quem eo vultu, quo omnes literatos soles amplecti, fuscipendum tibi offero, si non industriæ, saltem laboris mei foetum, testem esse volo, quanti & sim & in perpetuum tibi sim futurus debitor. Deus autem immortalis diu te fospitem atque incolumem Rei medicæ, literariæ, publicæ, imo mihi & omnibus bonis conservet. Dabam Lugduni-Batav. Mense Augusto, anni cIoIoCLVII.

*Tui nominis atque dignitatis
cultor propensissimus*

J OH. ANTONIDES
VAN DER LINDEN.

★★

LE-

LECTORI S.



ISTO tibi, amice Lector, A.
CORN. CELSUM, authorem
latinissimum, medicum sapientissi-
mum, prudentissimumque. Cujus
ego amorem tibi si velim commen-
dare, idem fecero, quod hederam qui suspendit
vino veteri & bono. Quemadmodum namque vir-
tutem non potest non amare ac sequi quisquis ejus
pulchritudinem atque pretium novit: ita Celsum
nemo non aestimat, nemo non diurna versare ma-
nu, versare nocturna studet, quin in succum &
sanguinem, quod aiunt, convertere, nisi qui igno-
rat, quanto nitore atque cultu, quanta industria
atque solertia istos de Re medica libros octo (solos
nobis ex pluribus eisque eruditissimis ingenii ac
vigiliarum egregie elaboratarum monumentis
reliquos) scripserit, atque ex Hippocrate cumpri-
mis, medicinae parente, contraxerit, adhibitis
in omni graviore negotio etiam in consilium
aliis, & semper quidem optimis authoribus.
Quales omnino necesse est fuisse, si sola confusus
ingenii magnitudine, nulla artis exercitatione
comparata notitia, tam admirandum nobis
opus concinnare est aggressus. Quod me non cre-
dere, jam supra dixi. Scepticos in scribendo se-
quu-

quantum, author est Quintilianus. Quod si de sermonis ornatu intellexit, concedi potest: non facile, si de modo doctrinae. Ita enim scripsit, ut qui neutiquam dubitavit, non suam modo sententiam aperte profiteri, sed & summorum quoque virorum ad incudem cum rationis tum experientiae revocare; quia & necessaria ac laudanda in artibus libertate mutare praecepta eorum, qui medendo scribendoque se ostendebant aberrare, non tam à placitis & à doctrina majorum, quam ab officio medici. quod Asclepiades esse dicebat, referente nostro, ut tuto, ut celeriter, ut jucunde curet. Ubique autem ea usus est modestia Celsus, ut, etsi numquam tanti putaret authorem, quanti hominum salutem, neminem sua tamen laude fraudaret. Quamquam vero jam ipsius aetate medicina esset in tres sectas, easque plurimum inter se dissentientes, diducta; ita tamen Dogmatica (quae minime omnium deflecebat ab Hippocratica) se applicuit adhæsitque, ut nihilominus etiam ab Empirica atque Methodica principibus acceperit, quae rationalis conjectura atque fidelis usus comprobassent: dignus vel ipso proposito, ut eum penetrasse cujusvis sectae omnia, atque delectu habito, in hanc velut multorum operum epitomen congeßisse meliora quaeque, credamus. For-

ma operis, supra quam nostrum putat vulgus, ornata est, & ordinata. Sermo toto in opere plenus, purus, venustus, castus, & quod præcipuum est, accommodus rei tradendæ; adeo ut in medicina quidem nemo uti meliore scribendi magistro queat. Ordo, quam in toto dilucidus, in partibus articulatus, tam est in utrisque appositus ad usum. Quem ut solum Celsus spectavit, ita nihil eo non pertinens, non necessarium attulit: quin, resectis omnibus, non dicam superfluis, sed quæ aliunde & possunt & revera debent accipi, eam solummodo Medicinæ partem persecutus est, in qua proprie & principaliter ars consistit. Quo de dicerem plura, nisi te discere hoc ex ipso auctore malletm. Ego certe, propter quæ dixi, illud mihi semper habui familiarem, & dignum, in quo non solum versando studii, sed & emendando operæ plurimum, atque laboris ponerem. Itaque acquisitis in eam rem necessariis, quæ quidem potui, hoc in præsentia egi, ut textum exhiberem quam maxime emendatum. Feci id adjutus iis subsidiis, quorum mox catalogum exhibebo. Quantum fecerim, non aliunde rectius cognoscēs, quam si conferre editionem hanc cum omnibus velis, quæ prodierunt hætenus. Præter quæ
dixi.

dixi, sæpe mihi fuit Hippocrates adeundus. Quem quanti noster fecerit, non tam ex ore ipsius, quam opere disces. quod, quia omnibus paginis quamplura exinde transsumta continet, auctori meruit nomen Hippocratis Latini. Quæ causa mihi curatius utrumque conferendi, & colligendi quoque, quæ Fœsius in doctissimis suis ad Hippocratem notationibus pridem observavit. Quædam, sed admodum pauca, ex ingenio tentavi, & nisi cum res aperte postularet. In cæteris, ubi mei mihi libri & ingeniosæ summorum virorum conjecturæ non prælucebant, malui errorem retinere, aut locum in suspitione saltem relinquere. Quod & eo securius mihi licere putavi, quia Cl. D. Johannem Rhodium, virum inter seculi & nostræ artis primos, à multis annis ex multo plurimis cum membranarum libris emaculatissimum & quem ab Authore habuit, nitore haut dubie restitutum ac luculentissimis commentariis illustratum, penes se servare scio. Quem & rogo (si quid veteris se amicitie memoria patitur rogari) ut ne diutius protollat expectationem atque desiderium eorum, qui & Celsum & Rhodium in pretio & amore magno suo merito habent. Glossmata offendi plura: nullum tamen,

præter forte unum, quod nimio erat ἀποσ-
διόνυστον ausus sum de medio tollere, quia nul-
lum huc præeuntem habebam librum. Libro-
rum in capita distinctiones uti ab ipso autho-
re esse certum est ex VI. 12. & VIII. 9.
in fine: ita lemmata illis adscripta esse à li-
brariis, & è margine in titulos transsumpta,
ne locus quidem dubitandi est. unde & ali-
quid licere mihi in istis putavi. quin, si forma
operis siviisset, redire eo, unde venerant au-
thoris injussu, jussissem. Præter hæc animus
erat, notas addere, & quasdam nostras in
authorem observationes: sed, præter quam
modo retuli, causa alia fuit libri forma.
Quam & ego & typographus εὐπεριανόμιστον
in præsens malebamus: ille, lucri gratia; ego,
authoris. Quem mihi spes est reperturum
tanto plures emtores lectoresque, quanto est edi-
tio ista cæteris emendatior, & elegantior at-
que aptior ad circumferendum. Vale, & tuus
mihi favor sit stimulo ad tuum in commodum
majora melioraque conandum.

AUR.

AURELII CORNELII CELSI

V I T A

à

Clarissimo Viro

JOANNE RHODIO

Conscripta.

CORNELII CELSI laudabilem
in Re Medica operam annis jam
mille sexcentis, & quod superat, Ex-
perientia, veritatis prima parens, feli-
citer probavit. Nec melioris animi
quisquam ita ab omni humanitate re-
motus fuit, cui non venerandum tam
illustre nomen. At ingenio magis, quam
origine notum, quam, relictâ soli ani-
mo gloriâ, temporis diuturnitas poste-
ritatis memoriæ exemit. Quamvis e-
nim Romæ vixisse Celsum, ipsius, si-
ve ut aliis visum, Scribonii Largi ad J.
Callistum Epistola indicio sit: non de-
sunt tamen causæ, cur addubitem, pa-
triâ, an jure civitatis ipsum Romanis

AUR. CORN. CELSI VITA.

accenseam. Maximeque, quum præter hunc, quidam Julius Celsus Hadriano Imperatori à Consiliis, vel ex aliorum sententia, Alexandri Severi temporibus, Juris scientiâ perhibeatur claruisse. Vid. Spartianum in Hadr. 30. & Pompon. Jc. lib. 2. in fin. de Orig. Jur. & Politianum lib. 5. Epist. ad Jac. Modestum. Equidem Celsum Patrem ac Filium Jureconsultis annnumerat Hottomannus in Descriptione Jurisconsultorum, & Juventium Celsum Patrem ad Vespasiani Imperatoris tempora refert Jacob. Gothofred. Histor. Jur. Civil. cap. 7. de Jurisconsultorum successione. Idem Celsum Patrem & Filium sub Trajano, Hadriano, Antonino Pio vixisse censet. Verùm & Apulejus Celsus Valentis ac Scribonii Largi in Medicis Magister occurrit apud Scribonium Largum de Compos. Med. cap. 94. & 171. Cujus præter Agricola Woverius in Apulei Vita mentionem injecit. Nisi fortè cum Cornario in Marc. Empirici Præfat. interposito inciso, Apulejo, Celso, distinctè legendum fuerit. Ita in præfat. Marcell. & Apulejus
& Cel-

AUR. CORN. CELSI VITA.

& Celsus occurrunt. Volaterranus etiam meminit in Anthropologia lib. 14. Celsi cujusdam, qui Philosophiæ Stoicæ sectator, Origenis erat adversarius, magiæ scientiâ notus, cui Lucianus Pseudo-Mantem inscripsit. Ejusdem quoque nominis ibidem, imperante Nerone è Galliis puer novennis martyrio nobilitatus. Numo etiam innouit apud Augustin. Dialogo 5. de Num. Celsus quidam III. Vir. Noster autem Augusti ævo floruit, ex quorundam sententia, inter quos Jo. Britannic. in Juvenal. Sat. 6. & 7. Ovidii autoritate, vel ut Jo. Cajo placuit, Cl. Tiberii, A. C. 29; aut certè Caji Imp. conjecturâ Sambuci, Viri Antiquitatis notitiâ clarissimi. Major tamen eruditorum pars sub Tiberio vixisse, vel fortè ipso imperante natum usque ad Trajani tempora vitam produxisse censet; quamvis & sub Nerone vixisse putet Thom. Fienus. Ut uno seculo vetustior Galeno videatur. Cæterum, non levem hic de Patria ejus dubitandi occasionem præbet Cæl. Rhodiginus, qui Antiq. Lect. Lib. 14. cap. 5. Veronen-

AUR. CORN. CELSI VITA.

nenfes, ait, cum Macrobio, Vitruvio, & Plinio, Celsum quoque suum ortu civem agnoscere. Librorum inscriptionibus hujusmodi divinationes stabiliri assolent. Sed exigui momenti munimento. Notius enim est, quam ut pluribus confirmetur, Librorum titulos Literatoribus & Librariis arbitrarios fuisse, vixque veterum quempiam ulli suorum Commentariorum quidquam prænotasse, referente de semet ipsum Galeno lib. 7. Meth. Med. cap. 1. qui id officii ab Amicis habuit: haud dubiè istius ævi modestiâ, quod ingenia admiratione superiora protulit. Sed enim, ut mala exempla ex bonis initiis orta: Ita ex æmula, in conqui- rendis magnorum ingeniorum monu- mentis, Principum munificentia, ac- crescente paulatim Librariorum avari- tiâ, omnes propè optimorum etiam Au- torum præscriptiones impunè, ad lucro- sam cujusque libidinem, immutatæ, ne dicam adulteratæ.

Atque ut ad Celsum redeam; quot- ejus hodie Editiones, tot fermè In- scriptiones diversæ. Cæsarii habet,

An-

AUR. CORN. CELSI VITA.

Aurelii Cornelii Celsi de Re Medica VIII. Libri eruditissimi. Vulgatæ Lugdunenses omnes, & Leydenſis modestius ſine phalerato encomio A. C. C. D. M. L. VIII. Horum priorem Cajus ſic mutavit: *Aurelii Cornelii Celsi Romani de Re Medica Libb. VIII.* pereruditi. H. Stephanus in ſuo exemplari cæteris Medicinæ Principibus adjecto receptæ lectioni ſubdidit; Operis ab eo ſcripti Pars Sexta. Vett. Codicum MS. autoritatem ſecutus, quibus communis hæc inſcriptio: *A. Cornelii Celsi Artium Liber VI.* Nihil tamen hic præter conſilium & rem ab illo temerè factum. Patriam enim ſive Autor ipſe ſive alius quiſpiam addiderit, id certè non caret vetuſtatis exemplo, potiſſimum apud Græcos, quos inter Celfus ſibi *Hippocratem Comm* inprimis imitandum propoſuit, cujus etiam pleraque non infeliciter Latino ſermone reddidit, ſuam ipſe teſtatus in Epift. ad Pullum Natalem, in hoc ſtudiorum genere diligentiam, longè accuratiorẽ, quam Largii designationi, qui Epistolâ ad filios ſe fuiſſe liberiorẽ fateatur, quemadmodum notante Cornario

AUR. CORN. CELSI VITA.

rio in Dedic. Marcelli , in plerisque Hippocratem expressit, ut integras sententiarum periodos ex ipso descriptas subinde in eo videas; imò tota capita nihil aliud quam Hippocratis sententias ad verbum reddunt. Hinc non immeritò Hippocratis Simiam dixit Nic. Monardus , de V. S. in Pleurit. f. 8. Etsi verò Latini Scriptores Patriam haut usque jactabant: neutiquam tamen diffitendum , antiquitus Romanæ civitatis jus gloriosum fuisse. Quo fortè venditores Autorem nostrum commendare satagebant ; sive is meritis & gratiâ civium numero adscriptus esset ; sive Româ oriundus. Posterius tamen ut credam, suadet præter apertum Autoris lib. 5. cap. 21. textum, Epistola ejusden ad Callistum , & persuadet ad Pullum Natalem altera ; in quibus inprimis Viri boni genius conspicitur. Imo Marcellus in Præf. Operis Cornelium Celsum inter viros illustres & cives enumerat , quicquid ei imposuerit Verderius Cens. p. 144. Ejus Columella , Claudii tempore clarus, ut æqualis aut certè paulo superioris, Rei Rust. lib. 1. cap.

AUR. CORN. CELSI VITA.

cap. 1. sic meminit: *Nostrorum temporum Cornelius Celsus totum corpus Disciplina, quinque libris complexus est.* Quem Rusticam intellexisse, vero proximum est. Quintiliani sententia Inst. Orat. lib. 10. cap. 1. is Vir Eruditus, inter eos Philosophos Latinos, quos eloquentes literæ Romanæ tulerunt, qui scripsit non parum multa, scepticos sequutus, non sine cultu & nitore. Ideoque ob nimiam novitatis cupiditatem, ejusdem censurâ notatur. Scripta ejus figillatim prodidit Volaterranus Anthropol. l. d. Cornelius Celsus mediocri Vir ingenio, non solum artem Rhetoricam, sed de re Militari, & de Rusticana, deque Medicina libros composuit. Quæ omnia J. Doussa æternum gentis & generis sui decus in Sylva Extemporal. hoc Epigrammate venustissimè complexus:

*Facta urbana tuo res Rustica munere,
scriptis*

Nec minus illustris est Medicina tuis.

*Hinc quoque Militiæ tractasti commoda
Rhetor,*

Hoc Martem Musis jungere, Celse, fuit.

Sub-

AUR. CORN. CELSI VITA.

Subjungit Polyhistor Italus : *Ad nos tantum ejus Medicina pervenit Oratorio more conscripta.* Sed & quædam Rhetorica ejus nostrâ ætate Sixti Popmæ studio feruntur emissa. Veterinariam quoque conscripsisse autor est Mercurialis lib. 4. cap. 2. & Phil. Ingrass. Quæst. de Veterinar. cap. 9. Herbarium verò ei adscriptum, Apuleji potius credit in vita Apuleji Elmenhorstius. Julium quidem Celsum inter rei militaris Scriptores enumerat Rob. Valtur. quemadmodum huic à nonnullis adscripta sunt Julii Cæsaris Commentaria. De quibus tamen nihil verè constat. Varia fanè ejus eruditio aliud prodere non potest quam Virum ingenuè natum, magna seculi felicitate, quod bonarum literarum erat feracissimum. Excepit nempe coluitque ea ætas Viros scientiâ, prudentiâ, ac eloquentiâ summos, Tullium, Salustium, Catullum, Virgilium, Propertium, Horatium, Tibullum, Manilium, Vitruvium, Antonium Musam, Ovidium, Livium, Scribonium Largum, Valerium Maximum,

AUR. CORN. CELSI VITA.

mum, Velleium Paterculum : atque si se in Claudii imperium ipsius extenderit vita, Quintum Curtium, Persium, Senecam, Silium Italicum, Plinium, Viros omnes consummatissimos, in quibus tamen postremum nonnulli Celso Juniores censent. Opinionem meam firmat laudabilis veterum consuetudo, qua tria nomina Nobiliorum, Celso etiam Plinii auctoritate rata, Libertis rarò, nec fermè sine gravi causa unquam concessa scimus, quibus tamen semper servile nomen remansit. Nec moror, quod Celsi Epistolæ apud Marcellum in limine Operis Prænomen desit, quo soli Romani insigniebantur. Nomen enim apud bonos Auctores sæpe Prænomen & Cognomen includit. Hinc Martialis :

*Ut jugulem curas, nomen utrumque
bibam.*

Salutaribus itaque disciplinis Græcisque literis, non levi nobilitatis indicio, rectè institutus, facilè potuit seculo tam augusto ac beato, nihil non (ut ipse in Epistola ad Natalem refert)

di-

AUR. CORN. CELSI VITA.

dignum sublimi Romanorum majestatem de bono Medicinæ Artis splendidissimè scribere, idque perennitati & literis mandare, utilitatis magis quam delectationis causâ.

Scio equidem, non deesse multæ auctoritatis Viros, qui ex modo adducta Celsi Epistola opinantur, ipsum animo in diversa studia diviso, Græca duntaxat medicinalia in Latinum convertisse, aut Empedoclis & Democriti exemplo non ut merus atque ad quæstum Medicus, sed ut sapientem, atque, ut Columellæ verbis utar, universæ naturæ prudentem, Medicinam veluti Philosophiæ partem cum sapientiæ studio conjunxisse. Ideoque nec factam ejus ab Aureliano mentionem, Barthio Adv. lib. 38. cap. 3. censente. Nec denique unquam Medicinæ operatum. Credat qui volet. Nec eam litem meam facio. Medicum certè agnovit magnus Scaliger de Re Num. 36. Remedia quidem, Hippocratis & Galeni exemplo, aliunde congesta digessisse, ultrò largior, ipsam verò Morborum τέχνην & θεραπείαν proprio ingenio ducturam

AUR. CORN. CELSI VITA.

ductu contextam pro me res ipsa loquitur. Quin ipsum Pharmaca præbuisse, non mediocri gloriâ, ex ipsius ad Julium Calistum Epistola satis liquet. Quorum artificiosam missionem se accuratè intellexisse prodit ipse lib. 7. cap. 26. Unde Cornarius fortassis inter Pharmaceuticos reposuit. Imò deditâ operâ ab aliis prætermisâ proferre ac illustrare voluisse censuit Minadous variæ eruditionis Medicus, de Ext. Affect. lib. 2. cap. 3. Maximeque Medicum ejus Chirurgica probant, quæ Gesneri in Catalogo Chirurgorum sententiâ, veterum solus Latine scripsit, ut verè ipsum inter Chirurgos reponat doctissimus Septalius Animadv. lib. 8. Caut. 1. & 40. Tantâ verò id fide peregīt, ut Hieronymus ab Aquapendente Medicus & Chirurgus usu vel annis nemini secundus, in Operat. Chirurg. cap. de Chir. Dent. his verbis sese in ipsius laudes diffuderit: *Mirabilis Celsus in omnibus: quem nocturnâ versare manu, versare diurnâ, consulo.* Nec mirum: quum Celsus eruditissimo Manardo Epist. Medic. lib. 9. Epist. 1. bonus & fidelis

*** 2

Hip=

AUR. CORN. CELSI VITA.

Hippocratis interpres, licet in aliquo verbo quandoque lapsus videatur. Quod Viro in omni literarum genere exercitato vel ipsa πολυγραφία libenter profectò condonari jubet, quamvis non diffiteatur ipse non pauca se ex aliena quandoque sententia posuisse. Horatio pariter Augenio de Miss. Sanguin. lib. 8. cap. 1. Lommio, Ronsseo Epist. Medic. lib. 8. sect. 3. cap. 7. Schenckio, Jo. Heurnio, Bened. Matamoro, Rod. à Castro, innumerisque præclari judicii Medicis, propter singularem & succinctam cum elegantia doctrinam, Latinus Hippocrates appellatur, in quo Pantini judicio Comment. ad Celsi lib. 1. cap. 1. optimæ Methodi ac viæ rationisque docendi discendique, & in summa brevitate mira Artis & Sapientiæ observatio plerunque animadvertatur. Rectè igitur Agricola de Pond. Rom. lib. 4. Celsi, inquit, *autoritas Medicis nota est, aut saltem esse debet.* Quam elegantissimis verbis Cælius Rhodiginus Antiq. Lect. lib. 26. cap. 3. insinuavit: *A. Cornelio Celso versuram faciunt multi. Verùm citra illius sen-*

AUR. CORN. CELSI VITA.

sententiam nihil ferme promunt; perinde ac verba sint veterum sacrorum, quæ demutasse piaculare flagitium planè censeri debeat, quodque hostiis majoribus procures. Inde Fernelio, Franciæ Hippocrati, referente Plantio in Vita Fernelii cùm ob orationis puritatem, tum ob sententiarum pondus, quam charissimus fuit. Jurisconsultis procul dubio iisdem nominibus usque adò venerabilis, ut Pandectas suas hujus Viri auctoritate muniri voluerint. Verùm, ne nimis laudibus veriùs is oneretur, quam ornetur, quem mortalium nemo rectè vituperavit: unicum Heurnii judicium, inter cetera gravissimum, huic Virtutum coronæ lemnisci loco satis erit. Ita ille Meth. Stud. Med. cap. 5. *Latinos inter Medicos primus est Cornelius Celsus: sed prudenter legendus. Nam in multis Asclepiadem Methodicum sectatur, ut fatetur ipse. Hujus cote stylum subigemus, & pluris Latinitatem ejus quam Medicinam faciemus.* Unicus itaque Celsus, ut scitè idem in Epist. ad Ronss. Celso præfixa, Medicis Latinis præferatur: qui pomoeria Romanæ eloquentiæ eò protulit, ut

AUR. CORN. CELSI VITA.

Medicina suavissimo ore eloquentiæ jam sese cultioribus ingeniis meritò commendat.

His quotquot naturæ associavit benignitas, æquos adferte animos, elegantissimi favete linguæ. Ita Vobis, & verum animi sermonisque cultum, & firma valetudinis præsidia parabit. Tantum est.

Optandum est, ut sit mens sana in corpore sano !

L I B R I

Quibus J. A. van der Linden
usus fuit in hoc opere re-
cognoscendo.

Mss. seu ἀπόγραφον codicis Parisiensis,
descriptum anno CIO CXXIV. Commu-
nicavit V. cl. D. Joh. Hoornbeeck, SS. Theol.
D. & Profess. ordin. in Academia, ac V. D.
Min. in Ecclesia, quæ est Lugd. Batavorum,
Collega reverendus.

Liber editus Venetiis, apud Aldum 1528.
in 4. sed sedulo collatus atque emendatus à
V. cl. Jac. Carpentario, Doct. Med. Pari-
siensi & Prof. Regio, ex codicibus duorum
Med. Parisiensium, nempe Joh. Fernelii,
viri incomparabilis, & Joh. Capellani, qui
ei in comitina Archiatrōn anno CIO IO
LVIII. successit apud Henricum II. Gal-
liarum Regem. Mutuo dedit V. cl. D.^a Gui-
do Patinus, Bellovacus, Doct. Med. Pari-
siensis & Professor Regius, amicus mihi exi-
mius.

Alius ibidem editus 1549. in folio cum
Medicis antiquis. Quem sua manu V. cl.
Nic. Nancelius contulit cum editionibus, quot-
quot suo tempore extabant, excepta Stephani;

***4

toto

toto opere ad marginem adscriptis non modo lectionibus, ubi à libro, qui erat præ manu, variabant; sed & propriis conjecturis, raro non bonis & doctis. Hunc quoque utendum dedit V. cl. D.^a Guido Patinus, ob singulare publicum juvandi studium nunquam & nulli non laudandus.

Alius Lugdini editus apud Joan. Tornesium 1554. in 12. cui ad oram V. ill. Jos. Scaliger, seculi miraculum, & veteris cujusdam codicis lectiones & suas emendationes atque notas adscripsit. Quem ipse testamento reliquit V. cl. D. Ælio Everhardo Vorstio, Botanices ac Medicinæ, dum viveret, Professori primario; ego autem usui acceptum debeo V. cl. D. Adolfo Vorstio, Parenti optimo in utraque & professione & dignitate successori dignissimo, ac Collegæ meo honorando.

Varie lectiones, è Mss. Codice antiqua Bibl. Regiæ Parisiensis, qui inscriptus erat, Medicina antiqua, descripta anno 1631. à V. cl. D. Joh. Walæo, Med. Doct. & postea Professore insigni.

Varie lectiones è libro Sacri Johannis, ab eodem excerptæ. Et has & præcedentes mihi utendas dedit D. Antonius Clementius, o

mana

μηναιπίτης, Cl. D. Walai ex sorore nepos,
juvenis doctus, probus, pius, & si fata si-
vissent, longiore vita dignus.

Præter quæ contuli etiam eorum editiones,
emendationes, annotationes, lectionesque va-
rias, quarum in epistola ad Cl. D. Patinum
feci mentionem. Quemadmodum & illa,
quæ Janus Cornarius in comm. ad Gal. de
Comp. pharm. quæque alii & celebres inter
Criticos (quos Fax Artium liberalium exhi-
bet) authores observarunt. Hoc quoque te
scire tua interesse, Lector amice, putavi.
Nunc adi ad auctorem. Quem, si cum
cura & studio leges, spondeo,

Lectio lecta, magis decies repetita, pla-
cebit.

IN-

INDICULUS

Editionum

C E L S I.

In Folio,

Apud

Nicolaum, *Florentia* 1478.
Leonardum Pachel Uldericum Sinczenzeler,
Mediolan. 1481.

Joannem Rubeum, *Venet.* 1493.

Philippum Pinzi, *Venet.* 1497.

Aldum ex emendatione Bapt. Egnatii, *Venet.* 1524.

Christ. Wechelum, *Parif.* 1529.

Aldum cum Medicis antiquis, *Venet.* 1547.

Joannem Oporinum cum Notis Guilielmi Pantini, *Basilea.* 1552.

Henricum Stephanum Tom. III. Medicor. Princip. *Parif.* 1567.

In Quarto,

Francisc. Raphelengium, cum Notis Jerem. Thriverii Brachelii & Balduini Ronssci, *Lugd. Batav.* 1592.

In Octavo,

Aldum & Andr. Asulanum, *Venet.* 1528.

Johan Soterium, cum Notis Joh. Cæsarii, *Hagenoe* 1528. *Parif.* 1533.

Et *Salingiaci* 1538. *Tiguri* 1540.

— *Lugd.* 1542.

Matthæum Cerommium cum Notis Thriverii, *Antuerp.* 1539.

Marc. Anton. de Galaffis, *Patauii* 1563.

Guilielm. Rovillium cum Annotationibus R. Constantini, *Lugd.* 1566.

Hieronymum Scotum, *Venet.* 1566.

Joann.

In Duodecimo,

Joann. Tornæsum, *Lugd.* 1549.

Lugdun. 1592.

Lugdun. 1608.

Joan. Tornæsum & Guilielmum Gazeium, *Lugdun.* 1554.

Lugd. 1587. Epistre Françoise à Monfr. de la Scala, p. 325.

Joann. de Tournes, *Genev.* 1625.

Joann. Elsevirium ex recognitione Joan. Antonid. van der Linden, *Lugd. Batav.* 1657.

Salom. Wagenaar, *Lugd. Batav.* 1665.

In Bibliotheca Eduardi Bernardi sunt binæ editiones, seu duo exemplaria cum Mss. collata. Exstant No. 7489. seu 143. & 7495. seu 149. pag. 227. *Catal. Mss. Anglia.*

Simon Bevelaqua *Lugdun.* 1516. in 4.

Simon Silvius. Ejus dedicatio exstat in Edit. *Parif.* 1529. Sed est impressus apud Christian. Wechelium in fol.

JODOCI LOMMII Commentarii de Sanitate tuenda in primum librum de Re Medica Aurelii Cornelii Celsi, Medicorum Romanorum longè principis. *Lovanii* apud Anton. Mariam Bergagne, 1558. in 8.

HIERONYMI RUBEI Annotationes in libros VIII. A. C. Celsi de Re Medica, quibus omnia, quæ ad universam Medicinam spectant, dilucide & compendiose explicantur. *Venet.* ex Typographia Francisci Rampazeti, 1614. in 4.

PETRI PAAW Amstelædamensis Succenturiatus Anatomicus, continens Commentaria in Hippocratem de capitis vulneribus. Additæ in aliquot capita libri VIII, A. C. Celsi explicationes. *Lugd. Bat.* apud Jodocum à Colster A. 1616. in 4.

JOANNES MORISOTUS scripsit Annotationes in Corn. Celsum, *Basil.* ap. Joan. Oporin. 1547.

PRO-

PROMISSÆ EDITIONES.

Franc. Vertunianus in Epistol. Dedicat. in Librum Hippocrat. de Capitis vulner. cum Notis Scaligeri.

U Num addam, quod tibi ac Asclepiadis omnibus scio fore gratissimum, si à te tuique simillimis hunc primum suum conatum probatum iri animadverterit Scaliger, idem in reliquo Hippocrate tentaturum: quod jam in non minus eloquenti, quam fido ejusdem Hippocratis interprete Cello, cursim volutando, perfecit, cujus novam editionem, si per otium relegere dignabitur, castæ emendatæque Latinitatis amantibus propediem adornat.

Joannes Tornasius in Epistolis Gallicis ad Jos. Scaligerum, pag. 325.

J'Imprime *Corn. Celsus* en petit volume, comme autrefois feu mon Pere l'avoit imprimé. Je me sers de ce que je treuve de bon en l'édition de Constantin par Rouillé, & en celle de Henri Estienne. J'ay entendu depuis deux jours que vous avez des Notes sur cet Auteur-là, tant de feu Monsieur vôtre Pere que de vous. Je vous supplie bien fort & avec toute affection, qu'il vous plaise me vouloir faire part de ce que vous avez: je l'imprimeray avec toute la diligence qu'il me sera possible. Vous ferez du bien au public, & je recognoistray le secours que vous m'aurez fait ainsi que le trouverez bon.

Paulo post.

Pour revenir à mon affaire, je vous prieray me faire ce bien que d'envoyer à Paris au Sire Ambroise Drouard Libraire juré près Saint Benoist ce que vous aurez sur *Celsus*, afin qu'il me le fasse tenir le plus promptement qu'il pourra. &c.

P. Cole-

P. Colomesius Gallie Oriental. pag. 116.

Celsum etiam pollicebatur Joh. Walæus D.M. de cujus morte Sam. Sorberius in Epistol. Gallicis p. 442. In eundem Authorem notas parabat Ælius Everardus Vorstius apud Leydenfes primarius Medicinæ Professor, de quo Cunæus in laudatione funebri.

*Lettres de Feu Mr. Guy Patin, Lettre CXVI.
de la dernière édition.*

On dit que Mr. Rhodius en fait imprimer un (Celse) à Padouë, & nous avons ici (à Paris) Mr. Mentel qui en promet un pareillement en vertu de plusieurs manuscrits & revisions qu'il a devers soi. Pour ce dernier, quoi qu'il dise & promette beaucoup, il ne fait jamais rien, & dit toujours qu'il fera merveille.

JACOBUS HOLSTIUS Tonningæ Medicus scripsit commentarium in Celsum *Morhof. Polyhistor. liter. IV. cap. 12. pag. 174.*

PETRUS DACQUETUS Furnensis Medicus scripsit Commentarium in Celsum. *Valer. Andr. Dessel. Biblioth. Belgic. p. 734.*

TESTIMONIA

ET

ELOGIA de CELSO.

Quintilian. Instit. Orat. L. XII. C. XI.

Quid plura? cum etiam Cornelius Celsus mediocri vir ingenio non solum de his omnibus conscripserit artibus, sed amplius rei militaris, & rusticæ etiam, & medicinæ præcepta reliquerit? dignus vel ipso proposito, ut eum. scisse omnia illa credamus.

Fran-

Franciscus Floridus Sabinus Lectio.
Subciv. lib. I. cap. IV.

Cornelium Celsum ego tam excellentem scriptorem fuisse reor, ut paucos ei anteponendos Latium protulisse censeam, cum medicinam tam candide, eleganterque Romanis literis illustraverit, quam potuit, qui ingenium sic ad omnes scientias versatile habuit, ut ad id unum à natura formatus videretur, quod vir præstantissimus tractare constituisset. Itaque cum ejus, quæ exstant, lucubrationibus nihil sit pulcrius, nihil elegantius, quam ornate Philosophica explicasse credendus est? de quibus non pauca ab illo Scepticos imitato scripta fuisse, memoriæ prodidit Fabius Quintilianus, in iis etiam Celso persæpe (ut ejus de Oratoria Institutione libri testantur) adversatus, quæ ad Oratoriam artem spectantia, utinam cum infinitis aliorum voluminibus commune naufragium passa non fuissent. Nam & Celsi ingenium latius agnosceremus, & Rhetoricos ad Herennium libros non modo non ad Celsum, sed ne ad mediocrem quidem Celsi auditorem esse referendos, tamquam in speculo (ut est in proverbio) conspiciamur.

Claudius Verderius Censio. in
Auctores, pag. 144.

Cornelius (Celsus) de Latinitate est tam bene meritus, ut inter Latinos videatur is, qui inter Græcos Theophrastus fuit. Sed Hippocratem, & Græca pene omnia parum feliciter vertit. Exemplo sit Aphorismus quidam Hippocratis, quem ille sic interpretatur lib. II. cap. VII. circa finem. *Alvus nigra*, inquit, *sanguini atro similis repentina, sive cum febre, sive sine febre pernicioza est.* αὐτόμαλ. & autem in Hippocratis Græco non repentinum, sed spon-

spontaneum significat : ut idem alio Aphorismo
αὐτομαίτης κόπης ἀθρογέλης καὶ κήρυκας τῶν νόσων
esse dixit, hoc est lassitudines non quidem repen-
tinas, sed spontaneas, prænuncias & præcones
morborum esse. Etenim ex repentino motu re-
pentina lassitudo evenire potest, non tamen erit
morbi prænuncia, quia causam habet motum:
deinde vero Celsus, *repentina*, particulam ita col-
locat, ut ad *alvumne* an ad *febrem* referatur, vix
dignoscas. Melius itaque vertit Theodorus: *De-
jectiones nigrae modo sanguinis atrii sponte ve-
nientes, cum febre sive sine febre pessimæ sunt, &
quo plures sunt pravi colores eo pejus: sed si ex
medicamento tales digeruntur melius est, & quæ
plures non pravi colores eo melius.* Nec quoque
integrum Aphorismum vertit Celsus, sed senten-
tiam Hippocratis secuit per medium. Nec Theo-
dorus utique bene vertit, sic enim transtulit Apho-
rismum 79 particulæ IV. *Si quis sanguinem mingit, &
grumos, & guttatim emittit urinam, ac dolorem ad
ventrem imum, & pectinem & fœmen, vitiis vesicae
laborat.* Celsus in eundem errorem incidit. *Aut
si paulatim distillat,* ait Celsus, *vel si sanguis per hanc
editur, & in eo quaedam cruenta concreta sunt, idque
ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferio-
res partes dolent, in vesica vitium est.* Græcum autem
Hippocratis, *in vesica*, non habet, sed *circa vesicam*
hoc est, *ὡς ἐκ κόσης*. Celsus lib. II. cap. 2. *Si Austri
pluviaeque hyemem occuparint, ver autem frigidum &
siccum est gravis quidem fœminæ, quibus adest partus
abortu periclitantur: hæ vero quæ gignunt, imbecillos
vixque vitales edunt. Ceteros lippitudo arida, & si
seniores sunt, gravedines atque distillationes, male ha-
bent.* Hæc ad verbum ex Hippocrate esse viden-
tur, nisi quod *συντόμως ἀποθνήσκειν*, male habere
non est. Magna certe est differentia inter male
habere

habere & continuo mori. at male habet, qui continuo moritur. credo equidem: sed ita sit, Celsus Hippocratem non bene vertit. Pylorum intestinum à Græcis ita dictum esse commentatur quod per partes inferiores, tanquam per ostium, ea quæ in corpore excrescunt, emittat: cum Pylorum, pugnante è diametro ratione, tale nomen sortitum esse ex Galeno pateat, quia scilicet nihil nisi prius in chylum (chylum enim pro Latina voce usurpant medici) conversum tanquam bonus janitor exire sinat, & postea ad inferiora intestina deducit, non ut dejiciat, sed ut remoretur potius in corpore, & ab hepate in sanguinem transmittatur. Eaque ratione permotus Galenus V. de Usu partium, non τῶν ἀεττομάτων, sed alimentorum ait esse instrumenta: ideoque à natura flexuosa facta ut cibus non repente fluat, sed persistans concoquatur & nutriat. Apud Celsum deniq; observationes quædam sunt ludicræ: qualis hæc, si nimirum ægrotus summis digitis extrema parietum evellat, hoc est lapillos ex muro exradicet, signum mortis esse.

Ab hoc Latinitatis amantes Latinas morborum nuncupationes repetere debebant. *Vertunianus in Hippocrat. librum de vulneribus cap. pag. 71.*

Medicorum Deus. *Casaub. Ep. 29.*

Purissimus Scriptor Cornelius Celsus.
Voss. de Vitiis Serm. I. c. 16.

A. CORN.



A. CORN. CELSI
M E D I C I N Æ
LIBER PRIMUS.

P R Æ F A T I O.



V T ALIMENTA sanis corporibus Agricultura, sic a sanitatem ægris Medicina promittit. Hæc nusquam quidem non est. Siquidem etiam imperitissimæ gentes herbas, aliaque prompta in auxilium vulnerum morborumque noverunt. Veruntamen apud
10 Græcos aliquanto magis, quam in cæteris nationibus, exulta est, ac ne apud hos quidem à prima b origine, sed paucis ante nos seculis; utpote cum vetustissimus auctor Æsculapius celebretur. Qui, quoniam
15 adhuc rudem & vulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, c in deorum numerum receptus est. Hujus deinde duo filii, Pedalirius & d Machaon, bello Trojano ducem Agamemnomem secuti, non mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt.

a De Vet. Med. T. viii. 22. b De Vet. Med. iii. 3. c Orat. Thess. N. 178. d Orat. Thess. 183. Maxim. Tyr. Dissert. xxix. Plato de Rep. l. iii. pag. 407. T. 2. ed. H. Steph. Aristides Oration. in Asclepiada.

lerunt. Quos tamen Homerus non in pestilentia, neque in variis generibus morborum aliquid attulisse auxilii, sed vulnerebus tantummodo ferro & medicamentis mederi solitos esse proposuit. Ex quo ap-
 405, paret, has partes medicinæ solas ab his esse
 29. tentatas, easque esse vetustissimas. Eodemque auctore disci potest, morbos tum ad iram deorum immortalium relictos esse; & ab iisdem opem posci solitam. 10
 Verique simile est, inter non multa auxilia adversæ valetudinis, plerumque tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos neque desidia, neque luxuria vitiant. Siquidem hæc duo corpora, prius in 15
 Græcia, e deinde apud nos affligerunt. Ideoque multiplex ista medicina, neque olim, neque apud alias gentes necessaria, vix aliquot ex nobis ad senectutis principia perducit. Ergo etiam post eos, de qui- 20
 bus retuli, nulli clari viri medicinam exercuerunt; donec majore studio literarum disciplina agitari cœpit, quæ ut animo præcipue omnium necessaria, sic corpori inimica est. Primoque medendi 25
 scientia, sapientiæ pars habebatur, ut & morborum curatio, & rerum naturæ contemplatio sub iisdem auctoribus nata sit:
 21, 30. scilicet his hanc maxime f. requirentibus, qui corporum suorum robora inquieta 30
 cogitatione, nocturnaue vigilia minuerant. Ideoque multos ex sapientiæ professoribus peritos ejus fuisse accepimus: clarissimos vero ex his Pythagoram, &
 Empe-

e Serv. ad Virg. Aen. I. 641. Isid. Orig. L. XIV. c. III. p. 1162. Suidas V. Ἀσπιδία f. Calius Aurelianus. Tard. Pass. l. v. c. 9. Hippocrat. Democrit de nat. hom. 13.

Empedoclem , & Democritum. Hujus autem (ut quidam crediderunt) discipulus Hippocrates Cous , primus quidem ex omnibus memoria dignis , ab studio sapientiae disciplinam hanc separavit , vir & arte & facundia insignis. Post quem Diocles Carystius , deinde Praxagoras & Chrysippus , tum Herophilus & Erasistratus sic artem hanc exercuerunt , ut etiam in diversas
10 curandi vias processerint.

Iisdem temporibus in tres partes medicina diducta est : ut una esset , quæ victu : altera , quæ medicamentis : tertia , quæ manu mederetur. Primam *διαιτητικήν* , secundam *φαρμακευτικήν* , tertiam *χειρουργικήν*
15 Græce nominaverunt. Ejus autem , quæ victu morbos curat , longe clarissimi auctores etiam alius quædam agitare conati , rerum quoque naturæ g sibi cognitionem
20 vendicaverunt , tanquam sine ea , trunca & debilis medicina esset. Post quos Serapion , primus omnium , nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam , professus , in usu & experimentis eam posuit.
25 Quem Apollonius , & Glaucias , & aliquanto post Heraclides Tarentinus , & alii quoque non mediocris viri secuti , ex ipsa professione se *ἐμπειρικούς* appellaverunt. Sic in duas partes ea quoque , quæ victu curat ,
30 medicina divisa est , aliis rationalem artem , aliis usum tantum sibi vendicantibus : nullo vero quicquam post eos , qui supra comprehensi sunt , agitante , nisi quod acceperat : donec Asclepiades medendi ratio-

nem magna ex parte mutavit. Ex cujus
 successoribus Themison nuper ipse quo-
 que quædam in senectute deflexit. Et per
 11, 7. hos quidem maxime viros salutaris ista no-
 bis professio increvit.

Quoniam autem ex tribus medicinæ
 partibus, ut difficillima, sic etiam clarissi-
 ma est ea, quæ morbis medetur, ante om-
 nia de hac dicendum est. Et, quia prima in
 ea dissensio est, quod alii sibi experimento- 100
 rum tantummodo notitiam necessariam ef-
 se contendunt: alii, nisi corporum rerum-
 que naturalium ratione comperta, non satis
 potentem usum esse proponunt: indican-
 dum est, quæ maxime ex utraque parte di- 11
 cantur, quo facilius nostra quoque opinio
 interponi possit.

Igitur hi, qui rationalem medicinam
 profitentur, hæc necessaria esse propo-
 nunt: Abditarum & morbos continentium 240
 causarum notitiam, deinde Evidentium,
 post hæc etiam Naturalium actionum, no-
 vissime Partium interiorum. Abditas cau-
 sas vocant, in quibus requiritur, ex qui-
 bus principiis nostra corpora sint, quid se- 2
 cundam, quid adversam valetudinem fa-
 5, 10. ciat. Neque enim credunt, posse eum scire,
 32, quomodo morbos curare conveniat, qui,
 6, 32. unde hi sint, h. ignoret. Neque esse dubium,
 7, 3, 19. quin alia curatione opus sit, si ex quatuor 340
 principiis vel superans aliquid vel deficiens
 adversam valetudinem creat; ut quidam
 ex sapientiæ professoribus dixerunt: alia,
 si in humidis omne vitium est; ut He-
 ro-

rophilo visum est : alia , si in spiritu ; ut Hippocrati : alia , si sanguis in eas venas , quæ spiritui accommodatæ sunt , transfunditur , & inflammationem , quam Græci 1620.
 5 φλεγμονήν nominant , excitat , eaque inflammatio talem motum efficit , qualis in febre est ; ut Erasistrato placuit : alia , si 139,15.
 manantia corpuscula per invisibilia foramina subsistendo iter claudunt ; ut Asclepiades
 10 contendit. Eum vero recte curaturum , 4, 27.
 quem prima i origo causæ non fefellerit. Neque vero inficiantur , experimenta quoque esse necessaria ; sed , ne ad hæc quidem aditum fieri potuisse , nisi ab aliqua ratio-
 15 ne , contendunt. Non enim quidlibet antiquiores viros ægris inculcasse ; sed cogitasse , quid maxime conveniret ; & id usu explorasse , ad quod ante conjectura aliqua ducti essent. Neque interesse , an initio ple-
 20 raque explorata sint , si à consilio tamen coeperunt. Et id quidem in multis ita se habere. Sæpe vero etiam nova incidere ge- 13, 27.
 nera k morborum , in quibus nihil adhuc usus ostenderit , ut ideo necessarium sit
 25 animadvertere , unde ea coeperint ; ceu fine quo nemo mortalium reperire possit , cur hoc , quam illo , potius utatur. Et ob hæc quidem in obscuro positas causas persequuntur. Evidentes vero has appellant ,
 30 in quibus quærent , initium morbi calor attulerit , an frigus ; fames , an satietas ; & quæ similia sunt. Occursurum enim initio dicunt eum , qui originem non ignorat. Naturales vero corporis actiones 4, 27.
 6, 32.
 13, 4.

A 3

appel-

i Hippocr. de Art. xx. 4. k Plato de Republ. l. 3.
 Tom. 2. pag. 405. ed. H. Steph. Lindan. Exercitat.
 Batav. pag. 754.

appellant, per quas spiritum trahimus & emittimus; cibum potionemque assumimus & concoquimus: itemque, per quas eadem hæc in omnes membrorum partes digeruntur. Tum requirunt etiam, quare venæ nostræ modo submittant se, modo attollant: quæ ratio somni, quæ vigiliæ sit. Sine quorum notitia, neminem purant vel occurrere, vel mederi morbis, intra hæc nascentibus, posse. Ex quibus quia 10 quam maxime pertinere ad rem concoctio videtur, huic potissimum insistant; &, duce, alii, Erasistrato 1, atteri cibum in ventre contendunt: alii, Plistonico Praxagoræ discipulo, putrescere: alii credunt Hippocrati, 15 per calorem cibos concoqui. Acceduntque Asclepiadis æmuli, qui, omnia ista vana & supervacua esse, proponunt. Nihil enim concoqui; sed in crudam materiam, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et hæc 20 quidem inter eos parum constant. Illud vero convenit, alium dandum cibum laborantibus, si hoc; alium, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum quærendum esse, qui facillime teri possit. Si putrescit, eum, in quo 25 hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum, qui maxime calorem foveat. At nihil ex his esse quærendum, si nihil concoquitur: ea vero sumenda, quæ maxime manent, qualia assumpta sunt. Eademque 30 ratione, cum spiritus gravis est, cum somnus aut vigilia urget, eum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa, qualiter eveniant, perceperit. Præter hæc, cum in interiori-

1 Macrob. Satur. vii. 15. in Cælius Aurelianus. Acut. Morb. l. i. c. 14.

rioribus partibus & dolores & morborum
 varia genera nascantur, neminem putant
 his adhibere posse remedia, n quas ipse i-^{4, 27.}
 gnoret. Necessarium ergo esse, incidere o^{13, 4.}
 corpora mortuorum, eorumque viscera at-
 que intestina scrutari. Longeque optime fe-
 cisse Herophilum p & Erasistratum, qui no-
 centes homines, à regibus ex carcere acce-
 ptos, vivos inciderint, considerarintque e-
 tiamnum spiritu remanente, ea, quæ natura^{11, 12.}
 ante clausisset, eorumque q posituram, co-
 lorem, figuram, magnitudinem, r ordinem,
 duritiem, mollitiem, lævorem, contra-
 ctum: processus deinde singulorum & re-
 cessus, sive quid inseritur alteri, sive quid
 partem alterius in se recipit. Neque enim,
 cum dolor intus incidit, scire, quid doleat,
 eum, qui qua parte quodque viscus intesti-
 numve sit, non cognoverit. Neque curari
 id, quod ægrum est, posse ab eo, qui, quid
 sit, ignoret. Et cum per vulnus alicujus vi-
 scera patefacta sunt, eum, qui sanæ cujus-
 que colorem partis ignoret, nescire, quid
 integrum, quid corruptum sit; ideo nec suc-
 currere quidem posse corruptis: aptiusque
 extrinsecus imponi remedia, compertis
 interiorum & sedibus & figuris, cognitaque
 eorum magnitudine: similesque omnia,
 quæ proposita sunt, rationes habere. Ne-
 que esse crudele, sicut plerique proponunt,
 hominum nocentium, & horum quoque
 paucorum, suppliciis remedia populis in-
 nocentibus seculorum omnium quæri.

Contra hi, qui se ἐμπειρικὸς ab experien-

A 4

tia

n De diat. J. T. i. Gal. Med. M. l. 2. o Cic T. Q. ii. 39.
 p Tert. de An. c. x. & xxv. Gal. Adm. An. iii. 5. q Gal
 ad Eug. de prop. l. p. 50: T. i. r De Vet. Med. xli.
 25. seq. A. Tral. vii. 3.

tia nominant, evidentes quidem causas, ut
 necessarias, amplectuntur: obscurarum vero
 causarum & naturalium actionum quæ-
 stionem ideo supervacuam esse conten-
 dunt, quoniam incomprehensibilis natura
 sit. Non posse vero comprehendere, patere
 ex eorum, qui de his disputarunt, discor-
 dia: cum de ista re, neque inter sapientiæ
 professores, neque inter ipsos medicos con-
 veniat. Cur enim potius aliquis Hippocra- 100
 ti credat, quam Herophilo? cur huic potius,
 quam Asclepiadi? Si rationes sequi velit,
 omnium posse videri non improbabiles: si
 curationes, ab omnibus his ægros perdu-
 ctos esse ad sanitatem. Itaque neque dispu- 150
 tationi, neque auctoritati cujusquam fi-
 dem derogari oportuisse. Etiam sapientiæ
 studiosos maximos medicos esse, si ra-
 tiocinatio hos faceret: nunc illis verba
 superesse, deesse medendi scientiam. Dif- 200
 18, 33. ferre s quoque pro natura locorum, ge-
 nera medicinæ; & aliud opus esse Romæ,
 19, 15. aliud in Ægypto, aliud in Gallia. Quod si
 morbos hæ causæ facerent, quæ ubique ex-
 dem essent, remedia quoque ubique eadem 250
 esse debuissent. Sæpe etiam causas apparere,
 ut puta lippitudinis, vulneris; neque ex his
 patere medicinam. Quod si scientiam hanc
 non subjiciat evidens causa, multo minus
 eam posse subjicere, quæ in dubio est. Cum 300
 igitur illa incerta incomprehensibilisque
 sit, à certis potius & exploratis petendum
 esse præsidium; id est, his, quæ experien-
 tia in ipsis curationibus docuerit, sicut
 in

in cæteris omnibus artibus. Nam ne agri-
colam quidem aut gubernatorem dispu-
tatione, sed usu fieri. Ac, nihil istas cogi-
tationes ad medicinam pertinere, eo quo-
que disci, quod, qui diversa de his sensee-
rint, ad eandem tamen sanitatem homines
perduxerint. Id enim fecisse, quia non
ab obscuris causis, neque à naturalibus
actionibus, quæ apud eos diversæ erant;
sed ab experimentis: prout cuique respon-
derant, medendi vias traxerint. Ne inter
initia quidem ab istis quæstionibus dedu-
ctam esse medicinam, sed ab experimentis.
Ægrorum enim, qui sine medicis e-
rant, alios propter aviditatem primis die-
bus protinus cibum assumpsisse, alios pro-
pter fastidium v abstinuisse, levatumque
magis eorum morbum fuisse, qui abstinue-
rant. Itemque alios in ipsa febre aliquid
edisse, alios paulo ante eam, alios post re-
missionem ejus: optime deinde his cessis-
se, qui post finem febris id fecerant. Ea-
demque ratione alios inter principia pro-
tinus usos esse cibo pleniore, alios exiguo;
gravioresque eos factos, qui se implerant.
Hæc similiaque cum quotidie inciderent,
diligentes homines notasse, quæ plerunque
melius responderent: deinde ægrotantibus
ea præcipere cœpisse. Sic medicinam or-
tam, subinde aliorum salute, y aliorum inte-
ritu, perniciose discernentem à salutari-
bus. Repertis deinde medicinæ remediis,
homines de rationibus eorum differere
cœpisse: nec post rationem, medicinam ef-

A 5

fe

t Diod. Sicul. i. 82. v Hippocrat. de Arte T. vi.
de Vet. Med. x. 17. x Præcept. ii. 26. 27. y Co-
lumell. l. i. c. i.

se inventam ; sed post inventam medicinam , rationem esse quæsitam. Requiritur etiam , ratio idem doceat , quod experientia , aliud. Si idem , supervacuam esse : si aliud , etiam contrariam. Primo tamen remedia exploranda summa cura fuisse , nunc vero illa explorata esse : neque ulla aut nova genera morborum reperiri , aut novam desiderari medicinam. Quod si jam incidat mali genus aliquod ignotum , non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris : sed eum protinus visurum , cui morbo id proximum sit ; tentaturumque et remedia similia illis , quæ vicino malo sæpe succurrerint ; & per ejus similitudinem opem reperturum. Neque enim se dicere , consilio medicum non egere , & irrationabile animal hanc artem posse præstare ; sed has latentium rerum conjecturas ad rem non pertinere , quia non interfit , quid morbum faciat , sed quid tollat. Neque ad rem pertinere , quomodo , sed quid optime digeratur , sive hac de causa concoctio interciderat , sive de illa ; & sive concoctio sit illa , sive tantum digestio. Neque quærendum esse , quomodo spiremus , sed , quid gravem tardumque spiritum expediat : neque , quid venas moveat ; sed , quid quæque motus genera significant. Hæc autem cognosci experimentis. Et in omnibus ejusmodi cogitationibus in utramque partem differi posse. Itaque ingenium & facundiam vincere : morbos autem , non a eloquentia , sed remediis curari. Quæ si quis elinguis usu discre-

discreta bene norit, hunc aliquanto majorem medicum futurum, quam si sine usu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem, de quibus est dictum, supervacua esse tantummodo. Id vero, quod restat, etiam crudele; vivorum hominum alvum atque præcordia incidi; & salutis humanæ præ- 4, 4- fidem artem, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam inferre: cum præ- 10 fertim ex his, quæ tanta violentia quærantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, lævorem, mollitiem, duritiem, similiaque omnia, non esse talia, inciso corpore, qualia integro fuerint. Tum quia, 15 corporibus inviolatis, hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, & mille aliis mediocribus & affectibus sæpe mutantur. Unde multo magis verisimile, 20 interiora, quibus major mollities & lux ipsa nova est, sub gravissimis vulneribus & ipsa trucidatione mutari. Neque quicquam esse stultius, c quam quale quid vivo homine est, tale existimare esse moriente, imo jam 25 mortuo. Nam ne utrum quidem, ut nihilominus aerem contineat, spirante homine posse diduci: simulatque vero ferrum ad præcordia accessit, & discissum transversum septum est, quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus di- 30 ducit (*διάφραγμα* Græci vocant) hominem protinus animam amittere: itaque demum mortui præcordia & viscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod

A 6

neces-

neceſſe ſit tale eſſe , quale mortui ſit , non
 quale vivi ſuit. Itaque conſequi medicum ,
 ut hominem crudeliter jugulet ; non ut
 ſciat , qualia vivi viſcera habeamus. Si quid
 tamen ſit , quod adhuc ſpirante homine
 conſpectui ſubjiciatur ; id ſæpe caſum of-
 ferre curantibus. Interdum enim gladi-
 atorem in arena , vel militem in acie , vel
 viatorem à latronibus exceptum ſic vulne-
 rari , ut ejus interior aliqua pars , & in alio
 alia , aperiatur ; atque ita ſedem , poſitum ,
 ordinem , figuram , ſimiliaque cognoscere
 prudentem medicum , non cædem , ſed
 ſanitatē molientem ; idque per miſericor-
 diam diſcere , quod alii dira crudelitate
 cognoverint. Ob hæc , ne mortuorum qui-
 dem lacerationem neceſſariam eſſe. Quæ ,
 eſſi non crudelis , tamen ſœda ſit , cum ali-
 ter pleraque in mortuis ſe habeant : quan-
 tum vero in vivis cognosci poteſt , ipſa cu-
 ratio oſtendat.

Cum hæc per multa volumina , perque
 magnæ contentiōis diſputationes à me-
 dicis ſæpe tractata ſint atque tractentur :
 ſubjiciendum eſt , quæ proxima vero vi-
 deri poſſint , neque addiſta alterutri opi-
 nioni , neque ab utraque nimium abhor-
 rentia , ſed media quodammodo inter di-
 verſas ſententias. Quod in plurimis con-
 tentiōibus deprehendere licet , ſine am-
 bitione verum ſcrutantibus , perinde ut in
 hac ipſa re. Nam quæ demum cauſæ , vel
 ſecundam valetudinem præſtent , vel mor-
 bos excitent ; quomodo ſpiritus , aut cibus ,
 vel

vel deferatur, vel digeratur, ne sapientiæ quidem professores scientia comprehendunt, sed conjectura prosequuntur. Cujus autem rei non est certa notitia, ejus opinio 5, 33. certum reperire remedium non potest. Verumque est, ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quanquam igitur multa sint, ad ipsas artes proprie d non pertinentia, tamen eas adjuvant, excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturæ rerum contemplatio, quamvis non faciat medicum, aptiorem 406. 29. tamen medicinæ reddit. Profecto verisimile est, & Hippocratem & Erasistratum 15 & quicumque alii, non contenti febres & ulcera agitare †, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideo quidem medicos fuisse, verum ideo quoque majores medicos extitisse. Ratione vero opus 20 est ipsi medicinæ, si non semper inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, tamen sæpe. Est enim hæc ars e conjecturalis, neque respondet ei plerumque 57, 16. non solum conjectura, sed etiam experientia. Et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur, sicut assuevit. Rarius, sed aliquando morbus quoque ipse 5, 22. novus est: quem non incidere, manifeste falsum est; cum ætate nostra quædam, ex 30 naturalibus partibus carne prolapsa & arente, intra paucas horas expiraverit; sic ut nobilissimi medici neque genus mali, neque remedium invenerint. Quos ideo nihil tentasse judico, quia nemo in splendida persona

d Augustin de Doctrin. Chr. 11. 39. Hippocrat. Epist. ad Thessal. fil. De decent. Ornat. T. 1. 11. 111. † i. e. tradere. e Hip. Cratev. ep. 7. Plato de leg. xiii. p. 976. T. 2. Arist. Or. Plat. 1. p. 364.

persona periclitari conjectura sua voluerit,
283, 5. ne occidisse, nisi servasset, videretur. Veri
tamen simile est, potuisse aliquid excogi-
tare, detracta tali verecundia, & fortasse
respondurum fuisse id, quod aliquis esset
expertus. Ad quod medicinæ genus, ne-
que semper similitudo aliquid confert; &
si quando confert, tamen idipsum rationa-
bile est, inter multa similia genera, & mor-
borum & remediorum, cogitare, quo po- 100
tissimum medicamento sit utendum. Cum
igitur talis res incidit, medicus aliquid
oportet inveniat, quod non ubique for-
tasse; sed sæpius tamen etiam respondeat.
Petet autem novum quoque consilium, 15
non ab rebus latentibus (istæ enim dubiæ
& incertæ sunt) sed ab his, quæ explorari
possunt; id est, evidentibus causis. Inter-
est enim, fatigatio morbum, an sitis; an
frigus, an color; an vigilia, an fames fece- 20
rit; an cibi vinique abundantia, an intem-
perantia libidinis. Neque ignorare hunc
27, 33. oportet, quæ sit ægri natura: humidum
magis, an magis siccum corpus ejus sit:
validi nervi, an infirmi: frequens adversa 25
valetudo, an rara: eaque, cum est, vehe-
mens esse soleat, an levis; brevis, an longa:
quod is vitæ genus sit secutus; laboriosum,
an quierum; cum luxu, an cum frugalitate.
Ex his enim, similibusque, sæpe curandi 30
nova ratio ducenda est. Quamvis ne hæc
quidem sic præteriri debent, quasi nullam
controversiam recipiant. Nam & Eras-
stratus non ex his fieri morbos dixit; quo-
niam

niam & alii, & idem alias post ista non febricitarent.

Et quidam Methodici seculi nostri, sub auctore (ut ipsi videri volunt) Themisone contendunt, nullius causæ notitiam quicquam ad curationes pertinere: satisque esse, quædam communia morborum intueri, Et quidem horum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere ægros, modo nimium: modo alia parte parum, alia nimium. Hæc autem genera morborum, modo acuta esse, modo longa; & modo incrementum, modo consistere, modo minui consuevisse. Cognito igitur eo quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse: si profluvio laborat, continendum: si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo. Et aliter acutis morbis medendum, aliter vetustis: aliter incrementibus, aliter subsistentibus, aliter jam ad sanitatem inclinantibus. Horum observationem medicinam esse, quam ita 9, 13. finiunt, ut quasi viam quandam, quam 25 μέθοδον Græci nominant, eorumque, quæ in morbis communia sunt, contemplatricem esse contendunt. Ac neque rationalibus se, neque experimenta tantum spectantibus annumerari velunt: cum ab illis eo nomine 30 dissentiant, quod in conjectura rerum latentium nolunt esse medicinam: ab his eo, quod parum artis esse in observatione experimentorum credunt. Quod ad Erasistratum pertinet, primum, ipsa evidentia ejus opini-

opinionem repugnat; quia raro, nisi post horum aliquid, morbus venit. Deinde non sequitur, ut quod alium non afficit, aut eundem alias, id ne alteri quidem, aut eodem tempore alio noceat. Possunt enim quædam subesse corpori, vel ex infirmitate ejus, vel ex aliquo affectu, quæ vel in alio non sunt, vel in hoc alias non fuerunt, eaque per se non tanta, ut concitent morbum; tamen obnoxium magis aliis injuriis corpus efficiant. Quod si contemplationem rerum naturæ f (quam non temere Medici sibi vendicant) satis comprehendisset, etiam illud scisset, nihil omnino ob unam causam fieri, sed id pro causa apprehendi, quod contulisse plurimum videtur. Potest autem id, dum solum est, non movere, quod junctum aliis maxime moveret. Accedit ad hæc, quod ne ipse quidem Erasistratus, qui transfuso in arterias sanguine febrem fieri dicit, idque nimis repleto corpore incidere, reperit, cur ex duobus æque repletis, alter in morbum inciderit, alter omni periculo vacarit; quod quotidie fieri apparet. Ex quo disci potest, ut vera sit illa transfusio, tamen illam non per se, cum plenum corpus est, fieri; sed cum horum aliquid accesserit.

Themisonis vero æmuli, si perpetua, quæ † promittunt, habent, magis etiam, quam illi rationales sunt. Neque enim, si quis non omnia tenet, quæ rationalis alius probat, prorinus alio novo nomine artis indiget: si modo, quod primum est, non

f De Vet. Med. xxxvi. 18. † Horat. ad medicorum esse promittunt medic.

memoriæ soli, sed rationi quoque insistit.
 Sin, quod vero propius est; vix ulla † perpe- 119,
 tua præcepta medicinalis ars recipit; iidem 25.
 sunt, quod ii, quos experimenta sola susti-
 nent: eo magis, quoniam, si compresserit
 aliquem morbus, aut fuderit, quilibet etiam
 imperitissimus videt. Quid autem com-
 pressum corpus resolvat, quid solutum te-
 neat, si à ratione tractum est, Rationalis est
 10 medicus: sin, ut ei, qui se rationalem ne-
 gat, confiteri necesse est, ab experientia,
 Empiricus. Et ita apud eum morbi cogni-
 tio extra artem, medicina intra usum est.
 Neque adjectum quicquam Empiricorum
 15 professioni, sed demtum est; quoniam illi
 multa circumspiciunt, hi tantum facillima,
 & non plus, quam vulgaria. Nam & hi, qui
 pecoribus ac jumentis medentur, cum pro-
 pria cujusque ex mutis animalibus nosse
 20 non possint, communibus tantummodo in-
 sistunt. Et exteræ gentes, cum subtilem
 medicinæ rationem non noverint, com-
 munia tantum vident. Et qui ample va-
 letudinarios nutriunt, quia singulis sum-
 25 ma cura consulere non sustinent, ad com-
 munia ista confugiunt. Neque, hercules,
 istud antiqui medici nescierunt, sed his
 contenti non fuerunt. Ergo etiam vetustis-
 simus auctor Hippocrates, dixit g mederi 19, 20.
 30 oportere, & communia, & propria intuen- 18, 10.
 tem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam 96, 15.
 professionem consistere ullo modo possunt.
 Siquidem & compressorum & fluentium
 morborum genera diversa sunt; facilius-
 B que

† De Loc. in Homin. T. I. l. 2. g Epidem. 1.
 5. & III. 2.

que id in his, quæ fluunt, inspicere potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibum vomere: aliud dejectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digerere, aliud tabe consumi. Atque in partes quoque humor erumpit, ut oculos, auresque, quo periculo nullum humanum membrum vacat. Nihil autem horum sic, ut aliud curatur. Ita protinus in his à communi fluentis morbi contemplatione ad propriam medicina descendit. Atque in hac quoque rursus alia proprietatis notitia sæpe necessaria est; quia non eadem omnibus, etiam in similibus casibus, opitulatur. Siquidem certæ quædam res sunt, quæ in pluribus ventrem aut astringunt, aut resolvunt. Inveniuntur tamen, in quibus aliter, atque in cæteris, idem eveniat. In his ergo communium inspectio contraria est, propriorum tantum salutaris. Et causæ quoque æstimatio sæpe morbum solvit. Ergo etiam ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper vidimus, Cassius, febricitanti cuidam & magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi coepisset cognosceret, aquam frigidam ingessit. Qua ille epota, cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno & sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune providit, non ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat; sed ex causa, quæ ante præcesserat. Estque etiam proprium aliud hæc & loci & temporis, istis quoque authoribus. Qui, cum disputant, quem-

112,
17.
405,
17.

8, 21.
119,
32.

quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt, ut gravibus aut locis aut temporibus magis vitetur frigus, æstus, satietas, labor, libido; magisque ut conquiescat iisdem aut locis aut temporibus, si quis gravitatem corporis sentit; ac neque vomitu stomachum, neque purgatione alvum sollicitet. Quæ vera quidem sunt; à communibus tamen ad quædam propria descendunt. Nisi persuadere nobis volunt, sanis quidem considerandum esse, quod cælum, quod tempus anni sit: ægris vero non esse. Quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia 405, offensis infirmitas est. Quinetiam morborum in iisdem hominibus aliæ atque aliæ proprietates sunt: &, qui secundis aliquando frustra curatus est, contrariis sæpe restituitur. 16. Plurimaque in dando cibo discrimina 20 reperiuntur: ex quibus contentus uno ero. Nam famem facilius fert adolescentens, quam 32, 25. puer: facilius in denso cælo, quam in tenui: facilius hieme, quam ætate: facilius uno cibo, quam prandio quoque assuetus: facilius 33, 7. inexercitatus, quam exercitatus homo. Sæpe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus inediam tolerat. Ob quæ conjicio, eum, qui propria non novit, communia tantum intueri debere: eumque, qui 17, 30. nosse propria potest, illa quidem non oportere negligere, sed his quoque insistere. Ideoque, cum par scientia sit, utiliore tamen medicum esse Iamicum, quam extraneum. Igitur, ut ad propositum meum redeam

deam, rationalem quidem puto medicinam esse debere: instrui vero ab evidentibus causis; obscuris omnibus, non à cogitatione artificis, sed ab ipsa arte rejectis. Incidere autem vivorum corpora, & crudele, & supervacuum est: mortuorum vero, in di-
 12, 11. scentibus necessarium. Nam positum & ordinem nosse debent. Quæ cadavera melius, quam vivus & vulneratus homo, repræsentant. Sed & cætera, quæ in vivis cognosci modo possunt, in ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius, sed aliquanto mitius usus ipse monstrabit. His propositis, primum dicam, quemadmodum Sanos agere conveniat: tum ad ea transibo, quæ ad Morbos & curationes eorum pertinebunt.

CAPUT I.

Quemadmodum sanos agere conveniat.

SANUS homo, qui & bene valet, & suæ spontis est, nullis obligare se legibus debet; ac neque medico, neque iatro-alipta egere. Hunc oportet a varium habere vitæ genus: modo ruri esse, modo in urbe, sæpiusque in agro: navigare, venari, quiescere interdum, sed frequenter se exercere.
 28, 12. Siquidem ignavia b corpus hebetat, labor firmat, illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis uti: modo ungi, modo idipsum negligere: nullum cibi genus fugere, quo populus utatur: interdum in convictu esse, interdum

m Cicero A. Qu. II. 39. a Cæl. Aurel. de Morb. Acut. I. 14. b De Diatal. I. T. I. 18. l. 11. T. xxxvii. 13. & 28. I. Off. Med. xii. 4. Dion. Chrys. Or. 7. p. 5. ed. Cas. Pallad. ad Hipp. I. 6. Epid. p. 252.

dum ab eo se retrahere : modo plus iusto,
 modo non amplius assumere : * bis die potius, ^{33, 29.}
 quam semel cibum c capere : & † semper
 quam plurimum, dummodo hunc concoquat.
 5 Sed ut hujus generis exercitationes cibi-
 que necessarii sunt ; sic athletici superva-
 cui. Nam & intermissus propter aliquas
 civiles necessitates ordo exercitationis cor-
 pus affligit : & ea corpora , quæ more
 10 eorum repleta sunt , celerrime & senescunt,
 & ægrotant.

De Concubitu.

Concubitus vero neque nimis concupi-
 scendus , neque nimis pertimescendus est.
 15 Rarus , corpus excitat ; frequens, d solvit.
 Cum autem frequens , non numero sit,
 sed natura , ratione ætatis , & corporis , scire
 licet, eum non inutilem esse, quem corpo-
 ris neque languor , neque dolor sequitur.
 20 Idem interdiu pejor , tutior noctu : ita
 tamen , si neque illum cibus , neque hunc
 cum vigilia labor statim sequitur. Hæc
 firmis servanda sunt : cavendumque , ne in
 secunda valetudine adversæ præsidia consu-
 25 mantur.

C A P. II.

Quæ imbecillis servanda sint.

A T imbecillis (quo in numero magna
 0 pars urbanorum , omnesque pene cu-
 pidi literarum a sunt) observatio major ^{2, 29.}
 necessaria est : ut , quod vel corporis ,
 vel loci , vel studii ratio detrahit , cura re-

B 3

stituat

* Vide Nonn. de Re Cibar. l. 1. c. 4. c De Vet.
 Med. xviii. † Casaub. in Athen. ii. 8. d De Gen.
 1. 5. 11. Præd. viii. 15. 16. a Nazian. Orat. Funeb.
 in Basil. Magn.

stiat. Ex his igitur, qui bene concoxit
 mane tuto surget: qui parum, quiescere de-
 bet; &, si mane surgendi necessitas fuerit,
 25, 21. redormire. Qui non concoxit, ex toto con-
 24, 8. quiescere, ac neque labori se, neque exer- 5
 14. citationi, neque negotio credere. Qui cru-
 37, 19. dum sine præcordiorum dolore ructat, is
 ex intervallo aquam frigidam bibere, & se
 nihilominus continere. Habitare vero ædi-
 ficio lucido, perflatum æstivum, hibernum 100
 solem habente: cavere meridianum b so-
 lem, matutinum & vespertinum frigus;
 itemque auras fluminum atque stagnorum;
 minimeque nubilo cœlo, soli aperienti se
 committere, ne modo c frigus, modo calor 1
 moveat: quæ res maxime gravedines de-
 stillationesque concitat. Magis vero gra-
 vibus locis ista servanda sunt, in quibus
 etiam pestilentiam faciunt. Scire autem
 40, 17. licet, integrum corpus esse, cum quotidie 200
 mane urina alba, dein rufa est. Illud con-
 coquere, hoc concoxisse significat. Ubi ex-
 perrectus est aliquis, paulum intermittere;
 36, 11. deinde, nisi hiems est, fovere os multa
 aqua frigida debet. Longis diebus meri- 2
 diari potius ante cibum; sin minus, post
 eum. Per hiemem potissimum totis nocti-
 bus conquiescere. Sin lucubrandum est,
 37, 19. non post cibum id facere, sed post conco-
 ctionem. Quem interdium vel domestica, 300
 vel civilia officia tenuerunt, huic tempus
 aliquod servandum curationi corporis sui
 est. Prima autem ejus curatio, exercitatio
 est, quæ semper antecedere cibum debet:

in eo , qui minus laboravit , & bene concoxit , remissior : in eo , qui assuetus est , & minus concoxit , amplior. Commode vero exercent , clara lectio , arma , pila , cursus , 38, 26.
5 ambulatio , atque hæc non utique plana , commodior est : siquidem melius ascensus quoque & descensus , cum quadam varietate corpus moveat ; nisi tamen id perquam imbecillum est. Melior autem est sub divo ,
10 quam in porticu : melior , si caput patitur , in sole , quam in umbra : melior in umbra , quam parietes aut viridaria efficiunt , quam quæ recto subest : melior recta , quam flexuosa. Exercitationis autem plerumque finis esse debet e sudor , aut certe lassitudo ,
15 quæ citra fatigationem sit : idque ipsum , modo minus , modo magis faciendum est. Ac ne his quidem , athletarum exemplo , vel certa esse lex , vel immodicus esse labor debet. Exercitationem recte sequitur ,
20 modo unctio , vel in sole , vel ad ignem ; modo balneum , sed in conclavi quam maxime & alto & lucido & spaciofo. Ex his vero neutrum semper fieri oportet ; sed sæpius alterutrum , pro corporis natura. Post hæc paulum conquiescere opus est. Ubi ad cibum ventum est , nunquam f utilis est nimia 24, 33.
fatietas : sæpe inutilis nimia abstinentia : sæpe , si qua intemperantia subest , tutior est
30 in potione , quam in esca. Cibus à falsamentis , oleribus , similibusque rebus melius incipit. Tum caro assumenda est , quæ assa optima , aut elixa est. * Condita omnia duabus de causis inutilia sunt , quoniam & plus
B 4 pro-

propter dulcedinem assumitur, & quod modo par est, tamen ægrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coacescit. Si quis itaque hoc parum valet, palmulas, pomaque, & similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quæ aliquantum sitim excesserunt, nihil edendum est: post satietatem, nihil agendum. Ubi expletus est aliquis, facilius concoquit, si, quicquid assumpsit, portione aquæ frigidæ includit, tum paulisper invigilat, deinde bene dormit. Si quis interdium se implevit, post cibum neque frigori, neque æstui, neque labori se debet committere. Neque enim tam facile hæc inani corpore, quam repleto nocent. Si quibus de causis futura ginedia est, labor omnis vitandus est.

C A P. III.

Observationes quedam, prout res novæ incidunt, & corporum genera, & sexus, & ætates, & tempora anni sunt.

AT Q U E hæc quidem pene perpetua sunt: quasdam tamen observationes desiderant & novæ res, & corporum genera, & sexus, & ætates, & tempora anni. Nam neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in gravem, prima hieme: ex gravi in eum, qui salubris est, prima æstate transire melius est. Neque vero ex multa fame nimia satietas: neque ex nimia satietate fames idonea est.

Peri-

Periclitaturque &, qui semel, &, qui bis die cibum incontinenter, contra consuetudinem, assumit. Item, neque ex nimio labore subitum ocium, neque ex nimio ocio subitus labor, sine gravi noxa est. Ergo, cum quis mutare aliquid volet, paulatim debet assuescere. Omnem etiam c laborem facilius vel puer vel senex, quam insuetus homo sustinet. Atque ideo quoque nimis
 10 ociosa vita utilis non est; quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laboravit, aut multo plus, quam solet, etiam is qui assuevit, huic jejuno dormiendum est: multo magis, si etiam
 15 os amarum est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo jejuno est, sed etiam in posterum diem ita permanendum, nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est, sur-
 20 gere oportet, & lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modi-^{22, 3.} ce magis aliquis laboravit, tamen ingredi aliquantum eodem modo debet.

Communia deinde omnibus sunt post
 25 fatigationem cibum sumpturis, ubi paulum ambulaverunt, si balneum non est, calido loco, vel in sole, vel ad ignem ungi, atque sudare: si est, ante omnia in tepidario residere: deinde, ubi paulum conquieverunt, intrare & descendere in † solium; tum
 30 multo oleo ungi, leniterque perfricari; iterum in solium descendere: post hæc, os aqua calida fovere, deinde frigida. Balneum his fervens idoneum non est. Ergo si

C 5 nimium

nimium alicui fatigato pene febris est, huic
 abunde est, loco tepido demittere se ingui-
 nibus tenus in aquam calidam, cui paulum
 olei adjectum sit: deinde totum quidem
 corpus, maxime tamen eas partes quæ in 5
 aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo,
 cui vinum & paulum contriti salis sit adje-
 ctum. Post hæc, omnibus fatigatis aptum
 est, cibum sumere, eoque humido uti;
 aqua, vel certe diluta potione esse conten- 10
 tos; maximeque ea, quæ moveat urinam.
 Illud quoque nosse oportet, quod ex labore
 sudanti frigida potio perniciosissima est:
 209, atque etiam, cum sudor remisit, itinere
 19. fatigatis inutilis. A balneo quoque venien- 15
 tibus Aesclepiades inutilem eam judicavit.
 Quod in his verum est, quibus alvus facile,
 nec tuto, resolvitur, quique facile inhorres-
 cunt: perpetuum in omnibus non est,
 cum potius naturale sit, potione æstuan- 20
 tem stomachum refrigerari, frigentem
 calefieri. Quod ita præcipio, ut tamen fa-
 tear, ne ex hac quidem causa sudanti adhuc
 frigidam bibendam esse. Solet etiam pro-
 desse, post variam cibum, frequentesque 25
 dilutas potiones, vomitus, & postero die
 longa quies, deinde modica exercitatio. Si
 assidua oscitatio urget, invicem modo aqua,
 modo vinum bibendum est, raroque balneo
 utendum. Levatque lassitudinem etiam la- 30
 boris mutatio: cumque, quem novum ge-
 nus cujusdam laboris pressit, id, quod in
 consuetudine est, reficit. Fatigato quoti-
 dianum cubile d tutissimum est: insolitum
 con-

contra, lassat. Quod enim contra e consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est.

Proprie quædam ad eum pertinent, qui
5 ambulando fatigatur. Hunc reficit in ipso
quoque itinere frequens frictio: post iter,
primum sedile, deinde unctio; tum calida
aqua aut balneo magis inferiores partes, quam
superiores foveat. Si quis vero exustus in
10 sole est, huic in balneum protinus eundum
est, perfundendumque oleo corpus & caput:
deinde in solium bene calidum descenden-
dum est, tum multa aqua per caput in-
fundenda prius calida, deinde frigida est.
15 At ei, qui perfrixit, opus est in laconico
primum involuto sedere, donec insudet;
tum ungi; deinde lavari: cibum modicum,
potiones meras assumere.

Is vero, qui navigavit, & nausea pressus
20 est, si multam bilem evomuit, vel abstinere
cibo debet, vel paulum aliquid assumere.
Si pituitam acidam effudit, utique some-
re cibum, sed assueto leviozem: si sine vo-
mitu nauseavit, vel abstinere, vel post ci-
25 bum vomere. Qui vero toto die, vel in ve-
hiculo, vel in spectaculis sedit, huic nihil
currendum, sed lente ambulandum est.
Lenta quoque in balneo mora, dein cœna
exigua prodesse consueverunt. Si quis in
30 balneo æstuat, reficit hunc ore exceptum,
& in eo retentum acetum: si id non est, eo-
dem modo frigida aqua assumpta. Ante
omnia autem scire convenit naturam cor-
poris: quia alii graciles, alii obesi sunt; alii
calidi

calidi, alii frigidiores; alii humidi, alii sicciores; alios adstricta, alios resoluta alvus exercet. Raro quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis vero homo implere se debet, plenus extenuare, calidus refrigerare, frigidus calefacere, madens siccare, siccus madefacere. itemque alvum firmare is, cui fusa: solvere is, cui adstricta est. Succurrendumque semper parti maxime laboranti est. 10

De causis quæ implent corpus.

20, 28. Implet autem corpus modica h exercitatio, frequentior quies, unctio, &, si post prandium est, balneum, contracta alvus, modicum frigus hieme, somnus plenus & 15 non multum nimis longus, molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos & portiones maxime dulcia & pingua, frequentior cibus, &, quantum plenissime potest digerere. 20

40, 6.

De his, quæ extenuant corpus.

Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit, magisque si salsa est: in jejuno balneum, inurens sol, & omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium vel 25 brevis vel longus: lectus, per æstatem, terra; hieme, durum cubile: cursus, multa ambulatio, omnisque vehemens exercitatio, vomitus, dejectio, acidæ res & austæræ, & semel in die assumptæ epulæ, & vini non 30 perfrigidi potio jejuno in consuetudinem adducta.

Cum vero inter extenuantia posuerim vomitum & dejectionem, de his quoque pro-

propria, quædam dicenda sunt. Reiectum
 esse ab Asclepiade vomitum h in eo volu-
 mine, quod de tuenda sanitate composuit,
 video: neque reprehendo, si offensus eorum
 5 est consuetudine, qui quotidie ejiciendo
 vorandi facultatem moliuntur. Paulo etiam
 longius processit. Idem purgationes i quo- 85, 7.
 que eodem volumine expulit. Et sunt hæc 118,
 perniciosæ, si nimis valentibus medica- 10.
 10 mentis fiunt. Sed hæc tamen submoven-
 da esse, non est perpetuum: quia cor-
 porum temporumque ratio potest ea fa-
 cere necessaria, dum & modo, & non nisi
 cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quo- 31, 14.
 15 que ipse, si quid jam corruptum esset, ex-
 pelli debere confessus est. Ita non ex toto
 res condemnanda est. Sed esse ejus etiam
 plures causæ possunt: estque in ea quædam
 paulo subtilior observatio adhibenda.

20

De Vomitu.

87.

Vomitus utilior est k hieme, quam æ-
 stare nam tum & pituitæ plus, & capitis
 gravitas major subest. † Inutilis est gracili-
 bus, & imbecillum stomachum habentibus,
 25 utilis vero plenis & biliosis omnibus; si vel
 nimium se replerunt, vel parum conco-
 xerunt. Nam, si plus est, quam quod conco-
 qui possit, periclitari, ne corrumpatur,
 non oportet: si jam corruptum est, nihil
 30 commodius est, quam id, qua via i primum
 expelli potest, ejicere. * Itaque, ubi amari
 ructus cum dolore & gravitate præcor-
 diorum sunt, ad hunc protinus confugien-
 dum est. Idem prodest ei, cui pectus m æstuat
 &

h Plin. L. xxvi. 3. i Scribon. Larg. Epist. ad Ca-
 list. k De Salubr. diat. vi. 2. 3. 4. † Aph. iv. 6. l De
 loc. in Hom. L. v. 11, 12. m Soran. Ephes. Isagog.
 c. 7. * Aph. iv. 17.

& frequens saliva, vel nausea est; aut sonant aures, aut madent oculi, aut nos amatum est. Similiterque ei, qui vel cœlum, vel locum mutat; hisque, quibus, si per plures dies non vomuerunt, dolor præcordia infestat. Neque ignoro, inter hæc præcipi quietem, quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus: nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor: interdum valetudinis causa recte fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere & senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere; si difficilius, aquæ vel salis, vel mellis paulum adijcere. At, qui mane vomiturus est, antebibere mulsum, vel hyssopum esse, aut o radiculam debet; deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cætera, quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi, sed hujus idonei, gustandum; & aquæ frigidæ cyathi tres bibendi sunt, siquidem vomitus fauces exasperavit. Qui vomuit, si mane id fecit, ambulare debet, tum ungi, deinde cœnare: si post cœnam, postero die lavari, & in balneo sudare. Huic proximus cibus medicocris utilior est: isque esse debet cum pane hesterno, vino austero meraco, & carne assa, cibisque omnibus quam siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius

lius consulat, si biduo p continuarit, quam si post quintum decimum diem vomuerit; nisi hæc mora gravitatem pectori faciet.

De Dejectionibus.

Dejectio autem à medicamento quoque petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoque inflationes, caligines, capitis dolores, aliaque superioris partis mala increscunt. Quid enim inter hæc adjuvare possunt quies & inedia, per quæ illa maxime eveniunt? Qui deicere volet, primum cibis vinisque utatur his, quæ hoc præstant. Dehinc, si parum illa proficiunt, aloen sumat. Sed purgationes quoque, ut interdum necessariae sunt, sic, ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus; & ob hoc infirmum erit: cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit.

De his, quæ calefaciunt & refrigerant corpus.

p. 105.

Calefaciunt unctio, aqua q salsa, magisque si calida est; omnia salsa, vinum austerrum. Contraria refrigerant, in jejunio, amara, carnosa; si post cibum est, balneum, & somnus, nisi nimis longus est, & omnia acida; aqua quam frigidissima; oleum, si aqua miscetur; & lotus.

De his, quæ humidant, & siccant.

Humidant autem corpus labor minor, quam ex consuetudine, frequens balneum; cibus plenior, multa potio; post hanc, ambulatio, & † vigilia. Per se quoque ambulatio multa & vehemens, & matutinæ exercitationi

tationi non protinus cibus adjectus; ea genera escæ, quæ veniunt ex locis frigidis, & pluviis, & riguis. Contra siccant immodica exercitatio, fames, unctio, sine aqua calor, sal immodicus, frigida aqua, & cibus exercitationi statim subjectus, & is ipse ex siccis & æstuosis locis veniens.

De his, quæ alvum adstringunt & solvunt.

106. Alvum adstringit labor, sedile, creta 100

107. figularis corpori illita, cibus imminutus, & is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet: exigua potio, neque adhibita, nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit: post cibum quies. Contra 157 solvit aucta ambulatio atque escæ, motus qui post cibum est, subinde potiones cibo immixtæ. Illud quoque scire oportet, 69, 28. quod ventrem vomitus solutum comprimit, compressum solvit. Itemque comprimit 201 is vomitus, qui statim post cibum est: solvit is, qui tarde supervenit.

De ætatum varietate.

19, 21. Quod ad ætates vero pertinet, in ætatem facillime sustinent s mediæ ætates, minus 25 juvenes, minime pueri & senectute confecti. Quo minus fert facile quisque, eo sæpius debet cibum assumere; maximeque eo eget, t qui increscit. Calida lavatio, & pueris & senibus apta est. Vinum dilutius pueris, 30 senibus meracius, neutri ætati, quæ inflationes movent. Juvenum minus, quæ assumant, & quomodo curentur, interest. Quibus juvenibus fluxit alvus, plerumque in

in senectute contrahitur. Quibus in adolescentia fuit adstricta, sæpe in senectute solvitur. w Melior est autem in juvene fusior, in sene adstrictior.

De varietate temporum.

Tempus quoque anni considerare oportet. Hieme plus esse x convenit; minus, sed 19, 23. meracius bibere; multo pane uti, carne potius elixa, modice oleribus; semel die cibum capere, nisi si nimis venter adstrictus est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, & ipsum siccum sine carne, sine portione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, vel calorem 15 moventibus. Venus tum non æque perniciofa est. At vere y paulum cibo demendum, adjiciendumque portioni, sed dilutius tamen bibendum est: magis carne utendum, magis oleribus, transcendendum paulatim ab elixis ad assa. Venus eo tempore anni tutissima est.

De diata ciborum potionumque.

Æstate vero & z portione & cibo sæpius corpus eget; ideo prandere quoque commodum est. Eo tempore aptissima sunt & caro & olus: portio quam dilutissima, ut & sitim tollat, nec corpus incendat: frigida lavatio, caro assa, frigidi cibi, vel qui refrigerent. Ut sæpius autem cibo utendum, 21, 2. sic exiguo est.

Autumnalis diata.

Per autumnum vero, propter a coeli varietatem, periculum maximum est. Ita- 42, 21. que neque sine veste, neque sine calcea-

C

mentis

w Aph. 11. 53. x De Sal. diæt. 1. 2. De diæt. 111. 111. N. 11. 12. 13. Aph. 1. 15. Orib. Sard. de Viæt. rat. Ægin. 1. 53. y De Sal. diæt. 1. 8. z De Diæt. sal. 1. 17. a Aph. 111. 4.

mentis prodire oportet, præcipueque diebus frigidioribus, neque sub divo noctu dormire, aut certe bene operiri. Cibo vero jam paulo ^b pleniore uti licet; minus, sed, meracius bibere. Poma ^c nocere quidam ⁵ putant, quæ immodice toto die plerumque sic assumuntur, ut ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed ^d consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quam in his noxa est. Sed his uti non ¹⁰⁰ sæpius, quam alio cibo convenit. Denique aliquid densiori cibo, cum hic accedit, necessarium est demi. Neque ^e æstate vero, neque autumnio utilis venus est. Tolerabilior tamen per autumnum: æstate in to- ¹⁵⁵ tum, si fieri potest, abstinendum est.

C A P. IV.

De his, quibus Caput infirmum est.

PROXIMUM est, ut de his dicam qui ²⁰ partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is si bene concoxit, leniter perfricare id mane manibus suis debet; nunquam id, si fieri potest, veste velare, aut ad cutem tondere: ²⁵⁵ utileque lunam a vitare, maximeque ante ipsum lunæ solisque concursus: sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere: multum ambulare; sed, si licet, neque sub tecto, neque ³⁰⁰ in sole: utrique autem vitare solis ardorem, maximeque post cibum & vinum: potius ungi, quam lavari; nunquam ad flammam ungi, interdum ad prunam. Si in balneum venit,

^b De Salubr. Diæt. I. 25. ^c Æginet. I. 53. de Affect. L. I. 3. ^d Aphor. II. 51. Actuar. M. M. III. 9. ^e Aëtius Tetrab. I. Serm. III. c. 8. a Macrobi Saturn. VII. 16.

venit , sub veste primum paulum in tepidario insudare , ibi ungi , tum transire in calidarium : ubi sudarit , in solum non descendere , sed multa calida aqua per caput
5 se totum perfundere , tum tepida , dein frigida ; diutiusque ea caput , quam cæteras partes perfundere ; deinde id aliquandiu perfricare ; novissime detergere & ungere. Capiti nihil æque prodest atque aqua fri-
10 gida. Itaque is , cui hoc infirmum est , per ætatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subjicere. Semper autem , etiam si sine balneo unctus est , neque totum corpus refrigerari sustinet , caput ta-
15 men aqua frigida perfundere. Sed cum cæteras partes attingi nolit , demittere id , ne ad cervices aqua descendat ; eamque , ne quid oculis , aliisve partibus noceat , defluentem subinde manibus ad hoc regere-
20 re. Huic modicus cibus necessarius est , quem facile concoquat : isque , si jejuno caput læditur , assumendus etiam medio die est : si non læditur , semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutum lene , quam
25 aquam magis expedit ; ut , cum caput gravius esse cœperit , sit , quo confugiat : eique ex toto neque vinum , neque aqua semper utilia sunt : medicamentum utrumque est , cum invicem assumitur. Scribere , legere ,
30 voce contendere , huic opus non est , utique post cœnam : post quam nec cogitatio
quidem ei satis iuta est ; maxime tamen vomitus alienus est. ^{36, 5.} ^{39, 30.} ^{24, 8.}

CAP. V.

De his, qui lippitudine, gravedine, destillatione, tonsillisque laborant.

35, 9.

NEQVE vero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus aquæ frigidæ prodest; sed iis etiam, quos assiduæ lippitudo; gravedines, destillationes, tonsillæque male habent. His autem non caput tantum quotidie perfundendum; sed
 22, 24. os quoque multa frigida aqua fovendum est: præcipueque omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi gravius cœlum Austri reddiderunt. Cum
 24. 8. que omnibus inutilis sit post cibum aut contentio, aut fatigatio animi; tum his præcipue, qui vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueverunt, vel quolibet alios oris affectus. Vitari etiam gravedines, destillationesque possunt, si quam
 2. 80. minime is, qui his opportunus est, aërem vel loca aquasque mutat; si caput in sole protegit, ne incendatur, neve subitum ex repentino nubilo frigus dimoveat: si post
 2. 55. concoctionem jejunos caput radit: si post cibum neque legit, neque scribit.

CAP. VI.

Ad solutam Alvum remedia.

QUEM vero frequenter citæ alvus
 3. 0. exercet, huic opus est pila similibusque superiores partes exercere; dum jejunos est, ambulare; vitare solis nimium ardorem, continua balnea
 . ungi

ungi citra sudorem ; non uti cibis variis ,
 minimeque jurulentis aut leguminibus ,
 oleribusve his , quæ celeriter descendunt ;
 omnia denique sumere , quæ tarde conco-
 5 quuntur. Venatio, durique pisces , & ex
 domesticis animalibus assa caro maxime 108, 1.
 juvant. Nunquam vinum falsum bibere
 expedit, ne tenue quidem ; aut dulce ; sed
 austerum , & plenius, neque id ipsum per-
 10 vetus. Si mulso uti voter , id ex decocto
 melle faciendum est. Si frigidaë potiones
 ventrem ejus non turbant , his utendum
 potissimum est. Si quid offensæ in cœna
 sensit , vomere debet ; idque postero quo-
 15 que die facere : tertio , modici ponderis pa-
 nem ex vino esse ; aut ova fricta ex oleo ,
 vel ex defruto , similibusque aliis : deinde
 ad consuetudinem redire. Semper autem 24, 8.
 post cibum conquiescere , ac neque inten- 22, 28.
 20 dere animum , neque ambulatione quamvis
 leni dimoveri.

CAP. VII.

Remedia ad coli dolorem.

5 **A**T s i laxius intestinum dolere con-
 suevit , quod *κόλον* nominant , cum
 id nihil nisi genus inflationis sit , id agen-
 dum est , ut concoquat aliquis ; ut lectione ,
 & aliis generibus exerceatur ; utatur balneo
 10 calido , cibis quoque & portionibus calidis ;
 denique omnimodo frigus evitet , item dul-
 cia omnia , leguminaque , & quicquid in-
 flare consuevit.

CAP. VIII.

Quæ agenda sint Stomacho laborantibus.

SI QUI S vero stomacho laborat, legere
clare debet; post lectionem ambulare;
tum pila, vel armis, aliove quo genere,
quo superior pars moveretur, exerceri. Non
aquam, sed vinum calidum bibere jejunos.
Cibum bis die assumere; sicutamen, ut faci-
le concoquat. Uti vino tenui & austero;
& post cibum, frigidis potionibus potius.
Stomachum autem infirmum indicant pal-
lor, macies, præcordiorum dolor, nau-
sea, & nolentium vomitus, in jejuno do-
lor capitis. Quæ in quo non sunt, is fir-
mi stomachi est. Neque credendum uti-
que nostris est, qui cum in adversa valetu-
dine vinum aut frigidam aquam concu-
perunt, deliciarum patrociniū in accusa-
tionem non merentis stomachi habent. At,
qui tarde concoquunt, & quorum ideo,
præcordia instantur, quive propter ardo-
rem aliquem noctu † sitire consueverunt,
ante quam conquiescant, duos tresve cya-
thos per tenuem fistulam bibant. Prodest
etiam adversus tardam concoctionem cla-
re legere, deinde ambulare, tum vel ungi
vel lavari; assidue vinum frigidum bibe-
re; & post cibum, magnam potionem, sed,
ut supra dixi, per siphonem: deinde omnes
24, II. potiones aqua frigida includere. Cui vero
cibus acescit, is ante eum bibere aquam
egelidam debet, & vomere. At si cui ex
hoc frequens dejectio incidit, quotiens
alvus

Cap. 9. MEDICINA. 39
alvus ei constitit , frigida potione potissimum utatur.

C A P. IX.

Quid observandum sit dolore Nervorum laborantibus.

SI CUI vero dolere nervi solent , quod in podagra chiragra esse consuevit , huic , quantum fieri potest , exercendum id est , quod affectum est , obijciendumque labori & frigori : nisi cum dolor increvit ; sub quo quies optima est. Venus semper inimica est. Concoctio , sicut in omnibus corporis affectibus , necessaria. Crudititas enim id maxime lædit , & quotiens offensum corpus est , vitiosa pars maxime sentit. Ut concoctio autem omnibus vitiis occurrit , sic rursus aliis frigus , aliis calor. Quæ sequi quisque pro * habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni , tenui , vulneri , a præcordiis , intestinis , 46, 14. vesicæ , auribus , coxis , scapulis , naturalibus , ossibus , dentibus , nervis , vulvæ , cerebro. Idem summam cutem facit pallidam , 75, 34. aridam , e duram , nigram. Ex hoc horrores tremoresque nascuntur. At prodest d juvenibus , & omnibus plenis. Erectiorque mens est , & melius concoquitur , ubi frigus quidem est , sed cavetur. Aqua vero frigida 30 infusa , præterquam capiti , etiam stomacho 35, 9. prodest. * Item articulis doloribusque , qui sunt sine ulceribus. † Item rubicundis nimis hominibus , si dolore vacant. Calor autem adjuvat omnia , quæ frigus infestat : item

C 4 lip-

* Aph. iii, 2. a Aph. v, 24. b. Aph. v, 18. c Aph. v, 20. d Aph. v, 21. * Aph. v, 25. † Aph. v, 23.

lippientes, si nec dolor, nec lachrymæ sunt: nervos * quoque, qui contrahuntur; præcipueque ea ulcera, quæ ex frigore sunt. Idem corporis colorem bonum facit: urinam movet. Si nimius est, corpus 28, 22. effœminat, nervos † emollit, stomachum solvit. Minime vero aut frigus aut calor tuta sunt, ubi ‡ subita insuetis sunt. Nam frigus, lateris dolores, aliaque vitia; frigida aqua, strumas excitat. Calor concoctionem prohibet, somnum aufert, sudore digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

C A P. X.

Observatio in Pestilentia.

EST etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, navigare. Ubi 20 id non licet, gestari, ambulare sub divo, ante æstum, leniter; eodemque modoungi: &, ut supra comprehensum est, vitare 22, 4. fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem; multoque magis se continere. 25 Si qua gravitas in corpore est, tum neque mane surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, minimeque post cibum, aut balneum; neque jejuno, neque cœnato vomendum est: neque movenda alvus; 30 atque etiam, si per se mora est, comprimenda est. Abstinendum potius, si plenius corpus est. Itemque vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, utique si ci-

* Aphor. v. 22. e Aphor. v. 16. † Aphor. v. 22.
‡ Aphor. III. I.

si cibus quoque antecessit ; qui tamen semel die tunc commodius assumitur ; insuper etiam modicus , ne cruditatem moveat. Alternis diebus invicem , modo aqua , modo vinum bibendum est. Quibus servatis , ex reliqua victus consuetudine quam minimum mutari debet. Cum vero hæc in omni pestilentia facienda sunt , tum in ea maxime , quam Austri excitarint.

Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt , ubi gravi tempore anni discesserunt ex suis sedibus , vel ubi in graves regiones venerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit , utique abstinere debebit : atque ita à vino ad aquam , ab hac ad vinum , eo , qui supra positus est , modo , transitus ei esse.

LIBER SECUNDUS.

Præfatio.

INSTANTIS autem valetudinis signa complura sunt. In quibus explicandis non dubitabo authoritate antiquorum virorum uti , maximeque Hippocratis ; cum recentiores quo-

que medici , quamvis in curationibus mutarint , tamen hæc illum optime præfagisse fateantur. Sed antequam dico , quibus præcedentibus morborum tumor subsit ; non alienum videtur exponere , quæ tempora anni , quæ tempestatum genera , quæ partes ætatis , qua-

lia corpora maxime tuta vel periculis opportuna sint, quod genus adversæ valetudinis in quoque timeri maxime possit. Non † quod non omni tempestatum genere, omnis ætatis, omnis habitus homines per omnia genera morborum & ægrotent & moriantur; sed quod frequentius tamen quædam eveniant. Ideo utile est scire unumquemque, quid, & quando maxime caveat.

C A P. I.

10

Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora vel tuta vel morbis opportuna sunt, & quod valetudinis genus in quoque timeri possit.

15

IGITUR saluberrimum † ver est: proxime deinde ab hoc, hiems: periculosior ætas, autumnus * longe periculosissimus. Ex tempestatibus vero optimæ † æquales sunt, 20 sive frigidæ, sive calidæ: pessimæ, quæ 33, 31. maxime variant. Quo fit, ut a autumnus plurimos opprimat. Nam fere meridianis temporibus calor: nocturnis atque matutinis, simulque etiam vespertinis, frigus est. 25 Corpus ergo, & æstate, & subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit, sic quandocunque evenit, noxiū est. Ubi æqualitas autem est, saluberrimi sunt b sereni 30 dies: meliores pluvii, quam tantum nebulosi, nubilive: optimique hieme, qui omni vento vacant: æstate, quibus Favonii perfiant. Si genus aliud ventorum est, salubriores

† Aph. III. 19. † Aph. III. 9. * Aph. III. 9.

† Aph. III. 8. a Aphor. III. 9. b Aphor. III. 15.

briores Septentrionales, quam Subsolani, vel * Austri sunt. Sic tamen hæc, ut interdum regionum sorte mutantur. Nam fere ventus ubique à mediterraneis regionibus veniens, salubris; à mari, gravis est. Neque solum in bono tempestatum habitu certior valetudo est; sed peiores morbi quoque, si qui inciderunt, leviores sunt, & promptius finiuntur. Pessimum ægro est cœlum, quod ægrum fecit; adeo ut in id quoque genus, quod naturâ peius est, in hoc statu salubris † mutatio sit. Ætas media, tutissima est: quia neque juventæ calore, neque senectutis frigore infestatur. Longis morbis senectus, acutis adolescentia magis patet. 47, 8.
Corpus autem habilissimum quadratum est, neque gracile, neque obesum. Nam longa c statura, ut in juventa decora est, sic matura senecture conficitur. Gracile corpus infirmum: obesum hebes est. Vere tamen maxime, quæcunque d humoris motu novantur, in metu esse consueverunt. Ergo tum lippitudines, pustulæ, profusio l sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀποσήματα Græci nominant, bilis atra, quam μελαγχολίαν appellant, insania, morbus comitialis, angina, gravedines, destillationes oriri solent. Hi quoque morbi qui in articulis nervisque modo urgent, modo quiescunt: tum 238, 4.
maxime & inchoantur & repetunt. At æstas e non quidem vacat plerisque * his morbis; sed adjicit febres, vel ardentes, vel tertianas, vomitus, alvei dejectiones, auricularum dolores, ulcera oris, caneros, cum in cæteris

* Galen de Theriac. l. i. c. ii. p. 945. T. 13. † Aph. 111. 3. c Dicæarch. Geogr. c. x. p. 56. Aph. 111. 54. ‡ Soran. Ephes. Isag. c. 5. d Aph. 111, 20. e Aph. 111, 21. * Soran. Ephes. Isag. c. 5.

cæteris quidem partibus , tum maxime ob-
 scœnis ; & quicquid sudore hominem resol-
 vit. Vix quicquam ex his in autumnum non
 incidit : sed oriuntur eo quoque tempore fe-
 bres incertæ , lienis dolor , aqua inter cutem ,
 167. tabes , quam Græci φθίσιν nominant ; urinæ
 difficultas , τραγχερίαν quam appellant ; te-
 nuioris intestini morbus , quem εἰλεὸν nomi-
 nant. Fit item lævitas intestinorum , quæ
 λειεντερία vocatur ; cœxæ dolores , morbi 10
 comitiales. Idemque tempus & diutinis
 malis fatigatos , & ab æstate , etiam proxi-
 ma pressos interimit ; & alios novis mor-
 bis conficit ; & quosdam longissimis impli-
 cat , maximeque quartanis , quæ per hie- 15
 mem quoque exerceant. Neque aliud ma-
 gis tempus pestilentix patet , cujuscumque
 ea generis est ; quamvis variis rationibus
 nocet. Hiems autem g capitis dolores , tuf-
 sim , & quicquid in faucibus , in * lateribus , 20
 in visceribus mali contrahitur , irritat.

Ex tempestatibus , † Aquilo tussim mover ,
 fauces exasperat , ventrem hadstringit , uri-
 nam supprimit , horrores excitat , item dolo-
 rem lateris & pectoris. Sanum tamen † corpus 25
 spissat , & mobilius atque expeditius red-
 dit. Auster i aures hebetat , sensus tardat ,
 capitis dolorem mover , alvum solvit , to-
 tum corpus efficit hebes , humidum , lan-
 guidum. Cæteri venti , quo huic vel illi 30
 propiores sunt , eo magis vicinos his il-
 lisve affectus faciunt. Calor omnis & je-
 cur & lienem inflammat , mentem hebe-
 rat , & ut k anima deficiat , ut sanguis pro-
 rumpat ,

f Aph. III. 22. g Aph. III. 23. † Cæl. Aurel.
 Acut. Morb. II. * Aph. III. 5. h Aph. III. 17. 13.
 † Aph. III. 17. i Aph. III. 17. k Aph. V. 16.

rumpat, efficit. Frigus modo i nervorum distentionem, modo rigorem infert; illud *σπασμὸς*, hoc *τέτανος* Græce nominatur: nigrorum in ulceribus, & horrorem in febribus excitat. In siccitatibus, * acutæ febres, lippitudines, † tormina, urinæ difficultas, articulorum dolores oriuntur. Per imbres, m longæ febres, alvi dejectiones, angina, cancri, morbi comitiales, resolutio nervorum, quam *παράλυσιν* Græci nominant. 178.
 Neque solum interest, quales dies sint, sed etiam quales ante præcesserint. Si hiems sicca Septentrionales ventos habuit, ver autem Austros & pluvias exhibet, fere 15 subeunt n lippitudines, tormina, febres, maximeque in mollioribus corporibus, præcipue in muliebribus. Si vero, Austri o pluviaeque hiemem occuparunt, ver autem frigidum & siccum est, gravidæ quidem 20 sceminæ, quibus tum adest partus, abortu periclitantur: hæ vero quæ gignunt, imbecillos, vixque vitales edunt. Cæteros lippitudo arida, & si seniores sunt, gravedines atque destillationes male ha- 25 bent. At si à prima hieme Austri ad ultimum ver continuarint, laterum dolores, & insania febricitantium, quam *Φρενίτιν* ap- 148. pellant, quam celerrime rapiunt. Ubi vero calor à primo vere orsus æstatem quoque 30 similem p exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi. At si sicca æstas q Aquilones habuit, autumnus vero imbres Austrique sunt, tota hieme, quæ proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibusdam etiam tabes

l Aph. v. 17. * Aph. III. 7. † III. 16. m Aph. III. 16. n Aph. III. 11. o Aph. III. 12. p Aph. III. 6. q Aph. III. 13.

tabes oritur. Sin autem autumnus quoque æque siccus r iisdem Aquilonibus perflatur, omnibus quidem mollioribus corporibus, inter quæ muliebria esse proposui, secunda valetudo contingit: durioribus vero insta- 5 re possunt, aridæ lippitudines, & febres partim acutæ, partim longæ, & hi morbi, qui ex atra bile nascuntur.

f Quod ad ætates vero pertinet, pueri proximique his vere optime valent, & æstate 10 prima tutissimi sunt: senes æstate & autumni prima parte: juvenes hieme, quique inter juventam senectutemque sunt. Inimicior 39, 21. senibus hiems, æstas adolescentibus est. Tum si qua imbecillitas oritur, proximum est, ut 13 infantes, tenerosque adhuc pueros serpentia t ulcera oris, quæ ἀφθας Græci nominant, 326, vomitus, nocturnæ vigiliæ, aurium humor, 10. circa umbilicum inflammationes exerceant. Propria etiam v dentientium, gingiva- 20 rum exulcerationes, distentiones nervorum, febriculæ, alvi dejectiones, maximeque caninis dentibus orientibus male habent. Quæ pericula plenissimi cujusque sunt, & cui maxime venter adstrictus est. At ubi 25 ætas paulum processit, w glandulæ, & vertebrarum, quæ in spina sunt, aliquo inclinationes, strumæ, verrucarum quædam genera dolentia, ἀροχορδόνας Græci appell- 30 lant, & plura alia tubercula oriuntur. In- 30 cipiente vero jam pube, x ex iisdem multa, & longæ febres, & sanguinis ex naribus cursus. Maximeque omnis pueritia, y primum circa quadragesimum diem, deinde septimo

r Aph. III. 4. f Aphor. III. 18. t Aphor. III. 24. v Aphor. III. 25. w Aphor. III. 26. x Aph. III. 27. y Aphor. III. 28.

septimo mense , tum septimo anno , postea circa pubertatem periclitatur. Siqua etiam genera morborum in infantem inciderunt , ac neque pubertate , neque primis coitibus ,
 5 neque in scēmina primis mēstruis finita * ^{172,}
 sunt , fere longa sunt : sēpius tamen his ^{17.}
 morbi pueriles , qui diutius manserunt , terminantur. Adolescentia z morbis acutis , ^{43, 15.}
 item comitialibus , tabique maxime obje-
 10 cta est : fereque juvenes sunt , qui sangui- nem exspuunt. Post hanc aetatem a laterum & pulmonis dolores , lethargus , cholera , insania , sanguinis per quædam etiam velut
 ora venarum , ἀιμορροϊδας Græci appellant , ^{62, 12.}
 15 profusio. In senectute , b spiritus & urinæ ^{401.}
 difficultas , gravedo , articulorum & renum ^{494.}
 dolores , nervorum † resolutiones , malus corporis habitus , καχεξία Græci appellant ,
 nocturnæ vigiliæ , vitia longiora aurium ,
 20 oculorum , etiam narium , præcipueque solu- ta alvus , & , quæ sequuntur hanc , tormina , vel lævitas intestinorum , cæteraque fusi ventris mala. Præter hæc graciles , tabes , dejectiones , destillationes , item viscerum
 25 & laterum dolores fatigant. Obesi plerun- que acutis morbis , & difficultate spirandi , strangulantur , subitoque c sæpe moriuntur , quod in corpore tenuiore vix evenit.

CAP. II.

De signis adversæ valetudinis futuræ.

ANTE adversam autem valetudinem , ut supra dixi , quædam notæ oriun- tur ; quarum omnium commune est ,

* Aph. III. 28. z Aphor. III. 29. a Aph. III. 30. b Aphor. III. 31. † Aphor. III. 21. VI. 57. c Aph. II. 44.

est, aliter se corpus habere, atque consuevit; neque in pejus tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, a suspecta habere bona sua debet. Quæ quia neque in eodem habitu subsistere, neque ultra progredi possunt, fere retro, quasi ruina quadam, revolvuntur. Pejus tamen signum est, ubi
 58, 19. aliquis contra consuetudinem emacuit, &
 51, 22. colorem decoremque amisit: quoniam in 10
 53, 24. his, quæ superant, est quod morbus demat; in his quæ desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter hæc, protinus timeri debet, si graviora membra sunt; si crebra ulcera oriuntur; si corpus supra consuetu- 15
 dinem * incaluit; si gravior somnus pressit; si tumultuosa somnia fuerunt; si sæpius expergiscitur aliquis, quam assuevit, deinde iterum soporatur; si corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudinem 20
 † insudat, maximeque si circa pectus, aut cervices, aut crura, vel genua, vel coxas. Item, si marcet animus: si loqui & moveri piget; si corpus torpet; si dolor præcordiorum est, aut totius pectoris, aut, qui in 25
 plurimis evenit, capitis; si salivæ plenum est os; si oculi cum dolore vertuntur; si tempora astricta sunt; si membra inhorrescunt; si spiritus gravior est; si circa frontem intentæ venæ moventur; si frequen- 30
 tes oscitationes; si genua quasi fatigata sunt, totumve ‡ corpus lassitudinem sentit. Ex quibus sæpe plura, nunquam non aliqua febrem antecedunt. In primis tamen illud
 con-

* Aphor. I. 3. † Aphor. IV. 39. ‡ Aphor. IV. 38.
 † Aphor. II. 5.

considerandum est, num cui sæpius horum aliquid eveniat, neque ideo corporis ulla difficultas subsequatur. Sunt enim quædam proprietates hominum, sine qua-
 5 rum notitia non facile quicquam in futurum præfagiri potest. Facile itaque securus est in his aliquis, quæ sæpe sine periculo evasit. Ille sollicitari debet, cui hæc nova sunt; aut qui ista nunquam sine custodia
 10 sui tuto habuit.

CAP. III.

Quæ bona in ægrotantibus signa sint.

15 **U**B I vero febris aliquem occupat, sci-
 re licet, non periclitari, si in latus aut dextrum aut sinistrum, ut ipsi in usu est, cubat^a, cruribus paulum reductis; qui fere sani quoque jacentis habitus est: si facile convertitur; si noctu dormit, si inter-
 20 diu vigilat; si ex facili spirat; si non confli-
 ctatur; si circa umbilicum^b & pubem cutis^c
 plana est; si præcordia ejus sine ullo sensu doloris æqualiter mollia in utraque parte sunt: quod si paulo tumidiora sunt, tamen
 25 digitis cedunt & non dolent. Hæc valetudo, ut spacium aliquod habebit, sic tuta erit. Corpus quoque, quod æqualiter molle & calidum est, quodque æqualiter totum insudat, & cujus febricula[†] eo sudore fini-
 30 tur, securitatem pollicetur. Quando jam ad sanitatem venit corpus, stertnutamentum etiam inter bona indicia est, & cupiditas^d cibi vel à principio servata, vel etiam post fastidium orta. Neque terrere debet

D

ca

^a Actuar. M. Med. 11. 3. ^b Aph. 11. 35. ^c De Judicat. 1, 3. [†] Aph. 11, 55. ^d Aphor. 11, 32.

ea febris, quæ eodem die finita est : ac ne ea quidem, quæ, quamvis longiore tempore tenuit, tamen ante alteram accessionem ex toto quievit, sic, ut corpus integrum, quod *εὐλαμπές* Græci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse ex bile & pituita debet : & in urina subsidere album, læve e, æquale ; sic ut etiam, si quæ quasi nubeculæ innatarint, in imum deferantur. Ac venter ei, qui à periculo tutus est, reddit 100 mollior, figurata, atque eodem fere tempore, quo secunda valetudine assuevit, modoque convenientia his, quæ assumuntur. Pejor citata alvus est, sed ne hæc quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta 15 magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, & rufa est, neque fœditate odoris similem alvum sani hominis excedit. Ac lumbricos quoque aliquos sub fine morbi descendisse nihil nocet. Si inflatio sine inflammatione in superioribus partibus † dolorem tumoremque fecit, bonum signum est sonitus ventris inde ad inferiores partes devolutus ; magisque etiam, si sine difficultate, cum stercore excessit. 25

C A P. IV.

Mala signa agrotantium.

54, 28. **C**ONTRA gravis morbi periculum est, ubi supinus ager jacet, porrectis 30 manibus, & cruribus : ubi residere vult in ipso acuti morbi impetu, præcipueque pulmonibus laborantibus : ubi nocturna vigilia premitur, etiamsi interdum somnus

e De Judicat. 1, 8. f De Judicat. 1, 6. g. De Judicat. 1, 7. Prænot. x, 1. Aph. 1v. 74.

nus accedit, ex quo tamen pejor est, qui inter quartam horam & noctem, quam qui à matutino tempore ad quartam. Pessimum tamen est, si somnus neque noctu, neque interdiu accedit: id enim fere sine continuo a delirio esse non potest. Neque vero ^{64, 16.} signum bonum est, somno ultra ^{54, 33.} debitum urgeri: pejusque, quo magis sopor interdiu, noctuque continuat. Mali etiam morbi testimonium est vehementer & crebro spirare, à sexto ^c die cœpisse inhorrescere: ^{49, 20.} pus expuere: vix excreare: dolorem habere ^{56, 3.} continuum: difficulter ferre morbum: jactare brachia & crura: sine voluntate ^d la- ^{54, 31.} chrymare: habere humorem e glutinosum ^{54, 14.} dentibus inhaerentem; cutem circa ^f umbi- ^{49, 21.} licum & pubem macram; præcordia ^g inflammata, dolentia, dura, tumida, intenta; magisque, si hæc dextra parte quam sinistra sunt: periculosissimum tamen est, si venæ quoque ibi vehementer agitantur. Mali etiam morbi signum est, nimis celeriter ^{48, 9.} emacrescere: caput & pedes manusque [†] frigidas habere, ventre & lateribus calentibus; aut frigidas ^h extremas partes acuto ^{55, 22.} morbo urgente; aut post sudorem ⁱ inhor- ^{285.} rescere; aut post vomitum ^k singultum esse, ^{27.} vel rubere oculos: aut ^l post cupiditatem cibi, postve longas febres hunc fastidire; ^{53, 17.} aut multum sudare, maximeque frigido ^{56, 11.} sudore; aut habere sudores non per totum ^{301.} corpus æquales, quique febrem non finiant. ^{24.} Malæ etiam febres, quæ quotidie tempore eodem revertantur; quæve semper pares

D 2

acces-

a Aph. vii, 18. b Aph. ii, 3. c A. h. i, 29. d Aph. xv, 52. viii, 2. e Aph. iv, 53. f A. h. ii, 35. g Aph. xi, 28. † Aph. vi, 11, 12. h. Aph. i, 26. i Aph. vii, 4. k Aph. vii, 3. l Aph. vii, 6.

accessiones habeant, neque^m tertio quoque die
 leventur; quæve sic continuent, ut per ac-
 cessiones increſcant, per decessiones tan-
 tum molliantur, nec unquam integrum
 corpus dimittant. Pessimum est, si ne leva-
 175, tur quidem febris, sed æque concitata con-
 55, 20, tinuat. Periculosum est etiam, post arqua-
 13, tum n morbum febrem oriri; utique si præ-
 cordia dextra parte dura manserunt, aut
 dolentibus iis læva. Nulla acuta febris le- 100
 viter terrere nos debet. Neque unquam
 in acuta o febre, aut a somno non est terribi-
 lis nervorum distentio. Timere etiam ex
 somno p, mali morbi est. Itemque in prima
 febre protinus mentem esse turbatam, 15
 membrumve aliquod esse resolutum. Ex
 quo casu quamvis vita redditur, tamen id
 56, 13, fere membrum debilitatur. Vomitus etiam
 296, periculosus est sinceræ pituitæ vel bilis;
 10, pejorque, si viridis, aut niger est. At mala 20
 56, 17, urina est, in qua subsidunt subrubra aut
 livida: deterior, in qua quasi fila quædam
 tenuia atque alba: pessima ex his, si tan-
 quam ex furforibus factas nubeculas re-
 præsentat. Diluta quoque, atque alba, vi- 25
 tiosa est, 1 sed in phreniticis maxime. Alvus
 autem mala est, ex toto suppressa. Pericu-
 losa etiam, quæ inter febres fluens con-
 quiescere hominem in cubili non paritur;
 utique, si quod descendit, est perliquidum, 30
 aut albidum, aut pallidum, aut spumans.
 Præter hæc periculum ostendit id, quod
 excernitur, si est exiguum, glutinosum,
 56, 32, læve, album, idemque subpallidum: vel si
 est

m Aph. iv, 43. n Aph. iv, 62. o Aph. iv, 66.
 p Aph. iv, 67. q Aph. iv, 22. r Aph. iv, 72.

est aut lividum , aut biliosum , aut cruentum , aut peioris odoris , quam ex consuetudine. Malum est etiam , quod post febres longas sincerum est. 56, 33.

5 C A P. V.

De signis longæ valetudinis.

P O S T hæc indicia , notum est longum morbum fieri: sic enim necesse est , nisi occidit. Neque ulla alia spes in magnis est , quam ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat , porrigaturque in id tempus , quod curationi locum præstet. Protinus tamen signa quædam sunt , ex quibus colligere possumus , morbum , etsi non interemerit , longius tamen tempus habiturum. Ubi frigidus sudor inter febres non acutas circa caput tantum , & cervices oritur ; aut ubi , febre non quiescente , corpus * insudat ; aut ubi corpus modo b frigidum , modo calidum est , & color alius ex alio fit ; aut ubi , quod inter febres † aliqua parte abscessit , ad sanitatem non pervenit ; aut ubi æger pro spacio parum emacrescit. 56, 11. 48, 9.

25 Item , si urina modo liquida & c pura est , modo habet quædam subsidentia ; si lævia atque alba rubrave sunt , quæ in ea subsident ; aut si quasdam quasi miculas repræsentat ; aut si bullulas excirat. 60, 31.

30 C A P. VI.

De indiciis mortis.

S E D inter hæc quidem , proposiro metu , spes tamen superest. Ad ultima vero

D 3 jam

† Aph. VII. 6. a Aph. IV. 37. Coac. Pren. IV. 8, 39, 40. De Jud. VI. 9. VII. 2, 3, 4, 5. * Aph. IV. 55
b Aph. VI. 60. † Aph. IV. 51. c De Jud. VI. 1, 2. Aph. VII. 31.

jam ventum esse testantur, a nares acutæ,
 collapsa tempora, b oculi concavi, frigida
 languidaque aures & imis partibus leni-
 ter verſæ, cutis circa frontem dura & in-
 tenta, color aut niger aut perpallidus; mul-
 roque magis, si ita hæc ſunt, ut neque c vi-
 gilia præceſſerit; neque ventris reſolutio,
 neque inedia. Ex quibus cauſis interdum
 hæc ſpecies oritur, ſed uno die finiunt. Ita-
 que diutius durans, mortis index eſt. Si 100
 vero in morbo vetere d jam triduo talis eſt,
 in propinquo mors eſt: magisque, ſi præ-
 ter hæc oculi quoque lumen e reſugiunt, &
 51, 15. illachrymant; quæque in iis alba eſſe de-
 bent f rubeſcunt; atque in iisdem g venulae 155
 pallent; pituitaque in iis innatans, novissi-
 me angulis h inhaereſcit; alterque ex his mi-
 nor eſt; iique aut vehementer ſubfederunt,
 aut facti tumidiores ſunt; perque ſom-
 72, 18. numi palpebrae non committuntur, ſed in- 200
 ter has ex albo oculorum aliquid apparet;
 neque id fluens alvus expreſſit: eademque
 palpebrae pallent, & idem k pallor labra &
 nares decolorat: eademque labra, & nares,
 oculique, & palpebrae, & ſupercilia, aliqua- 25
 ve ex his pervertuntur; iſque propter im-
 becillitatem jam non audit, aut non videt.
 50, 32. Eadem mors denunciatur, ubi ager ſu-
 pinus l cubat, eiſque genua m contracta ſunt:
 ubi deorſum ad pedes ſubinde delabitur: 30
 51, 14. ubi brachia & n crura nudat, & inæquali-
 ter diſpergit, neque iis calor ſubeſt: ubi
 11, 7. hiat o: ubi aſſidue dormit: ubi is, qui men-
 tis ſuae non eſt, neque id facere ſanus ſo-
 a Præn. 11, 6. Coac. Præn. 1, 104. b Præn. 11, 7. c Præn.
 11, 13. d Præn. 11, 17. Pl. vii, 51. e Pr. 11, 19, 20. f Pr.
 11, 23. g Id. 11, 24. h Id. 11, 24. i Aphor. vi, 52. Præn.
 11, 1, 2. k Aph. iv, 49. l Præn. 111, 8. m Id. 111, 17.
 n Id. 111, 10. o Id. 111, 3. let,

let, dentibus p stridet: ubi ulcus, q quod aut 63, 22.
 are, aut in ipso morbo natum est, aridum,
 & aut pallidum, aut lividum factum est.
 Illa quoque mortis indicia sunt, * ungues, 66, 11.
 5 dignique pallidi; frigidus r spiritus: aut si
 manibus quis in febre, & acuto morbo,
 vel infania, pulmonive dolore, vel capitis,
 in veste t floccos legit, fimbriae sive diducit,
 vel in adjuncto pariete, si qua minuta e-
 10 minent, carpit. Dolores etiam circa coxas
 & inferiores partes orti, si ad viscera tran-
 sierunt, subitoque desierunt mortem sub-
 esse testantur; magisque, si alia quoque
 signa accesserunt. Neque is servari potest,
 15 qui sine ullo tumore febricitans, subito
 strangulatur, aut devorare salivam suam
 non potest: cuive in eodem febris corporis-
 que habitu cervix t invertitur, sic ut devo-
 rare æque nihil possit: aut cui simul & con-
 20 tinua febris & ultima corporis infirmitas 52, 6.
 est: aut cui, febre non quiescente, exte-
 rior pars v friget, interior sic calet, ut etiam 51, 25.
 sitim faciat: aut qui, febre æque non quies- 90, 23.
 cente, simul & w delirio & spirandi difficul-
 25 tate vexatur: aut qui, epoto x veratro, ex-
 ceptus distentione nervorum est: aut qui
 ebrius obmutuit. Is enim fere y nervorum
 distentione consumitur, nisi aut febris ac-
 cessit, aut eo tempore, quo ebrietas solvi
 30 debet, loqui cœpit. Mulier quoque gravi-
 da z acuto morbo facile consumitur: & is,
 cui somnus dolorem a auget: & cui protinus,
 in recenti morbo, bilis atra b vel infra vel
 supra se ostendit: cuive alterutro modo se

D 4

prom-

p Id. iv, 4. q Id. iv, 7, 8. * Aph. viii, 12. r Id. iv, 9.
 s Id. iv, 14. t Aph. iv, 35. v Aph. iv, 48. w Aph. iv,
 50. x Aph. iv, 16. y, 1: Coac. iv, 24. y Aph. v, 5.
 z Aph. v, 30. a Aph. ii, 1. b Aph. iv, 22.

promittit, cum jam longo morbo corpus
 51, 12. ejus esset extenuatum & confectum. Spu-
 70, 32. tum etiam ebulliosum, & purulentum, sive
 71, 2. separatim ista, sive mixta proveniunt, in-
 teritus periculum ostendunt. Ac, si circa
 septimum diem tale esse cœpit, proximum
 est, ut is circa quartumdecimum diem de-
 cedat, nisi alia signa mitiora pejorave ac-
 cesserint: quæ quo leviora graviorave
 subsequuta sunt, eo vel seriores mortem, 100
 vel maturiorem denunciant. Sudor quo-
 301, que d frigidus in acuta febre pestiferus est:
 24. atque in omni morbo vomitus, qui e variis,
 52, 18. & multorum colorum est; præcipueque, si
 malus in hoc odor est. Ac sanguinem quo- 155
 que in febre vomuisse, pestiferum est. Urina
 52, 21. vero g fulva & tenuis in magna cruditate esse
 consuevit; & sæpe, antequam spacio matu-
 rescat, hominem rapit. Itaque si talis diutius
 permanet, periculum mortis ostendit. Pes- 200
 sima h tamen est, præcipueque mortifera,
 nigra, crassa, mali odoris. Atque in viris
 quidem & mulieribus talis deterrima est.
 In i pueris vero, quæ tenuis & diluta est. Al-
 vus quoque varia, pestifera est; & quæ 255
 strigmentum, sanguinem, bilem, k viride
 aliquid, modo diversis temporibus, modo
 simul, & in mistura quadam, discreta ta-
 men repræsentat. Sed hæc quidem potest
 paulo diutius trahere. In præcipiti vero 300
 jam esse denunciat, quæ liquida, eadem-
 52, 34. que vel nigra l, vel pallida, vel pinguis est;
 53, 2. utique, si magna fœditas in odoris accessit.
 Illud interrogari me posse ab aliquo scio:
 si cer-

c Aph. IV, 23. d Præn. v, 4. e Præn. XII, 11, 12,
 13, 14. f Aph. VII, 37. g De Jud. VII, 5. h Præn.
 XI, 14, 15. i Plin. XXVII, 6. k Præn. x, 8, 9.
 l Viêt. Acut, XLVII, 1. m Præn. x, 6.

si certa futuræ mortis indicia sunt, quo-
 modo interdum deserti à medicis conva-
 lescant, quosdamque fama prodiderit in
 5 ipsis funeribus revixisse? Quinetiam vir
 jure magni nominis Democritus, ne finitæ
 quidem vitæ satis certas notas esse, propo-
 suit, quibus medici credidissent: adeo il-
 lud non reliquit, ut certa aliqua signa
 futuræ mortis essent. Adversus quod ne il-
 10 lud quidem dicam, quod in vicino sæpe
 quædam notæ positiæ, non bonos, sed im-
 peritos medicos decipiunt (quod Asclepia-
 des sciens, funeri obvius inclamavit, eum
 vivere, qui efferebatur:) * nec protinus n cri-
 15 men artis esse, si quod professoris sit. Illa
 tamen moderatius subjiciam. Conjectura- 13, 22.
 lem o artem esse medicinam, rationemque
 conjecturæ talem esse, ut cum sæpius ali-
 quando responderit, interdum tamen fal-
 20 lat. Non itaque, si quid vix p millesimo in
 corpore aliquem decipit, id fidem non ha-
 bet, cum per innumerabiles homines re-
 spondeat. Idque non in his tantum, quæ
 pestifera sunt, dico: sed in his quoque, quæ
 25 salutaria. Siquidem q etiam spes interdum
 frustratur, & moritur aliquis, de quo me-
 dicus securus primo fuit. Quæque meden-
 di causa reperta sunt, nonnunquam in pejus 18, 13.
 aliquibus vertunt. Neque id evitare huma- 19, 18.
 30 na imbecillitas in tanta varietate corporum
 potest. Sed est tamen medicinæ fides, quæ
 multo sæpius, perq; multo † plures ægros pro-
 dest. Neq; tamen ignorare oportet, in r acutis
 morbis fallaces magis notas esse & salutis, &
 mortis.

D 5

CAP.

* Soran Ephes. cap. iv. n Hipp. de Arte xv, 6-7.
 o Sext. Emp. adv. Math. l. i. c. 3. Macrobi. Sat. vii, 1,
 25. p Cic. de N. D. ii, 4. q Quintil. Declam. vii, 1,
 p. 110. † Galen. M. Med. lxi. r Aph. ii, 19.

C A P. VII.

De notis , quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit.

SE n cum proposuerim signa , quæ in o-
mni adversa valetudine communia es-
se consueverunt ; ad ea quoque transi-
bo , ut , quas aliquis in singulis morborum
generibus habere possit notas , indicem. 100
Quædam autem sunt , quæ ante febres ,
quædam quæ inter eas , quid aut intus sit ,
aut venturum sit , ostendunt. Ante febres ,
si caput grave est , aut ex somno oculi ca-
ligant , aut frequentia sternutamenta sunt , 15
circa caput aliquis pituitæ impetus timeri
potest. Si sanguis , aut calor abundat , pro-
ximum est , ut aliqua parte profluvium
48, 2. sanguinis fiat. Si sine causa quis emacres-
cit , ne in malum habitum corpus ejus de- 20
cidat , metus est. Si præcordia dolent , aut
inflatio gravis est , aut toto die non con-
cocta fertur urina , cruditatem esse manife-
stum est. Quibus diu color a sine morbo re-
gno malus est , hi vel capitis doloribus con- 25
flectantur , vel terram edunt. Qui diu ha-
bent faciem b pallidam & tumidam , aut ca-
pite , aut visceribus , aut alvo laborant. Si in
continua febre puero venter nihil reddit ,
64, 17. mutaturque ei color , nec somnus c accedit , 30
ploratque is assidue , metuenda nervorum
distentio est. Frequens autem destillatio
in corpore renui longoque , tabem timen-
dam esse testatur. Ubi pluribus diebus non descen-

a II. Præd. xxxix. 1, 2, 3. b II. Præd. xxix. 7, 8.
c Aph. vii, 18.

descendit alvus, docet, aut subitam dejectionem, aut febriculam instare. Ubi pedes tument, & longæ dejectiones sunt, aut dolor in imo ventre & coxis est, aqua inter cutem instat, sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem propositum periculum est his, quibus, cum voluntas desidendi est, venter nihil reddit, nisi & ægre & durum. Cum tumor in d pedibus est, idemque modo dextra, modo sinistra parte ventris, invicem oritur atque finitur, à jocinore id malum proficisci videtur. Ejusdem morbi nota est, ubi circa e umbilicum intestina torquentur (*σφόρον* Græci nominant) coxæque dolores manent, qui neque tempore, neque remediis solvuntur. Dolor autem articulorum, prout in pedibus, manubusve, aut alia quahbet parte sic est, ut eo loco nervi contrahantur; aut si id membrum, ex levi causa fatigatum, æque frigido, calidoque offenditur, *ποδάγραν* *χεῖρ᾽ ἄγρ᾽ αὖτε*, vel ejus articuli, in quo id sentitur, morbum futurum esse denunciat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit, hi vel capitis doloribus conficiuntur necesse est, vel in articulis aliquas exulcerationes graves habeant, vel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus feminis * menstrua non proveniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel quælibet alia pars morbo intestetur. Eademque his pericula sunt, quibus articulorum vitia, ut dolores, tumoresque, sine podagra simulibusque morbis, oriuntur

tur, & desinunt. Utique, si sæpe tempora
iisdem dolent, noctuque corpora insudant,
frons prurit, lippitudinis metus est. Si
mulier à partu vehementes dolores habet,
neque præterea signa mala sunt, circa vi- 55
gesimum diem aut sanguis per nares erum-
per, aut in inferioribus aliquid abscedet.
Quicumque etiam dolorem ingentem cir-
ca tempora & frontem habebit, ei alterutra
ratione finiet: magisque, si juvenis erit, 100
per sanguinis profusionem; si senior, per
suppurationem. Febris autem, quæ subito
sine ratione, si bonis signis finita est, fe-
re revertitur. Cui fauces sanguine & in-
terdiu & noctu replentur, sic, ut neque 14
capitis dolores, neque præcordiorum, ne-
que tussis, neque vomitus, neque febricu-
la præcesserit, hujus aut in naribus, aut in
faucibus ulcus reperietur. Si mulieri ex
inguine febricula orta est, neque causa ap- 200
paret, ulcus in vulva est. † Urina autem
crassa, ex qua quod defidit, album est, si-
gnificat circa articulos, aut circa viscera
dolorem, metumque morbi esse. Eadem
viridis, aut viscerum dolorem, tumorem- 255
que cum aliquo periculo subesse, aut cor-
pus certe integrum non esse, testatur. At
si † sanguis aut pus in urina est, vel vesica,
vel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa
carunculas h quasdam exiguas aut quasi ca- 30
pillas habet, aut si bullat, aut male k olet,
aut interdum quasi arenam, interdum
quasi sanguinem trahit, dolent autem coxæ,
quæque inter has superque pubem sunt, &
acce-

† Aph. iv, 74. Plin. xxviii. 6. † Aph. iv. 78. 81.
g Aph. iv, 75. h Aph. iv, 76. i Plin. xxviii. 6.
k Aphor. iv, 81.

accedunt frequentes ructus , interdum vomitus biliosus extremæque partes frigesunt , urinæ crebra cupiditas , sed magna difficultas est , & quod inde excretum est , aquæ simile , vel rufum , vel pallidum est , paulum tamen in eo levamenti est , alvus vero cum multo spiritu redditur , utique in renibus vitium est. At si paulatim destillat , vel si sanguis per hanc editur , & in eo quædam cruenta concreta sunt , idque ipsum cum difficultate redditur , & circa pubem interiores partes dolent , in eadem vesica vitium est. Calculosi vero his indiciis cognoscuntur. Difficulter urina redditur ; paulatimque , interdum etiam sine voluntate , † destillat. Eadem arenosa † est. nonnunquam aut sanguis , aut cruentum , aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamque quidam promptius recti , quidam resupinati , maximeque hi qui grandes calculos habent , quidam etiam inclinati reddunt , colamque extendendo , dolorem levant. Gravitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est ; atque ea cursu , omnique motu augetur. Quidam etiam , cum torquentur , pedes inter se , subinde mutatis vicibus , implicant. Fœminæ vero oras naturalium suorum manibus admotis scabere crebro coguntur. Nonnunquam , si digitum admoverint , ubi vesicæ cervicem is urget , calculum sentiunt. At , qui spumantem sanguinem excreant , his in pulmone vitium est. Mulieri gravidæ in fine modo fusæ alvus elidere partum potest. † Eidem si 73,34.
lac

† Aph. v, 80. † Aph. iv, 79. in Aph. v, 34.
† Selet. Treverius.

lacⁿ ex mammiis profluit, imbecillum est,
 quod intus gerit. Duræ maminae, sanum
 illud esse, testantur. Frequens o singultus, &
 præter consuetudinem continuus, jecur
 inflammatum esse, significat. Si p tumores
 super ulcera subito esse desierunt, idque à
 tergo incidit, vel distentio nervorum, vel
 rigor timeri potest: at, si à priore parte id
 evenit, vel lateris acutus dolor, vel insania
 expectanda est. Interdum etiam hujusmo-
 di casum, quæ turissima inter hæc est,
 47, 14. profusio alvi sequitur. Si ora q venarum,
 401, sanguinem solita fundere, subito suppressa
 17. sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequi-
 tur. Eadem tabes subit, si in lateris dolo-
 67, 2. re orta suppuratio intra r quadraginta dies
 purgari non potuit. At, si longa s tristitia
 cum longo timore & vigilia est, atræ bilis
 morbus subest. Quibus sæpe ex naribus
 fluit sanguis, his aut lienis tumet aut ca-
 20. pitis dolores sunt: quos sequitur, ut quædam
 ante oculos tanquam imagines obversen-
 tur. At, quibus magni lienes sunt, his t gingi-
 væ malæ sunt, & os olet, aut sanguis aliqua
 parte prorumpit. Quorum si nihil evenit, 25
 215, 13. necesse est in cruribus mala ulcera, & ex
 his nigræ cicatrices fiant. Quibus causa
 doloris, neque sensus ejus est, his mens la-
 borat. Si in ventrem x sanguis confluxit,
 ibi in pus vertitur. Si à coxis, & ab infe- 30
 rioribus partibus dolor in pectus transit,
 neque ullum signum malum accessit, sup-
 purationis eo loco periculum est. Quibus
 sine febre aliqua parte dolor, aut prurigo,
 cum

n Aph.v. 52. o Aph.vii. 17. p Aph.v. 65. q Aph.
 vi. 12. r Aph.v. 15. s Aph.vi. 23. t De Int. Aff. xxxiv.
 9, 10. Æg. de Re. Med. l. i. c. 49. u Aph. ii. 6.
 x Aph.vi. 20.

cum rubore & calore est , ibi aliquid suppurat. Urina quoque, quæ in homine parum sano liquida est , circa aures futuram aliquam suppurationem esse denunciat.

Hæc vero, cum sine febre quoque vel latentium , vel futurarum rerum notas habeant , multo certiora sunt , ubi febris accessit ; atque etiam aliorum morborum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est , ubi expeditior alicuius , quam sani fuit , sermo est , subitaque loquacitas orta est , & hæc ipsa solito audacior : aut ubi raro quis & vehementer spirat , venasque concitatas habet , præcordiis duris & tumentibus. Oculorum quoque frequens motus ; & in capitis dolore offusæ oculis tenebræ : vel , nullo dolore substante , somnus ereptus , continuataque nocte & die vigilia ; vel prostratum & contra consuetudinem corpus in ventrem , sic , ut ipsius alvi dolor id non coegerit ; item , robusto adhuc corpore , insolitus dentium stridor , 55, r. insaniæ signa sunt. Si quid etiam abscessit , & , antequam sputum prodiret , manente adhuc in corpore solita febre, subsedit , periculum affert primum furoris , deinde interitus. Auris a quoque dolor acutus , cum febre continua vehementique , sæpe mentem turbat : & ex eo casu juniores interdum intra septimum diem moriuntur ; seniores tardius : quoniam neque æque magnas febres experiuntur , neque æque insaniunt : ita sustinent , dum is affectus in pus vertatur. Suffusæ quoque b sanguine mulic-

mulieris mammæ, furorem venturum esse, restantur. Quibus autem longæ c febres sunt, his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre illiditur spiritus, instat his nervorum distentio. Si angina subito d finita est, in pulmonem id malum transit; idque sæpe intra septimum diem occidit: quod nisi incidat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Denique, post alvi longam resolutionem e tormina: post hæc, intestinorum lævitas oritur. Post nimias destillationes, tabes f. Post lateris g dolorem, vitia pulmonum: post hæc, h insania. Post magnos i fervores corporis, nervorum rigor, aut distentio. Ubi caput k vulneratum est, delirium: ubi vigilia l torfit, nervorum distentio: ubi vehementer venæ m supra ulcera moventur, sanguinis profluvium erit.

Suppuratio vero pluribus modis excitatur. Nam si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent, in aliquam partem id malum incumbit, sed in junioribus tantum: nam in senioribus ex ejusmodi morbo quartana fere nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura & dolentia ante n diem vigesimum hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeque in adolescentibus; utique, si inter principia aut oculorum caligo, aut 30 capitis dolores fuerunt: sed tum in inferioribus partibus aliquid abscedit. At si præcordia tumorem o mollem habent, neque habere intra sexaginta dies desinunt,

c Aph. iv, 44. d Aph. v, 10. Act. Meth. Med. i, 17.
e Aph. vii, 23, 75. f Del. in Hom. xxvii, 1. g Aph. vii, 11. h Aph. vii, 12. i Aph. vii, 13. k Aph. vii, 14. l Aph. vii, 18. m Aph. vii, 21. n Coac. Præn. ii, 228. o Coac. ii, 232. hæ-

hæretque per omne id tempus febris, tum in superioribus partibus fit abscessus: ac, si inter ipsa initia sanguis è naribus non fluit, circa aures erumpit. Cumque omnis longus tumor ad suppurationem fere spectet, magis eo tendit is, qui in præcordiis, quam is, qui in ventre est: & is qui supra umbilicum, quam is qui infra est. Si lassitudinis etiam sensus in febre est, vel in maxillis, vel in articulis aliquid abscedit.† Interdum quoque urina tenuis & cruda sic diu fertur, ut alia salutaria signa sint, exque eo casu plerunque infra transversum septum (quod *διάφραγμα* Græci vocant) fit abscessus. Dolor pulmonis, si neque per sputa, neque per cucurbitulas, neque per sanguinis detractionem, neque per victus rationem finitus est, vomicas aliquas interdum excitat, aut circa vigesimum diem, aut circa tricesimum, aut circa quadagesimum, nonnunquam etiam circa sexagesimum. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem ejus partis sensit. Sed hæ vomicæ modo à pulmone, modo à costarum parte nascuntur. Quod suppurat, ea parte, quam afficit, dolorem inflammationemque concitat, ipsumque calidius est: &, si in partem sanam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo videtur. Omnis etiam suppuratio, quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest: si febris non dimittit, eaque interdum levior est, noctu increfcit; p multus sudor oritur; cupiditas

† Aph. IV. 31. p De loc. in Hom. XXVII. 12.

tas tussiendo est, & pene nihil in tussi ex-
 creatur; oculi cavi sunt; malæ rubent; ve-
 næ sub lingua inalbescunt; in manibus
 fiunt adunci ungues; digiti, maximeque
 summi, calent; in pedibus q tumores sunt; 5
 spiritus difficiliter trahitur; cibi fastidium
 est; pustulæ toto corpore oriuntur. Quod
 si protinus initio dolor & tussis fuit, & spi-
 ritus difficultas vomica vel ante vel circa
 vigesimum diem erumpet. Si serius ista 10
 cœperint, necesse est quidem incrementum
 sed quo minus cito adfuerint, eo tardius
 solvantur. Solent etiam in gravi morbo
 ss, 6. pedes cum digitis unguibusque nigrescere.
 quod si non est mors consecuta, & reli- 15
 quum corpus convaluit, pedes tamen de-
 cidunt.

CAP. VIII.

*Quæ notæ in quoque morbi genere vel spem
 vel pericula ostendant.* 20

S EQUITUR, ut in quoque morbi ge-
 nere proprias notas explicem, quæ vel
 spem, vel periculum ostendant. Ex ve-
 fica dolenti, si purulenta a urina processit, 25
 inque eo læve & album subsedit, metum
 detrahit. In pulmonis morbo, si sputo b ipso
 levatur dolor, quamvis id purulentum est,
 tamen, si æger facile spirat, facile excreat,
 morbum ipsum non difficulter fert, potest 30
 ei secunda valetudo contingere. Neque
 inter initia terreri convenit, si protinus
 sputum mistum est rufo quodam sangui-
 ne, dummodo statim sedetur. Laterum c do-
 lores,

q De loc. in Hom. xxviii, 8. a Præn. xix, ii.
 b Præn. xiii, 16. Præd. ii, xii, 2, c Aph. v, 15.

lores, suppuratione facta, deinde intra
 quadragesimum diem purgata, finiun- 62, 15.
 tur. Si in jecinore vomica est, & ex ea
 fertur pus purum d & album, salus ei fa- 71, 13.
 cilis. Id enim malum in tunica est. Ex sup-
 purationibus vero hæ tolerabiles sunt,
 quæ in e exteriorem partem feruntur, &
 acuuntur. At ex his, quæ intus f procedunt,
 hæ leviores, quæ conclusæ cutem non af-
 ficiunt, eamque & sine dolore & ejusdem
 coloris, cujus reliquæ partes sunt, sinunt
 esse. Pus g quoque, quacumque parte erum-
 pit, si est læve, album & unius modi, sine 410,
 ullo metu est; &, quo effuso, febris proti- 34.
 nus conquievit, desieruntque urgere cibi
 fastidium & potionis desiderium. Si quan-
 do etiam suppuratio descendit in crura,
 sputumque ejusdem factum pro rufo pu-
 rulentum est, periculi minus est. At in ta-
 be ejus, qui salvus futurus est, sputum
 esse debet album, hæquale, totum, ejusdem-
 que coloris, sine pituita: eique etiam si-
 mile esse oportet, si quid in nares à capi-
 te destillat. Longe optimum est, i febrem
 omnino non esse: secundum est, tantillam
 esse, ut neque tantulum cibum impediat,
 neque crebram sitim faciat. Alvus k in hac
 valetudine ea tuta est, quæ quotidie co-
 cta, eaque convenientia his, quæ assumun-
 tur, reddit. Corpus id, quod minime tenue,
 maximeque lati l pectoris atque setosi est,
 cujusque cartilago exigua, & carnosa est.
 Super tabern si mulieri quoque suppressa
 menstrua fuerunt, & circa pectus atque

E 2

scapu-

d Aph. VII, 45. e Præn. VII, 3. f Præn. VII, 5.
 g Præn. VII, 6. h Prædict. II, XII, 2. i Præd. II,
 XII, 4. k Præd. II, XII, 5. l Præd. II, XII, 7.

scapulas dolor mansit , subitoque in sanguis
erupit , levare morbus solet : nam & tussis
minuitur , & sitis atque febriculæ desinunt.
Sed iisdem n fere , nisi redit sanguis , vomica
erumpit : quæ quo cruentior , eo melior est. 55
Aqua autem inter cutem minime terribi-
161, lis est , quæ nullo antecedente morbo cœ-
5. pit : deinde , quæ longo morbo supervenit ;
utique , si firma o viscera sunt ; si spiritus fa-
cilis ; si nullus dolor ; si sine calore corpus 10
est ; æqualiterque in extremis partibus ma-
crum est ; si venter mollis ; si nulla p tussis ; nulla
sitis ; si lingua , ne per somnum quidem , ina-
rescit ; si cibi cupiditas est ; si venter medica-
mentis movetur ; si per se * excernit mollia & 15
figurata ; si non extenuatur ; si urina , & vini
mutatione , & epotis aliquibus medicamen-
tis mutatur ; si corpus sine lassitudine est , &
motum facile sustinet : siquidem in quo om-
nia hæc sunt , is ex toto tutus est : in quo plu- 20
ra ex his sunt , is in bona spe est. Articulo-
rum vero vitia , ut podagræ chiragræque , si
73, 7. juvenes q tentarunt , neque callum induxe-
runt , solvi possunt : maximeque r tormini-
bus leniuntur , & si quocumque modo ven- 25
73, 16. ter fluit. Item morbus s comitialis ante pu-
bertatem ortus , non ægre finitur. Et , in quo
ab una parte corporis venientis accessionis
sensus incipit , optimum est à manibus pe-
dibusve initium fieri : deinde , à lateribus : 30
pessimum inter hæc , à t capite. Atque in his
quoque ea maxime prosunt , quæ per de-
jectiones excernuntur. Ipsa autem deje-
73, 25. ctio sine ulla noxa est , quæ sine febre est ;
si ce-

m II. Præd. xiv, 3. n II. Præd. xiv, 6, 7.
o II. Præd. xi, 6. p II. Præd. xi, 16. * Aph. vii, 29.
q II. Præd. xv, 6. 7. 8. r II. Præd. xv, 4. s II. Præd.
xvi, 1. Aph. v, 7. t II. Præd. xvi, 7.

si celeriter definit ; si contrectato ventre nullus motus ejus sentitur ; si extremam alvum spiritus sequitur. Ac ne tormina qui-^{224.} dem periculosa sunt, si sanguis & strigmen-
ta descendant, dum febris cæteræque ac-
cessiones hujus morbi absint : adeo ut etiam
gravida v mulier, non solum conservari
possit, sed etiam partum reservare. Pro-
destque in hoc morbo, si jam ætate aliquis
processit. Contra, intestinorum x lævitas^{226.}
facilius à teneris ætatibus depellitur : uti-
que, si ferri urina, & ali cibo corpus inci-
pit. Eadem ætas prodest & in coxæ dolore,
& humerorum, & in omni resolutione ner-
vorum. Ex quibus coxa, si sine torpore
est, si leviter friget, quamvis magnos do-
lores habet, tamen & facile & mature sana-
tur : resolutumque membrum, si nihilo
minus alitur, fieri sanum potest. Oris re-
solutio etiam, alvo cito finitur. Omnisque
dejectio y lippienti prodest. At, varix z ortus^{368,}
vel per ora venarum subita profusio sangui-^{28.}
nis vel tormina, insaniam tollunt. Hume-^{348.}
rorum a dolores, qui ad scapulas vel manus^{15.}
tendunt, vomitu atræ bilis solvuntur. Et
quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior^{76, 5.}
est. Singultus b sternutamento finitur. Lon-
gas dejectiones c supprimit vomitus. Mulier^{32, 19.}
sanguinem vomens, d profusis menstruis, li-^{202,}
beratur. Quæ menstruis e non purgatur, si^{33.}
sanguinem ex naribus fudit, omni pericu-
lo vacat. Quæ locis laborat, aut difficul-
ter f partum edit, sternutamento levatur.
Cui calor & g tremor est, saluti delirium est.

E 3

Lieno-

v II. Præd. xxx, 14. x II. Præd. xxxi, 12, 15, 16.
y Aph. vi, 17. z Aph. vi, 21. a II. Præd. xlii, 2.
b Aph. vi, 13. c Aph. vi, 15. d Aph. v, 32. e Aph.
v, 33. f Aph. v, 35. g Aph. vi, 26.

Lienosis bono^h tormina sunt. Denique, ipsa febris, quod maxime mirum videri potest, sæpe præsidio est. Nam & i præcordiorum dolores, si sine inflammatione sunt, finit; & in jocinoris k dolore succurrit; & nervorum distentionem l rigoremque, si postea cœpit, ex toto tollit; & ex difficultate urinæ morbum tenuioris intestini ortum, si urinam per calorem movet, levat. At dolores capitis, quibus oculorum caligo, & rubor cum quadam frontis prurigine accedunt, sanguinis m profusione, vel fortuita, vel etiam petita, summoventur. Si capitis, ac frontis n dolores ex vento, vel frigore, aut aestu sunt, gravedine & sternutamentis finiuntur. Febrem autem o ardentem, quam Græci καυσώδη vocant, subitus horror exolvit. Si in febre aures p obtusæ sunt, si sanguis è naribus fluxit, aut venter resolutus est, illud malum desinit ex toto. Nihil plus adversus q surditatem, quam biliosa alvus potest. Quibus in fistula r urinæ minuti abscessus, quos φύματα Græci vocant esse cœperunt; iis, ubi pus ea parte profluxit, sanitas redditur. Ex quibus cum ple-
 325, 8. raque per se proveniant, scire licet, inter ea, quæ ars adhibet, naturam plurimum posse. Contra, si caput in febre continenti dolet, neque quicquam remittit, malum atque mortiferum est: maximeque id pe-
 56, 3. riculum est pueris, à septimo anno ad quartumdecimum. In pulmonis morbo, si spu-
 36, 3. tum primis diebus non fuit, deinde à septimo die cœpit, & ultra septimum mansit,

pericu-

h Aph. vi, 48. i Aph. vi, 40. k Aph. vii, 52. l Aph. iv, 57. m Aph. vi, 10. II. præd. xxxvi, 5. n II. præd. xxxvi, 8. o Aph. iv, 58. p Aph. iv, 60. q Aph. iv, 28. r Aph. iv, 82.

periculosum est: quantoque magis mixtos, 56, 4.
 neque inter se diductos colores habet, tan-
 to deterius. Et tamen nihil pejus est, quam
 sincerum id edi, siue rufum est, siue cruen-
 tum, siue salbum, siue gluinosum, siue pal-
 lidum, siue spumans: nigrum tamen pes-
 simum est. In eodem morbo periculosa
 sunt, tussis, destillatio; etiam, quod alias
 salutare habetur, v sternutamentum. Pericu-
 losissimumque est, si hæc secuta subita x de- 72, 3.
 jectio est. Fere vero, quæ in pulmonis, ea-
 dem in lateris doloribus, & mitiora signa,
 & asperiora esse consueverunt. Ex jecinore 67, 3.
 si pus y cruentum exit, mortiferum est. At
 ex suppurationibus hæ z pessimæ sunt, quæ
 intus tendunt, sic ut exteriorem quoque
 cutem decolorent: ex his deinde, quæ in
 exteriorem partem prorumpit; tum quæ ma-
 ximæ, quæque planissimæ sunt. Quod si, ne
 rupta quidem vomica, vel pure extrinse-
 cus emisso, febris quieuit, aut quamvis
 quieverit, tamen repetit; item; si sitis est,
 si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus
 est lividum & pallidum, si nihil æger ex-
 creat nisi pituitam spumantem, periculum
 certum est. Atque ex his quidem suppara-
 tionibus, quas pulmonum morbi concita-
 runt, fere senes moriuntur: ex cæteris ju-
 niores. At in tabe sputum mixtum puru-
 lentum, febris assidua, quæ & cibi tempora
 eripit, & siti affligit, in corpore tenui pe-
 riculum subesse testatur. Si quis etiam in
 eo morbo diutius traxit, ubi capilli a fluunt;
 ubi urina quædam b araneis similia superfi-

E 4

dentia

f Præn. XIII, 6. t Præn. XIII, 8. v Aph. VI, 16.
 Coac. Præn. III, 174. Præn. XIII, 10. x Aph. V, 12
 y Aph. VII, 45. z Præn. VII. a Aph. V, 11. b Præn
 XII, 1. Coac. Præn. V, 49.

168, 5. dentia ostendit ; atque in spuris odor c fœ-
 dus est ; maximeque , ubi post hæc orta
 71, 10. dejectio est , protinus moritur : utique , si
 tempus d autumni est : quo fere , qui cætera
 parte anni traxerunt , resolvuntur. Item , 5
 pus expulisse in hoc morbo , deinde ex toto
 spuer e desiisse , mortiferum est. Solet etiam
 in adolescentibus is morbus , ex vomica ,
 fistulave oriri : qui non facile sanescunt ,
 nisi si multa signa bonæ valetudinis subse- 100
 cuta sunt. Ex reliquis f vero minime faci-
 le sanantur virgines , aut eæ mulieres , qui-
 bus supervenit rabes , quod menstrua sup-
 pressa sint. Cui vero sano g subitus dolor ca-
 pitis ortus est , dein somnus oppressit , sic ur 11
 sterrat , neque expergiscatur , intra septi-
 mum diem pereundum est : magis si , cum
 34, 20. alvus cita non antecesserit , palpebræ dor-
 mientis non cocunt , sed album oculorum
 apparet. Quos tamen † ita mors sequitur , si 20
 id malum non est febre discussum. At hæc aqua
 inter cutem , si ex acuto morbo cœpit , ad
 sanitatem raro perducitur : utique , si con-
 traria his , quæ supra posita sunt , subse-
 quuntur. Æque in ea quoque tussis i spem 25
 tollit : item , si sanguis sursum k deorsumve
 erupit , & aqua medium corpus implevit.
 Quibusdam etiam in hoc morbo l tumo-
 res oriuntur , deinde desinunt , deinde rur-
 sus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt , 30
 quam qui supra comprehensi sunt , si atten-
 dunt : sed fere fiducia secundæ valetudinis
 opprimuntur. Illud jure aliquis mirabi-
 tur , quomodo quædam simul & affligant
 nostra

c Aph. v, 11. d Aph. 111, 10. e Aph. vii, 16, 78.
 f II. Præd. xiii, 5. g Aph. vi, 51. † cita vel certa ,
 lego. h Præn. viii, 1. i Aph. vi, 35. vii, 47.
 k II. Præd. xi, 30 l II. Præd. xi, 33.

nostra corpora , & parte aliqua tueantur.
 Nam , sive aqua inter cutem quem implevit ,
 sive in magno abscessu in multum puris coit ,
 simul id omne effudisse , æque mortiferum
 est , ac si quis sani corporis vulnere factus
 exanguis est. Articuli vero cui si dolent ,
 ut super eos ex callo quædam tubercula 68,23.
 innata sint , nunquam liberantur : quæque
 eorum vitia vel in senectute cœperunt , vel
 in senectutem ab adolescentia pervene-
 runt , ut aliquando leniri possunt , sic nun-
 quam ex toto finiuntur. Morbus quoque
 comitialis post annum quintum & vigesi-
 mum ortus ægre curatur : multoque ægrius 68,27.
 is : qui post quadragesimum annum cœ-
 pit ; adeo ut in ea ætate * aliquid in natura 68,26.
 spei , vix quidquam in medicina sit. In eo-
 dem morbo , si simul totum corpus affici-
 tur , neque ante in partibus aliquis venien-
 tis mali sensus est , sed homo ex improvise 172,9.
 concidit , cujuscumque is ætatis est , vix
 sanescit : si vero aut mens læta est , aut ner-
 vorum facta resolutio , medicinæ locus non
 est. Dejectionibus quoque si febris accessit ; 68,34.
 si inflammatio jecinoris , aut præcordio-
 rum , aut ventris ; si immodica sitis ; si lon-
 gius tempus ; si alvus varia ; si cum dolore
 est , etiam mortis periculum subest : maxi-
 meque , si inter hæc tormina vetera esse cœ-
 perunt. Ilque morbus maxime quæ pueros ab-
 sumit usque ad annum decimum : cæteræ
 ætates facilius sustinent. Mulier quoque
 gravida ejusmodi casu rapi potest : atque ,
 etiamsi ipsa convaluit , partum tamen per-
 dit. 61,34.
 E 5

m Aph. vi, 27. n II. Præd. xv, 2. * Aph. ii, 45.
 o II. Præd. xvi, 4. p II. Præd. xxx, 3, 4. q II. Præd.
 xxx, 10. r II. Præd. xxx, 14.

dit. Quin etiam tormina s ab atra bile orsa
mortifera sunt : aut si sub his , extenuato
jam corpore , subito nigra alvus profluxit.
At intestinorum t lævitas periculosior est,
si frequens dejectio est ; si venter omnibus s
horis & cum sono & sine hoc profluit ; si si-
militer noctu & interdum ; si , quod excerni-
tur , aut crudum est , aut nigrum , & , præter
id , etiam læve , & mali odoris , si sitis urget ;
si post potionem urina non redditur (quod 10
evenit , quia tunc liquor omnis non in ve-
ficam , sed in intestina descendit ;) si os exul-
ceratur ; si rubet facies , & quasi maculis
quibusdam colorum omnium distinguitur ;
si venter est quasi fermentatus , pinguis at- 15
que rugosus ; si & cibi cupiditas non est.
Inter quæ cum evidens mors sit , multo
evidentior est , si jam in longinquum quo-
que id vitium est : maxime etiam , si in cor-
pore senili est. Si vero in tenuiore intesti- 20
no morbus est , † vomitus , singulus , nervo-
rum distentio , delirium , mala sunt. At in
221,32 morbo arquato v durum fieri jecur , pernicio-
sissimum est. Quos liqnes x male habent , si tor-
mina prehenderunt , deinde conversa sunt 25
vel in aquam inter cutem , vel in intestino-
rum lævitatem , vix ulla medicina pericu-
70. 7. lo subtrahit. Morbus intestini tenuioris
ex urinae y difficultate , nisi febre resolutus
est , intra septimum diem occidit. Mulier z 30
ex partu , si cum febre vehementibus etiam
& assiduis capitis doloribus premitur , in
periculo mortis est. Si dolor atque inflam-
matio est in his partibus , quibus viscera
con-

s Aph. iv. 24. t II. Præd. xxxi, 2, 3, 4. † Aph.
vii. 10. v Aph. vi. 42. x Aph. vi. 43. y Aph. vi.
44. z Aph. v, 55.

continentur , frequenter spirare , signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est , & in cervices ac scapulas transit , rursusque in caput revertitur , aut à capite
5 ad cervices scapulasque pervenit , perniciosus est : nisi vomitum aliquam excitat , sic , ut pus * extusciatur ; aut nisi sanguis ex aliqua parte prorumpit ; aut nisi in capite multa porrigo , totove corpore pustulæ ortæ sunt.
10 Æque magnum malum est , ubi torpor a atque prurigo pervagantur , modo per totum caput , modo in parte ; aut sensus alicujus ibi quasi frigoris est , eaque ad summam quoque linguam perveniunt. Et , cum in iisdem ex
15 abscessibus auxilium sit , eo tamen difficilior sanitas est , quo minus sæpe sub his malis illi subsequuntur. In coxæ^b vero doloribus , si vehemens torpor est , frigescitque crus & coxa , alvusque nisi coacta non reddit , id-
20 que , quod excernitur , muscosum est , jamque ætas ejus hominis quadragesimum annum excessit , is morbus erit longissimus , minimumque annuus ; neque finiri poterit , nisi aut vere , aut † autumno. Difficilis æque
25 curatio est , in eadem ætate , ubi humerorum dolor c vel ad manus pervenit , vel ad scapulas tendit , torporemque & dolorem creat , neque bilis vomitu levata est. Quacunque
30 solutum est , si neque d moverur , & emacrescit , in pristinum habitum non revertitur ; eoque minus , quo vetustius e id vitium est , & quo magis in corpore senili est. Omnique resolutioni nervorum ad medicinam 39, 24.
non

* Cael. Aurelian. Acut. Morb. II. 16. a II. Præd. xxxvii. b II. Præd. XLV. 2. ad 8. † ex Hippocratz. c II. Præd. XLIV. 1, 2. d II. Præd. XLII. 8. e II. Præd. XLIII. 2, 3.

178, 32. non idonea tempora sunt hiems ^f & autumnus : aliquid sperari potest vere & æstate. Isque morbus mediocris [†] vix ^{*} sanatur, vehementis sanari non potest. Omnis etiam dolor minus medicinæ paret, qui sursum ^g pro- 5
69, 26. cedit. Mulieri ^h gravidæ si subito mammæ emacuerunt, abortus periculum est. Quæ neque ⁱ peperit, neque gravida est, si lac ha-
147, 7. bet, à menstruis defecta est. Quartana ^k æstiva, brevis, autumnalis fere longa est; 10
maximeque, quæ cœpit hieme appropinquante. Si sanguis ^l profluxit, deinde secuta est dementia cum distentione nervorum, periculum mortis est. Itemque, si medicamentis ^m purgatum & adhuc inanem, 15
nervorum distentio oppressit: aut si in magno dolore, extremæ partes frigent. Neque is ad vitam ⁿ redit, qui ex suspendio, spumante ore, detractus est. Alvus ^o nigra, sanguini atro similis, repentina, sive cum 20
febre, sive etiam sine hac est, perniciosa est.

C A P. IX.

De Morborum curationibus.

COGNITIS indiciis, quæ nos vel spe 25
consolentur, vel metu terreant, ad curationes morborum transeundum est. Ex his quædam communes sunt, quædam propriæ. Communes, quæ pluribus morbis opitulantur. Propriæ, quæ singulis. 30
Ante de communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed sanos quoque sustinent, quædam in adversa tantum valetudine adhibentur.

Omne

^f II. Præd. XLIII, 4. [†] Aph. II, 42. Aretæus de Morb. diuturn. I, 7. ^g II. Præd. XLVI, 9. ^h Aph. v. 37. ⁱ Aph. v, 39. ^k Aph. II, 25. ^l Aphor. v, 3. ^m Aph. v, 4. ⁿ Aph. II, 43. ^o Aph. IV, 21.

Omne vero auxilium corporis , aut demit aliquam materiam , aut adjicit , aut evocat , aut reprimat , aut refrigerat , aut calefacit , simulque aut durat , aut mollit.

5 Quædam non uno modo tantum , sed etiam duobus inter se non contrariis adjuvant. Demitur materia , sanguinis detractione , cucurbitula , dejectione , vomitu , frictione , gestatione , omnique exercitatione corporis , abstinentia , sudore. De quibus protinus dicam.

C A P. X.

De Sanguinis detractione per venas. a

15 **S**ANGUINEM , incisa vena , mitti novum non est : sed nullum pene morbum esse , in quo non mittatur , novum est. Item , mitti junioribus , & foeminis uterum non gerentibus , vetus est. In pueris^b vero idem
20 experiri , & in senioribus , & in gravidis quoque mulieribus , vetus non est. Siquidem antiqui , primam ultimamque ætatem sustinere non posse hoc auxilii genus judicabant ; persuaserantque sibi , mulierem
25 gravidam , quæ ita curata esset , c abortum esse facturam. Postea vero usus ostendit , nihil ex his esse perpetuum , aliasque potius observationes adhibendas esse , ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest
30 enim , non quæ ætas sit , neque quid in corpore intus geratur , sed quæ vires sint. Ergo , si juvenis imbecillus est : aut si mulier , quæ gravida non est , parum valet , male sanguis mittitur , emoritur enim vis , si quæ supererat ,
hoc

a Actuar. M. M. III. 1. b Actuar. M. M. III. 8.

c Aph. v. 31.

hoc modo erepta. At firmus puer, & robustus senex, & gravida mulier valens, tuto sic curantur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest: quia fere minus roboris illis ætatibus subest. Mulierique prægnanti post curationem quoque viribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Non quicquid aut intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus ejiciendum est: cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret, neque conceptionem solam videat, sed vires dæstimer, & ex eo colligat, possit nec ne superesse, quod vel puerum, vel senem, vel in una muliere duo corpora simul sustineat. Interest etiam inter valens corpus, & obesum; inter tenue, & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem ejusmodi sustinent: celeriusque eâ, qui nimium est pinguis, affligitur. Ideoque vis corporis melius ex venis, quam ex ipsa * specie æstimatur.

Neque solum hæc consideranda sunt, sed etiam morbi genus quod sit: utrum superans, an deficiens materia læserit: corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia vel deest, vel integra est, istud alienum est. At si vel copia sui male habet, vel corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, plenæque venæ tument, sanguinis detractionem requirit: item viscerum morbi, † nervorumque resolutio, & rigor, & disten-

d Scran. Ephes. Isag. c. 23. * Cicero in Oratore c. 2. † Patin. ad Celsum pag. 238.

distentio : quicquid denique fauces diffi- 196,
cultate spiritus strangulat ; quicquid subito 21.
supprimat vocem ; quisquis intolerabilis
dolor est ; & quacumque de causa ruptum
5 aliquid intus atque collisum est : item ma-
lus corporis habitus ; omnesque acuti mor-
bi, qui modo, ut supra dixi, non infirmita-
te, sed onere nocent.

Fieri tamen potest, ut morbus quidem
10 id desideret, corpus autem vix pati posse
videatur : sed, si nullum tamen appareat
aliud auxilium, periturusque sit, qui labo-
rat, nisi temeraria quoque via fuerit adju-
tus, in hoc statu boni medici est ostendere,
15 quam nulla spes sine sanguinis detractione
sit ; faterique, quantus in hac ipsa re metus
sit : & tum demum, si exigatur, sanguinem
mittere. De quo dubitare in ejusmodi re
non oportet. satius est enim anceps auxi-
20 lium experiri, quam nullum. Idque maxi-
me fieri debet, ubi nervi resoluti sunt ; ubi 178,
subito aliquis obmutuit ; ubi angina e stran- 19, 29.
gulatur ; ubi prioris febris accessio pene 196,
confecit, paremque subsequi verisimile est, 21.
25 neque eam videntur sustinere ægri vires
posse.

Cum sit autem minime crudo sanguis
mittendus, tamen ne id quidem perpetuum
est. neque enim semper concoctionem res
30 expectat. Ergo, si ex superiore parte aliquis 203,
decidit, si contusus est, si ex aliquo subito 20.
casu sanguinem vomit, quamvis paulo ante 204, 9.
sumpsit cibum, tamen protinus ei demen-
da materia est, ne, si subsederit, corpus af-
figat.

fligat. Idemque etiam in aliis casibus repentinis, qui strangulabunt, dictum erit. At, si morbi ratio patiat, tunc demum nulla cruditatis suspitione remanente id fiet. Ideoque ei rei videtur aptissimus adversæ valetudinis dies secundus, aut tertius. Sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est, sic nunquam utile post diem quartum est, cum jam spatio ipso materia vel exhausta est, vel corpus cor-
rupit; ut detractio imbecillum id facere possit, non possit integrum. Quod si vehemens febris urget, in ipso impetu ejus sanguinem mittere, hominem iugulare est. expectanda ergo intermissio est: si non de-
cedit, cum crescere desit: si neque remissio speratur, tunc quoque, quamvis pe-
jor, sola tamen occasio non omittenda est.

Fere etiam ista medicina, ubi necessaria est, in biduum dividenda est. Satius est enim, primum levare ægrum, deinde per-
purgare, quam simul omni vi effusa fortasse præcipitare. Quod si in cura quoque aquæ quæ inter cutem est, ita responderet; quanto magis necesse est in sanguine re-
spondeat?

Mitti vero is debet, si totius corporis causa sit, ex brachio: si partis alicujus, ex ea ipsa parte, aut certe quam proxima; quia non ubique mitti potest, sed in temporibus, in brachiis, juxta talos. Neque ignoro, quosdam dicere, quam longissime sanguinem inde, ubi lædit, esse mittendum; sic enim averti materiæ cursum; at illo modo
in

in id ipsum, quod gravatur, evocari. Sed idipsum falsum est. proximum enim locum primo exhaurit: ex ulterioribus autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur: ubi is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur tamen usus ipse docuisse, si caput † fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse: si quod in humero * vitium est, ex altero brachio. credo, quia si quid parum cesserit, opportuniore hæ partes injuriæ sunt, quam quæ jam male habent. Averitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte prorumpens, alia emittitur. desinit enim fluere qua nolumus, inde objectis quæ prohibeant, alio dato itinere.

Mittere autem sanguinem cum sit expeditissimum, usum habenti; tamen ignaro difficillimum est. juncta enim est vena arteriis, his nervi. Ita, si nervum scalpellus attingit, sequetur nervorum g distentio, eaque hominem crudeliter consumit. At arteria h incisa neque coit, neque sanescit: interdum etiam, ut sanguis vehementer 183,
24- erumpat, efficit. Ipsius quoque venæ, si forte præcisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque venam incidit. Nonnunquam etiam ea later, neque facile reperitur. Ita mularæ res id difficile inscio faciunt, quod perito facillimum est.

Incidenda ad medium vena est. Ex qua cum sanguis erumpit, colorem ejus habi-

F

tumque

† quidam vir. doctus l. *tactum*. * Aph. vi. 22. De Morb. 111, 32. h Aph. vi. 18. 19. l. de Morb. vii, 21.

289, 7. tumque oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, vitiosus est; ideoque utiliter effunditur: † si rubet & pellucet, integer est; eaque missio sanguinis adeo non prodest, ut etiam noceat, protinusque is super primendus est. Sed id evenire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut æque niger assidue primo die profluat. quod quamvis ita est, tamen si jam satis IO fluxit, suppressendus est: semperque ante finis faciendus est, quam * anima deficiat.

Deligandumque brachium superimposito expressio ex aqua frigida penicillo; & postero die adverso medio digito vena frigida, ut recens coitus ejus resolvatur, iterumque sanguinem fundat. Sive autem primo, sive secundo die sanguis, qui crassus & niger initio fluxerat, & rubere, & pellucere cœpit, satis materiæ detractum 20 est, atque quod superest, sincerum est: ideoque protinus brachium deligandum, habendumque ita est, donec valens cicatrix sit; quæ celerrime in vena confirmatur. 25

C A P. XI.

De Sanguinis detractione per Cucurbitulas.

CUCURBITULARUM a vero duo genera 30 sunt: æneum, & corneum. Ænea, altera parte patet; altera, clausa est. Cornea, altera parte æque patens, altera foramen habet exiguum. In æneum linamen-

† Casaub. in Athenæ. Animadv. L. I. c. 20. pag. 60. * Soran. Ephesius Isagog. I. cap. 22. a Prosp. Alpin. de Medic. Ægypt. II. 13.

mentum ardens conjicitur , ac si os ejus corpori aptatur , imprimiturque , donec inhæreat. Cornea , per se corpori imponitur ; deinde , ubi ea parte , qua exiguum
5 foramen est , ore spiritus adductus est , superque cera cavum id clausum est , æque inhærescit. Utraque non ex his tantum materiæ generibus , sed etiam ex quolibet alio recte fit. Ac si cætera defecerunt , caliculus quoque aut pultarius , oris compressioris , ei rei commode aptatur. Ubi inhæsit , si concisa ante scalpello cutis est , sanguinem extrahit : si integra est , spiritum. Ergo ubi materia , quæ intus est , lædit ,
5 illo modo : ubi inflatio , hoc imponi solet.

Ufus autem cucurbitulæ præcipuus est , ubi non in toto corpore , sed in parte aliqua vitium est , quam exhauriri ad confirmandam valetudinem satis est. Idque ipsum testimonium est , etiam scalpello sanguinem , ubi membro succurritur , ab ea potissimum parte , quæ jam læsa est , esse mittendum : quod nemo cucurbitulam diversæ parti ²³³ imponit , nisi cum profusionem sanguinis ³⁴ eo avertit ; sed ei ipsi , quæ dolet , quæque liberanda est.

Opus esse cucurbitula potest in morbis longis (quamvis & iis jam spacium aliquod accessit) sive corrupta materia , sive spiritu male habente. In acutis quoque quibusdam , si & levare corpus debet , & ex vena sanguinem mitti , vires non patiuntur. Idque auxilium ut minus vehemens , ita magis tutum ; neque unquam periculosum
F 2 est ,

est, etiamsi in medio febris impetu, etiamsi in cruditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa vena præceps periculum est, aut nobili in parte corporis vitium est, etiam huc potius confugiendum est. cum eo tamen, ut sciamus, hic ut nullum periculum, ita levius præsidium esse; nec posse vehementi malo, nisi æque vehemens auxilium succurrere.

CAP. XII.

De Dejectione.

DEJECTIONEM autem antiqui variis medicamentis, crebraque alvi ductione in omnibus fere morbis moriebantur: dabantque aut nigrum veratrum, aut filiculam, aut squamam æris, quam *λεπίδα χαλκοῦ* Græci vocant; aut lactucæ marinæ† lac, cujus gutta pani adjecta abunde purgat; aut lac vel asininum, vel bubulum, vel caprinum, eique salis paulum adjiciebant, decoquebantque illi, & sublati his, quæ coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogebant.

241, Sed medicamenta stomachum fere lædunt. Ideoque omnibus catharticiis aloë miscenda est. Alvus si vehementius fluit, aut sæpius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam in adversa valetudine medicamentum ejus rei causa recte datur, nisi ubi is morbus sine febre est. Ut cum veratrum nigrum, aut atra bile vexatis, aut cum a tristitia insanientibus, aut iis, quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At, ubi

b De Arte XIIII, 16. Erasmi. Adag. *malo nodo*. Chrysi. ad Genes. cap. 1. Homil. VI. † Patin. pag. 248. a I. Diet. XXXIII, 10. De Insomn. VI, 5. de victu Acut. LVI.

ubi febres sunt, satius est ejus rei causa cibos
portionesque assumere, qui simul & alant, &
ventrem molliant. Suntque valetudinis ge-
nera, quibus ex lacte purgatio convenit.

2. De *Alvi ductione*.^b

Plerumque vero alvus lotionibus ducen-
da est. quod, ab Asclepiade^c quoque sic vitu-
peratum, ut tamen servatum sit, video ple-
rumque seculo nostro, præteriri. Est autem
ea moderatio, quam is secutus videtur,
aptissima, ut neque sæpe † medicina tentetur,
& tamen semel, vel summum bis, non
omittatur, si caput grave est; si oculi cali-
gant; si morbus majoris intestini est, quod
Græci κόλον nominant, si in imo ventre,
aut in coxa dolores sunt; si in stomachum
quædam biliosa concurrunt, vel etiam
pituita eo se, humorve aliquis aquæ simi-
lis confert; si spiritus difficiliter redditur; si
nihil per se venter excernit; utique, si juxta
quoque stercus est, & intus remanet; aut si
stercoris odorem nihil dejiciens æger ex
spiritu suo sentit; aut si corruptum est, quod
excernitur; aut si prima inedia febrem non
sustulit; aut si sanguinem mitti, cum opus
sit, vires non patiuntur, tempusve ejus rei
præteriit; aut si multum ante morbum ali-
quis potavit; aut si is, qui sæpe, vel sponte,
vel casu purgatus est, subito habet alvum
suppressam. Servanda vero illa sunt, ne
ante diem tertium ducatur: ne ulla crudi-
tate substante: ne in corpore infirmo, diu-
que in adversa valetudine exhausto: neve
in eo, cui satis alvus reddit quotidie, qui-

^b Plutarch. de tuend. Valet p. 232. ^c Plin. xxvi.
3. Craton. Consilia Med. ex ed. Scholzii.

ve eam liquidam habet: neve in ipso accessionis impetu; quia, quod tum infusum est, alvo continetur, regeſtumque in caput, multo gravius periculum efficit. Pridie vero abſtinere debet æger, ut aptus tali curationi ſit. Eodem die ante, aliquot horis, aquam calidam bibere, ut ſuperiores ejus partes madefcant: tum immittenda in alvum eſt, ſi levi medicina contenti ſumus, pura aqua; ſi paulo valentiori, muſſa; ſi leni, 10 aqua, in qua fœnum græcum, vel priſana, vel malva decocta ſit: ſi reprimendi cauſa, ex † verbenis. Acris autem eſt marina aqua, vel alia ſale adjecto: at utraque decocta commodior eſt. Acrior ſit, adjecto vel oleo, 15 vel nitro, vel melle quoque. Si acrior eſt, eo plus extrahit, ſed minus facile ſuſtinetur. Id quod infunditur, neque frigidum eſſe oportet, neque calidum; ne alterutro modo lædat. Cum infuſum eſt, quantum 20 fieri poteſt, continere ſe in lectulo debet æger nec primæ cupiditati dejectionis protinus cedere: ubi neceſſe eſt, tum demum deſidere. Fereque eo modo dempra materia, ſuperioribus partibus levatis, mor- 25 bum ipſum mollit. Cum vero, quotiens res coegit, deſidendo aliquis ſe exhaust, pauliſper debet conqueſcere; &, ne vires deficiant, utique eo die cibum aſſumere. qui plenior, an exiguus ſit daudus, ex ra- 30 tione ejus acceſſionis, quæ expectabitur, aut in metu non erit, aſtimari oportebit.

C A P.

† pro quavis herba, ſic Plin. xxvi. c. 10. *Satyræ* nomine quaſvis herbas venerem excitantes nominat.

CAP. XIII.

De Vomitu. a

29, 21.

AT vomitus, ut in secunda quoque va-
 letudine saepe necessarius biliosis est;
 sic etiam in his morbis, quos bilis
 concitavit. Ergo omnibus, qui ante febres
 horrore & tremore vexantur: omnibus, qui
 cholera laborant: omnibus etiam cum qua-
 dam hilaritate insanientibus; & comitiali 183, 10.
 quoque morbo oppressis necessarius est.
 Sed, si acutus morbus est, sicut in cholera;
 si febris est, inter rigores, asperioribus me-
 dicamentis opus non est; sicut in dejectioni-
 bus quoque supra dictum est. Satisque 84, 31.
 est, ea vomitus causa sumi, quæ sanis quo-
 que sumenda esse proposui. At ubi longi
 valentesque morbi sine febre sunt, ut comi- 92, 4.
 tialis aut insania, veratro quoque albo
 utendum est. Id neque hieme, neque æstate
 recte datur: optime, vere: tolerabiliter
 autumnus. Quisquis daturus erit, id agere
 ante debet, ut accepturi corpus b humidius
 sit. Illud scire oportet, omne ejusmodi me-
 dicamentum, quod † potui datur, non sem-
 per ægris prodesse, semper c sanis nocere.

CAP. XIV.

De Frictione. a

DE frictione vero & gestatione adeo
 multa Asclepiades, tanquam inventor
 ejus, b posuit in eo volumine, quod
 Communium auxiliorum inscripsit, ut,
 cum trium tantum faceret mentionem,

F 4

hujus

a Hippocrat. T. 1. pag. 651. III. De Diet. 14.
 b Aph. 14, 13. † Vomitu. c Aph. 11, 36. 14, 16.
 a Oribas. Med. collect. vi. 13, 16, 17, 18, &c. b Plin.
 xxvi, 3. Mercur. de Arte Gymn. 1, 7.

hujus & vini & gestationis, tamen maximam partem in hoc consumpserit. Oportet autem neque recentiores viros in his fraudare, quæ vel reppererunt, vel recte secuti sunt; & tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt, authoribus suis reddere. Neque dubitari potest, quin latius quidem, & dilucidius, ubi & quomodo frictione utendum esset, Asclepiades præceperit; nihil tamen reperit, quod non à vetustissimo 100
 348, mo authore Hippocrate paucis verbis com-
 10. prehensum sit: qui dixit, Frictione, si vehementem sit, c durari corpus: si lenis, molliri: si multa, minui: si modica, impleri. Sequitur ergo, utrum utendum sit, cum aut ad- 15
 549, stringendum corpus sit, quod fluens est:
 12. aut molliendum, quod induruit: aut digerendum in eo, cui copia nocet: aut alendum id, quod tenue & infirmum est.

Quas tamen species, si quis curiosus æstimet (quod jam ad medicum non pertinet) facile intelliget, omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam & adstringitur aliquid, eo dempto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat: & mollitur, eo de- 25
 tracto, quod duritiem creabat: & impletur, non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem, digestionem quadam relaxatam, penetrat. Diversarum vero rerum in modo causa est.

Inter unctionem autem & frictionem multum interest. Ungi enim, leniterque pertractari corpus, etiam in acutis & recentibus morbis oportet; in remissione tamen, 30
 &

& ante cibum. Longa vero frictione uti, neque in acutis morbis, neque incrementibus convenit; præterquam cum phreneticis somnus ea quæritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, & jam à primo impetu inclinata. Neque ignoro, quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse incrementibus morbis, non cum jam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli. quod duabus de causis necessarium est: & ut quam primum bona valetudo contingat; & ne morbus, qui remanet, iterum; quamvis levi de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus gravis esse, quam fuerit; neque ideo tamen solvi; sed reliquiis quibusdam inhærere, quas admotum aliquod auxilium discutiat.

Sed ut, levata quoque adversa valetudine, recte frictio adhibetur; sic nunquam adhibenda est febre incremente: verum, si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit; sin minus, certe cum ea remiserit. Eadem autem modo in totis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus: modo in partibus; aut quia ipsa ejus membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam & capitis & longos dolores ipsius frictio levat; non in impetu tamen doloris: & membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longe tamen sæpius aliud perfricandum est, cum aliud dolet: maximeque cum à summis, aut à mediis

F 5

parti-

partibus corporis evocare materiam volumus; ideoque extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendum est. Ut si quis perinfirmus est, potest satis esse quinquagies: si robustior, potest ducenties esse faciendum. inter utrumque deinde, prout vires sunt. Quo fit, ut etiam minus sæpe in muliere, quam in viro: minus sæpe in puero, vel sene, quam in juvene, manus dimovendæ sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentique fricatione opus est. Nam neque totum corpus infirmari cito per partem potest, & opus est quam plurimum materiæ digerere, sive ipsum membrum, sive per id aliud levamus. At, ubi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigit, brevior esse debet & lenior; ut tantummodo summam cutem emolliat, quo facilius capax ex recenti cibo novæ materiæ fiat. In malis jam ægrum esse testatur, e ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, ut supra posui. Sed tunc quoque unicum in frictione præsidium est, quæ si calorem evocavit, potest alicui medicinæ locum facere.

C A P. XV.

De Gestatione. a

30

GESTATIO quoque longis & jam inclinatis morbis aptissima est. utilisque est & his corporibus, quæ jam
ex

ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt; & his, quibus lentæ morborum reliquæ remanent, neque aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti vehementique, præcipueque ardente febre, ad discutiendam eam, gestatione dixit utendum. Sed id periculose fit; meliusque in quiete ejusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen b experiri volet, sic experiatur, si lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut præcordiis suberit. At ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, sive id in toto, sive in parte est; nisi tamen solis nervis dolentibus; neque unquam in crescente febre, sed in remissione ejus.

Genera c autem gestationis plura sunt: quæ adhibenda sunt & pro viribus cujusque, & pro opibus; ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humili desint. Gestationum lenissima est navi, vel in portu, vel in flumine; vellectica, aut scamno: acrior, vehiculo: vehementior, in alto mari † navi. Atque hæ ipsæ & intendi & leniri possunt. Si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moveri. Si ne id quidem est, at certe uni pedi lecti fulcimentum subjiciendum est, atque ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et levia quidem genera exercitationis infirmissimis conveniunt: valentiora vero his, qui jam pluribus diebus febre liberati sunt; aut his, qui graviam morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre vacent (quod & in tabe, & in stomachi

b Oribas. Medic. Coll. vi, 25. c Oribas. Medic. Coll. vi, 23. † Gloss.

machi vitiis, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit) aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamvis diu, manent. 87, 18. In quibus affectibus ea quoque genera, & exercitationum necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco †, quo, quemadmodum sani, neque firmi homines se gerere debent, præcepimus.

C A P. XVI.

De Abſtinentia. a

ABSTINENTIAE vero duo genera sunt. Alterum, ubi nihil assumit æger: alterum, ubi non nisi quod oportet. 1. Initia morborum primum * famem, sitimque desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem, ut neque aliud quam expedit, neque ejus ipsius nimium sumatur. neque enim convenit juxta inedia[m] protinus satietatem esse. 24, 33. Quod si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit; quanto inutilius est infirmo, nedum ægro? Neque ulla res b magis adjuvat laborantem, quam tempeſtiva abſtinentia. 25. Intemperantes homines apud nos, sibi cibi tempora, modum curantibus dant. Rurſus alii, tempora medicis pro dono remittunt, sibi ipsis modum vendicant. Liberaliter agere se credunt, qui cætera illorum arbitrio relinquunt, in genere cibi liberi sunt, quasi quærat[ur], quid medico liceat, non quid ægro salutare sit. Cui vehementer nocet, quoties in ejus, quod assumitur, vel

† Lib. 1. c. 1, 2. a Soran. Ephes. Ifag. cap. x. Hipp. de Vet. M. T. xv. n. 10. b Plin. xxviii, 4.

vel tempore , vel modo , vel genere peccatur.

C A P. XVII.

De Sudore.

SUDOR duobus modis elicitur : aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & arenæ calidæ, a & laconici, & clibani, & quarundam naturalium sudationum, ubi a terra profusus calidus vapor ædificio includitur, sicut super b Batas in mureris habemus. Præter hæc, sole quoque, & exercitatione is movetur. Utiliaque hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isque digerendus est. Ac nervorum quoque quædam vitia sic optime curantur. Et cætera infirmis possunt convenire : Sol, & exercitatio tantum robustioribus ; qui tamen sine febre, vel initio morbi, vel etiam non gravibus morbis tenentur. Cavendum autem est, ne quid horum vel in c febre, vel in cruditate tentetur.

At balnei duplex usus est. Nam modo, discussis febribus, initium cibi plenioris, vinique firmioris, valetudini facit ; modo febrem ipsam tollit. Fereque adhibetur, ubi summam cutem relaxari, evocarique corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo utebantur : Asclepiades d audacius. Neque terere autem ea res, si tempestiva est, debet : at ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est, simulatque ea uno die non accessit, eo, qui proximus est post tempus accessio-

a Aetius Tetr. I. Serm. III, 9. b Alii *Baias*, Horat. Epist. xv, l. i. Ovid. de A. A. l. i. Cassiodor. Var. l. ix, 6. c I. de Morb. Mul. LVIII, 14. d Plin. XXVI, 3.

cessionis, tuto lavari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic ut tertio, quartove die revertatur, quodocunque non accessit, balneum tutum est. Manentibus vero adhuc febribus, si hæ sunt lentæ, 5
lienesque jamdiu male habent, recte medicina ista tentatur: cum eo tamen, ne præcordia dura sint, neve ea tumeant, neve lingua aspera sit, neve aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit, neve tum 100
febris increseat. Et in his quidem febribus, quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt; alterum, ante horrorem; alterum, febre finita. In his vero, qui lentis febriculis diu detinentur, cum aut ex to- 155
to recessit accessio; aut si id non solet, certe lenita est, jamque corpus tam integrum est, quam maxime esse in eo genere valetudinis solet.

Imbecillus homo, iturus in balneum, 20
vitare debet, ne ante frigus aliquod experiatur: ubi in balneum venit, paulisper resistere, experiri que, num tempora adstringantur, & an sudor aliquis oriatur: illud si incidit, hoc non secutum est, inutile eo 25
die balneum est: & perungendus est is leniter, & referendus; vitandumque omnimodo frigus, & abstinencia utendum. At si temporibus integris, primum ibi, deinde alibi sudor incipit, fovendum os aqua 30
calida; tum in solio desudendum est; atque ibi quoque videndum, num sub primo contractu aquæ calidæ summa cutis inhorrescat, quod vix tamen fieri potest, si priora recte
recte

recte accesserunt : certum autem id signum inutilis balnei est.

Ante vero , quam in aquam calidam se demittat , an postea aliquis perungi debeat , ex ratione valetudinis suæ cognoscat. Fere tamen (nisi ubi nominatim , ut postea fiat , id præcipietur) moto sudore e leniter corpus perungendum ; deinde in aquam calidam demittendum est. Atque hic quoque habenda virium ratio est ; neque committendum , ut per æstum anima deficiat ; sed maturius is auferendus , curioseque vestimentis involvendus est , ut ne ad eum frigus aspiret : & ibi quoque , antequam aliquid assumat , insudet.

Fomenta quoque calida sunt , milium , sal , arena : quodlibet eorum calefactum , & in linteum coniectum ; etiam solum linteum , si minore vi opus est : at si majore , extincti titiones , involutique panniculis , & sic circumdati. Quinetiam calido oleo replentur f utriculi : & in vasa fictilia (quas à similitudine lenticulas vocant) aqua con-jicitur ; & sal sacco lineo excipitur , demittiturque in aquam bene calidam , tum super id membrum , quod fovendum est , collocatur. Juxtaque ignem , ferra-menta duo ignita sunt , capitibus paulo latioribus : alterum ex his demittitur in ficcum salem , & aqua super leviter aspergitur ; ubi frigere cœpit , ad ignem refertur : idem & in altero fit ; deinde invicem in utroque : intereaue descendit salsus & calidus succus , qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omni-

c I. De Morb. Mul. LVIII, 13. f Diogen. Laert. l. v. vit. Aristot. pag. 117. ed. Lond. Valeriola observ. 1. observ. LI. in uxore partu difficili laborante.

omnibus commune est, digerere id, quod vel præcordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque utendum sit, in ipsis morborum generibus dicitur.

C A P. XVIII.

Qui cibi, potionesve, aut valentis, aut mediæ, aut imbecillæ materiæ sint.

CUM de his dictum sit, quæ detrahendo juvant: ad ea veniendum est, quæ nos alunt, id est cibum, & potionem. Hæc autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundæ valerudinis communia præsidia sunt. Pertinetque ad rem, omnium proprietates nosse: primum, ut 49, 4. 17, 30. 18, 12. sani sciant, quomodo his utantur: deinde, ut exsequentibus nobis morborum curationes, liceat species rerum, quæ assumendæ necessario erunt, subicere: neque necesse sit subinde singulas eas nominare.

Scire igitur oportet, omnia legumina, quæque ex frumentis panificia sunt, generis valentissimi esse (valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est:) item omne animal quadrupes domi natum; omnem grandem teram, quales sunt caprea, cervus, aper, ouager; omnem grandem avem, quales sunt anser, & pavo, & grus; omnes belluas marinas, ex quibus cetus est, quæque his pares sunt: item mel, & caseum. Quominus mirum est, opus pistorium valentissimum esse, quod ex frumento, adipe melle, caseo a constat. In media vero materia-

teria numerari ex oleribus debere ea, quorum radices, vel bulbos assumimus: ex quadrupedibus, leporem: aves omnes à minimis ad phœnicopterum: item pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidive saliantur. Imbecillissimam vero materiam esse, omne olus, & quicquid in cauliculo * nascitur, qualis est cucurbita, & cucumis, & capparitis, omnia † poma, oleas, cochleas, itemque conchylia.

Sed quamvis hæc ita discreta sint, tamen etiam, quæ sub eadem specie sunt, magna discrimina recipiunt; aliaque res alia vel valentior est, vel infirmior. Siquidem plus alimenti est in pane, quam in ullo alio. Firmius est ^b triticum, quam milium: id ipsum, quam hordeum: & ex tritico firmissima sili-go; deinde similia; deinde cui nihil ademptum est, quod ^c αὐτόπυρον Græci vocant: infirmior est, ex polline: infirmissimus, cibarius panis. Ex leguminibus vero valentior faba, vel lenticula, quam pisum. Ex ^d oleribus valentior rapa, napique, & omnes bulbi (in quibus cepam quoque, & allium numero) ^e quam pastinaca, vel quæ specialiter radícula appellatur. Item firmior brassica, & beta, & porrum, quam lactuca, vel cucurbita, vel asparagus. At ex fructibus surculorum valentiores uvæ, ficus, nuces, palmulæ, quæque poma proprie nominantur. Atque ex his ipsis firmiora, quæ succosa, quam quæ fragilia sunt. Item ex his ^e avibus, quæ in media specie sunt, valentiores cæ, quæ pedibus, quam quæ volatu magis

G

nitun-

* Patin. p. 282, 283. & 287. † id. ibid. ^b II. De Diæt. x, 1. Athen. Deipn. III. 30. p. 115. ^c Ath. Deipn. III. c. 28. ^d II. Diæt. xxiv. ^e II. Diæt. xvii.

nituntur: & ex his, quæ volatu fidunt, firmiores sunt grandiores aves, quam minutæ, ut ficedula & turdus. Atque eæ quoque, quæ in aqua degunt, levio-rem cibum præstant, quam quæ natandi scientiam non 5 habent. Inter domesticas vero quadrupedes, levissima suilla est; gravissima, bubula. Itemque ex feris, quo majus quodque animal, eo robustior ex eo cibus est. f Pisciumque eorum, qui ex media materia 10 sunt, quamvis maxime utimur, tamen gravissimi sunt: tum ex quibus salsamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est; deinde hi, qui, quamvis teneriores, tamen duri sunt, ut aurata, corvus, sparus, ocu- 15 lata; tum plani: post quos etiam leviores sunt, lupi, mullicque; & post hos, omnes saxatiles.

Neque vero in generibus rerum tantummodo discrimen est, sed etiam in ipsis: 20 quod & ætate fit, & membro, & solo, & cælo, & habitu. Nam quadrupes vel omne animal si lactens est, minus alimenti præstat: itemque quo tenerior pullus cohortalis est. In piscibus quoque media ætas, quæ- 25 que nondum summam magnitudinem implevit. Deinde ex eodem sue, ungulæ, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hædo-ve, cum petiolis totum g caput aliquanto, quam cætera membra, leviora sunt; adeo 30 ut in media materia poni possint. Ex avibus, colla, alæve recte infirmissimis annumerantur. Quod ad solum vero pertinet, frumentum quoque valentius est collinum, quam

quam campestre. Levior ^h piscis inter saxa editus, quam in arena; levior in arena, quam in limo. Quo fit, ut ex stagno, vel lacu, vel i flumine eadem genera graviora sint. Leviorque, qui in alto, quam qui in vado vivit. Omne etiam ferum ^k animal domestico levius; & quodcumque humido coelo, quam quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingua, quam macra; recentia, quam falsa; nova, quam vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit jurulenta, quam assa; magis assa, quam frixa. Ovum durum valentissimæ materiæ est; molle, vel sorbile, imbecillissimæ. Cumque panificia omnia firmissima sint, elota tamen quædam genera frumenti, ut alica, oryza, pusana, vel ex iisdem facta sorbitio, vel pulicula, & aqua quoque madens panis, imbecillissimis annumerari potest.

Ex potionibus vero, quæcunque ex frumento facta est, itemque lac, mulsum, defrutum, passum, vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magnæ vetustatis, valentissimi generis est. At acrum, & id vinum quod † paucorum annorum, vel austerrum, vel pingue est, in media materia est. ideoque infirmis nunquam ejus generis dari debet. Aqua omnium imbecillissima est. Firmiorque ex frumento potio est, quo firmitus fuit ipsum frumentum: firmior ex eo vino, quod bono solo, quam quod tenui; quodque temperato coelo, quam quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumque aut frigido,

G 2

aut

^h II. Diæt. xlix. 9. Athenæus Deipn. vii, c. 15.
ⁱ II. Diæt. xix. 1. ^k II. Diæt. xx. † Patin. p. 299.

aut calido natum est. Mulsum, quo plus mellis habet; defrutum, quo magis decoctum; passum, quo ex ficiore uva est, eo valentius est. † Aqua levissima¹ pluvialis est; deinde fontana, tum ex flumine, tum ex puteo; posthæc ex nive, aut glacie; gravior his, ex lacu; gravissima, ex palude. Facilis etiam, & necessaria cognitio est naturam ejus requirentibus. Nam levis, pondere apparet; & ex his, quæ pondere pares sunt, 10 eo melior quæque est, quo celerius⁷ & calefit & frigescit; quoque celerius ex ea legumina percoquantur.

Fere vero sequitur, ut, quo valentior quæque materia est, eo minus facile concoquatur; sed si concocta est, plus alar. Itaque utendum est materiæ genere pro viribus; modusque omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus, rebus infirmis opus est: mediocriter firmos, 20 media materia optime sustinet: & robustis apta validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex levioribus potest: in his magis, quæ valentissima sunt, temperare sibi debet.

C A P. XIX.

25

Quæ natura ac proprietas cujusque rei sit, qua vefcimus.

NEQUE hæc sola discrimina sunt; sed etiam aliæ res boni succi, aliæ mali 30 sunt; quæ εὔχυμα, & κατόχυμα Græci vocant: aliæ lenes, aliæ acres: aliæ crassiorem pituitam in nobis faciunt, aliæ tenuiorem: aliæ idoneæ sunt stomacho, aliæ

† Aquæ bonæ malæve signa enumerantur a Castaubono in *Athenæum Animadv.* L. II. c. 7. † Pallad. R. R. I. 17. Colum. de R. R. I. 5. * Aph. v. 26.

aliæ alienæ: Itemque aliæ inflant, aliæ ab hoc absunt: aliæ calefaciunt, aliæ refrigerant: aliæ facile in stomacho acescunt, aliæ non facile intus corrumpuntur: aliæ movent alvum, aliæ supprimunt: aliæ citant urinam, aliæ tardant: quædam somnum movent, quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud alii, vel corpori, vel valetudini, convenit.

C A P. XX.

De his, quæ boni succi sunt.

BONI succi sunt, triticum, filigo, alica, oryza, amyllum, tragum, prîsana, a lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aves, quæ ex media materia sunt: ex majoribus quoque hæ, quas supra nominavimus: medii inter teneros durosque pisces, ut mullus, & lupus: olera, lactuca, urtica, malva, cucumis, cucurbita, portulaca, cochleæ, palmulæ: ex pomis quodcumque neque acerbum, neque acidum est: vinum dulce, vel lene, passum, defrutum, oleæ, quæve ex his duobus in alterutro servatæ sunt: † vulvæ, rostra, * trunculique suum, omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne jecur, ovum forbile.

C A P. XXI.

De his, quæ mali succi sunt.

MALI vero succi sunt, milium, panicum, hordeum, legumina, caro domestica permacra, omnisque caro falsa, omne a falsamentum, garum, vetus caseus,

G 3

a Varro R. R. II. 11. † Plin. Ep. l. 1. Ep. 15.
 * in Tyron. notis occurrit vox Trunculus pag. 167.
 a Athen. Deipn. III. c. 31. pag. 116.

seus, sifer, radícula, rapa; napi, bulbi, brassica, magisque etiam cyma ejus, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satireia, hyssopum, ruta, anethum, feniculum, cuminum, anisum, lapa-hum, sinapi, allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcumque acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum, * pisces quoque saxatiles, omnesque, qui ex tenerissimo genere sunt, aut hi, qui rursus nimium duri virosque sunt, ut fere quos stagna, lacus, limosive rivi ferunt, quive in nimiam magnitudinem excesserunt.

CAP. XXII.

151

Quæ res lenes, quæve acres sint.

LENES autem sunt, sorbitio, pulicula, laganum, amyllum, ptisana, pinguis caro, & quæcunque glutinosa est: quod fere quidem in omni, quæ domestica, sit, præcipue tamen in ungulis, trunculisque suum, in petiolis capitulisque hœdorum & vitulorum & agnorum, omnibusque cerebellis. Item lac, &, quæ proprie dulcia nominantur, defrutum, passum; nuclei pinei. Actria sunt, omnia nimis austera, omnia acida, omnia salsa; & mel quidem, quo melius est, eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturtium, cucumis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocimum, lactuca, maximeque olerum pars.

CAP.

* Refutat Celsum Nonn. de Re Cibar. l. 3. c. 13. p. 319.

CAP. XXIII.

*De his, quæ crassiores, quæve tenuiores
pituitam faciunt.*

CRASSIOREM autem pituitam faciunt, ova sorbilia, alica, oryza, amyllum, ptisana, lac, bulbi, omniaque fere glutinosa. Extenuant eandem, omnia salia, atque, acria, & acida.

CAP. XXIV.

De his, quæ stomacho idonea sunt.

STOMACHO autem apta sunt, quæcunque austera sunt, & quæ acida, quæque contacta sale modico sunt. Item panis sine fermento, & elota alica, vel oryza, vel ptisana; omnis avis, omnis venatio; atque utraque vel assa, vel elixa: ex domesticis animalibus bubula: si quid ex cæteris sumitur, macrum potius, quam pingue: ex sue, ungulæ, rostra, aures, vulvæque steriles: ex oleribus, intuba, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, fiser: ex pomis, cerasum, morum, sorbum, pirum fragile, quale crustumini vel nævianum est: item pira, quæ ponuntur, Tarentina, atque Signina; malum orbiculatum, aut Scandianum, vel Amerinum, vel cotoneum, vel Punicum, apsinthium, murices, purpuræ, cochleæ, uvæ ex olla, molle ovum, palmulæ, nuclei pinci, a oleæ albæ ex b dura inuria, eadem acetointinctæ, vel nigræ, quæ in arbore bene permaturuerunt, vel quæ in passo, defrutove versatæ sunt: vinum austerum, licet

G 4

jam

a Mercurial. Var. Lect. 1, 3. b Mercurial. Var. Lect. 11, 26 sed refutatur a L. Nonnio de Re Cibariis. l. 3. c. 45. pag. 421.

jam asperum sit , item resinatum : duri ex media materia pisces , ostrea , pectines , murices , purpuræ , cochleæ : cibi , potionefque frigidaë , vel fervidaë.

CAP. XXV.

Quæ res alienæ stomacho sint.

ALIENA vero stomacho sunt , omnia tepida , omnia salsa , omnia jurulenta , omnia^a prædulcia , omnia pinguia , 10
forbitio , panis fermentatus , idemque vel ex milio , vel ex hordeo , oleum , radices olerum , & quodcunque olus ex oleo garove estur , mel , mustum , defrutum , passum , lac , omnis caseus , uva recens , ficus & viridis 15
& arida , legumina omnia , quæque inflare consueverunt : item thymum , nepeta , satureia , hyssopum , nasturtium , lapathum , lampšana , juglandes . Ex his autem intelligi potest , non , quicquid boni succi est , protinus stomacho convenire ; neque quicquid 20
stomacho convenit , protinus boni succi esse .

CAP. XXVI.

De his , quæ inflant.

INFLANT autem , omnia fere legumina , omnia pinguia , omnia prædulcia , omnia jurulenta , mustum , atque etiam id vinum , cui nihil adhuc ætatis accessit : ex 30
oleribus , allium , cepa , brassica , omnesque radices , excepto sisere & pastinaca , bulbi , ficus etiam aridaë , sed magis virides , uvæ recentes , nuces omnes , exceptis nucleis pineis ,

^a Calvis. apud Charis. Sosp. Instit. Gram. l. 1.

pineis, lac, omnisque^b caseus, quicquid denique subcrudum aliquis assumpsit.

De his, quæ minime inflant.

Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchiliis, ovis vel mollibus vel forbilibus, vino vetere. Feniculum vero, & anethum, inflationes etiam levant.

C A P. XXVII.

De his, quæ calefaciunt, aut refrigerant. p. 31.

AT calefaciunt, piper, sal, caro omnis jurulenta, allium, cepa, ficus arida, fassamentum, vinum, & quo meracius est, eo magis.

Refrigerant, olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca: itemque coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austera, pira fragilia, caro elixa, præcipueque acetum, sive cibus ex eo, sive potio assumitur.

C A P. XXVIII.

De his, quæ intus facile corrumpuntur.

FA C I L E autem intus corrumpuntur, panis fermentatus, & quisquis alius quam ex tritico est, & omne pistorium opus, lac, mel; itemque lactentia atque teneri pisces, ostrea, olera, caseus & recens & vetus, crassa vel tenera caro, vinum dulce, mulsum, defrutum, passum; quicquid denique vel jurulentum est, vel nimis dulce, vel nimis tenue.

G 5

De

^b De Viſt. Acut. LIX, 5.

De his , quæ intus minime vitiantur.

At minime intus vitiantur , panis sine fermento , aves , & eæ potius duriores , duri pisces , neque solum aurata puta , aut scarus , sed etiam lolligo , locusta , polypus : 5 item bubula , omnisque dura caro ; eademque aptior est , si macra , si salsa est ; omniaque salsamenta : cochleæ , murices , purpuræ : vinum austerum , vel resinatum.

C A P. XXIX.

10

De his , quæ alvum movent.

22, 6.

AT alvum movent , panis fermentatus , magisque si a cibariorum vel hordeaceus est ; brassica , si subcruda est , lactuca , anethum , nasturtium , ocimum , urtica , portulaca , radicola , capparis , allium , cepa , malva , lapathum , beta , asparagus , cucurbita , cerasa , mora , poma omnia mitia , ficus etiam arida , sed magis viridis , uvæ 20 recentes pingues , minutæ aves , cochleæ , garum , salsamentum , ostrea , pelorides , echini , musculi , & omnes fere conchulæ , maximeque jus earum ; saxatiles , & omnes teneri pisces , sepiarum atramentum ; si 25 qua caro assumitur pinguis , eadem vel jurulenta , vel elixa ; aves , quæ natant ; mel crudum , lac , lactentia omnia , mulsum , vinum dulce vel salsum , aqua , omnia tenera , tepida , ^b dulcia , pinguis , elixa , jurulenta , salsa , diluta. 30

C A P.

^a Victor. Variar. Lect. I. 22. ^b Athen. Deipn. III. 33.

C A P. XXV.

De his, quæ alvum adstringunt.

32, 9.

CONTRA adstringunt, panis ex filigine,
 vel ex simila; magis, si sine fermento
 est; magis etiam si tostus est; intenditurque
 vis ejus etiam, si bis coquitur: pul-
 ticula vel ex alica, vel ex panico, vel ex
 milio; itemque ex iisdem sorbitio; & ma-
 10 gis, si hæc ante fricta sunt: lenticula cui vel
 beta, vel intubus, vel ambubeia, vel plan-
 tago adjecta est; magisque etiam, si illa
 ante fricta est: per se etiam intubus, vel ex
 plantagine, vel * ambubeia fricta; minuta
 15 olera, brassica bis decocta; dura ova; magis-
 que si assa sunt: minutæ aves, merula, pa-
 lumbes; magisque, si in posca decocta est:
 grus, omnesque aves, quæ magis currunt,
 quam volant; lepus, caprea; jecur ex his,
 20 quæ sebum habent, maximeque bubulum,
 ac sebum ipsum: a caseus, qui vehementior
 vetustate fit, vel ea mutatione, quam in eo
 transmarino videmus; aut si recens est, ex
 melle, mulsove decoctus: item mel co-
 25 ctum, pira immatura, sorba, magisque ea,
 quæ torminalia vocantur, mala cotonea,
 & punica, oleæ vel albæ vel præmaturæ,
 myrta, palmulæ, purpuræ, murices, vinum
 resinatum vel asperum, item meracum,
 30 acetum, mullum quod inferbuit, as-
 perum item defrutum, passum, aqua vel
 tepida vel præfrigida, dura, id est, ea quæ
 tarde † putescit, ideoque pluviatilis potissi-
 mum, omnia dura, macra, austerâ, aspe-
 ra,

* Salm. Exerc. Plin. pag. 183. a F. ed. Ultraj.
 a De Viét. Acut. LIX, 5. † l. putrescit.

ra, tosta, & in eadem carne, assa potius, quam elixa.

C A P. XXXI.

De his, quæ urinam movent.

URINAM autem movent, quæcunque in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocimum, mentha, hyssopum, anisum, coriandrum, nasturtium, eruca, feniculum. præter hæc, 10 asparagus, capparis, nepeta, thymum, satureia, lampſana, pastinaca, magisque agrestis, radícula, siser, cepa. Ex venatione, maxime lepus, vinum tenue, piper & rotundum & longum, sinapi, apſinthium, 15 nuclei pinei.

C A P. XXXII.

De his, quæ ad somnum apta sunt.

SOMNO vero aptum est papaver, lactu- 20 ca, maximeque æstiva, cujus cauliculus jam lacte repletus est, morum, porrum.

De his, quæ sensum excitant.

Sensus vero excitant, nepeta, thymum, 25 satureia, hyssopum, præcipueque pulegium, ruta, & cepa.

C A P. XXXIII.

De his, quæ materiam evocant.

EVOCARE vero materiam multa admodum possunt: sed ea, cum ex peregrinis medicamentis maxime consent, aliisque magis, quam quibus ratione victus 30 succur-

succurritur, opitulentur, in præsentia differam: ponam vero ea, quæ prompta, & his morbis, de quibus protinus dicturus sum, apta, corpus erodunt, & sic ex eo, 5 quidquid mali est, extrahunt. Habent autem hanc facultatem, semina erucæ, nasturtii, radiculae; præcipue tamen omnium, sinapis. Salis quoque & fici eadem vis est.

10 *De his, quæ reprimunt.*

Leniter vero simul & reprimunt & molliunt, lana succida, ex aceto vel vino, cui oleum adjectum est; contritæ palmulæ, fursures in salsa aqua vel aceto decocti.

15 At simul reprimunt & refrigerant, herba muralis (parthenium vel perdicium appellant) serpillum, pulegium, ocimum, herba sanguinalis (quam Græci πολύγονον vocant) portulaca, papaveris folia, capreo- 20 lique vitium, coriandri folia, hyoscyamum, muscus, fiser, apium, solanum (quam ερύχνον Græci vocant) brassicæ folia, intubus, plantago, feniculi semen, contrita pira vel mala, præcipueque cotonea, lenticula, aqua frigida, maximeque pluvialis, 290, 18. vinum, acetum, & ex horum aliquo maddens vel panis, vel farina, vel sponsia, vel 204, 15. lacinia, vel lana succida, vel etiam linteolum, creta cimolia, gypsum, melinum, 30 myrteum, a rosa, acerbum oleum, verbenarum contusa cum teneris caulibus folia; cujus generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus, tamarix, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hederæ, punicum malum.

Sine

Sine frigore autem reprimunt, cocta cotonea, malicorium, aqua calida, in qua verbenæ coctæ sunt, quas supra proposui, pulvis vel ex fece vini, vel ex myrti foliis, amaræ nuces.

5

31, 20.

De his, quæ calefaciunt.

105,

11.

Calefacit vero, ex qualibet farina cataplasma, sive ex tritici, sive ex farris, sive hordei, sive ervi, vel lolii, vel milii, vel panici, vel lenticulæ, vel fabæ, vel lupini, vel lini, vel fœni græci, ubi ea deferbuit, calidaque imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quam ex aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex fele juncta oleo, magisque, si verus est, sal, nitrum, git, piper. quinque folium.

15

De his, quæ durant, aut emolliunt.

Fereque, quæ vehementer & reprimunt & refrigerant, durant: quæ autem calefaciunt & digerunt, ea emolliunt: præcipueque ad emolliendum potest cataplasma ex lini vel fœni græci semine.

20

His autem omnibus, & simplicibus, & permixtis, varie medici utuntur; ut magis, quid quisque persuaserit sibi, appareat, quam quid evidenter compererit.

25

30

LIBER TERTIUS.

CAP. I.

De morborum generibus.

PRÆVISIS omnibus, quæ pertinent ad universa genera morborum, ad singulorum curationes veniam. Hos autem in duas species Græci diviserunt; aliosque ex his acutos, alios longos esse dixerunt. Ideoque, quoniam non semper eodem modo respondebant, eosdem alii inter acutos, alii inter longos retulerunt. Ex quo, plura eorum genera esse, manifestum est. Quidam enim breves acutique sunt, qui cito vel tollunt hominem, vel ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub quibus neque sanitas in propinquo, neque exitium est. Tertiumque genus eorum est, qui modo acuti, modo longi sunt. idque non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est; sed in aliis quoque fit. Atque etiam, præter hos, quartum est; quod neque acutum dici potest, quia non perimit; neque utique longum, quia, si occurritur, facile sanatur. Ego, cum de singulis dicam, cujus quisque generis sit, indicabo.

Dividam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere videntur, & eos, qui oriuntur in partibus. Incipiam à prioribus, pauca de omnibus præfatus. In nullo quidem morbo plus fortuna sibi vendicare

care quam ars; ars, quam natura, potest: utpote cum, repugnante a natura, nihil medicina proficiat. Magis tamen ignoscendum medico est parum proficienti in acutis morbis, quam in longis. Hic enim breve 5
spacium est, intra quod, si quod auxilium non profuit, æger extinguitur: ibi & deliberationi, & mutationi remediorum tempus patet; adeo ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens æger sine illius 10
vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quo vetustior est; longus autem, quo recentior, eo facilius curatur. 15

18, 13. Alterum illud ignorari non oportet, quod non omnibus ægris eadem auxilia conveniunt. Ex quo incidit, ut alia atque alia summi authores, quasi sola, venditaverint, prout cuique cesserant. Oportet itaque, ubi aliquid non respondet, non tanti putare authorem, quanti ægrum, & experiri * aliud atque aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus, ut facit, sic 25
etiam solvit, non b statim condemnetur, si quid non statim profuit: minus vero removeatur, si quid paulum saltem juvat; quia profectus tempore expletur. 30

C A P.

a Hippocrat. Lex. T. II. 10. Seneca de Tranq. An. c. vi. † Hipp. de A. T. xx. 6. * Philo Judæus de Josepho pag. 531. ed. 1631. b Coel. Aurelian. Tard. pass. IV, 3. pag. 454.

C A P. II.

Quomodo morbi cognoscantur, & an increſcant, an minuantur, & qua ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat.

PROTINUS autem inter initia ſcire facile eſt, quis acutus morbus, quis longus ſit: non in his ſolum, in quibus ſemper ita ſe habet; ſed in his quoque, in quibus variat. Nam ubi ſine intermiſſionibus acceſſiones & dolores graves urgent, acutus morbus eſt. Ubi lentī dolores, lentæve febres ſunt, & ſpatia inter acceſſiones porriguntur, acceduntque ea ſigna, quæ in priore a volumine expoſita ſunt, longum hunc futurum eſſe, manifeſtum eſt.

Videndum etiam eſt, morbus an increſcat, an conſiſtat, an minuat: quia quædam remedia increſcentibus morbis, plura inclinatis conveniunt. Eaque, quæ creſcentibus apta ſunt, ubi acutus increſcens urget, in remiſſionibus potius experienda ſunt. Increſcit autem morbus, dum gravioreſ dolores, acceſſioneſque veniunt; hæque & ante, quam proximæ, revertuntur, & poſtea deſinunt. Atque in longis quoque morbis, etiam tales notas non habentibus, ſcire licet, increſcere, ſi ſomnus incertus eſt, ſi deterior concoctio, ſi foetidioreſ dejectioneſ, ſi tardior ſenſus, ſi pigrior mens, ſi percurrit corpus frigus aut calor, ſi id magis pallet. Ea vero, quæ contraria hiſ ſunt, decedentis eiꝰ notæ ſunt.

H

Præ-

Præter hæc, in acutis b morbis serius æger alendus est, nec nisi jam inclinatis; ut inedia, dempta materia, impetum frangat. In longis maturius, ut sustinere spatium affecturi mali possit. At, si quando is non in toto corpore, sed in parte est; magis tamen ad rem pertinet, vim totius corporis moliri, quam partis; cum per eam partes ægræ sanentur. Multum etiam interest, ab initio quis recte curatus sit, an perperam: 100 quia curatio minus his prodest, in quibus assidue frustra fuit. Si quis temere habitus, adhuc integris viribus vivit, admota curatione momento restituitur.

Sed cum ab his cœperim, quæ notas 15 quasdam futuræ adversæ valetudinis exhibent, curationum quoque principium ab animadversione ejusdem temporis faciam. Igitur, si quid ex his, quæ proposita sunt, incidit, omnium optima sunt, † quies 200 & abstinentia: si quid bibendum, aqua; idque interdum uno die fieri satis est; interdum, si terrentia manent, biduo: proximeque abstinentiam sumendus est cibus exiguus, bibenda aqua, postero die 25 etiam vinum, deinde invicem alternis diebus, modo aqua, modo vinum, donec omnis causa metus finiatur. per hæc enim sæpe instans gravis morbus discutitur. Plurimique falluntur, dum se primo die pro- 300 tinus sublaturus languorem, aut exercitatione, aut balneo, aut coacta dejectione, aut vomitu, aut sudationibus, aut vino sperant. non quod non interdum id incidat,

b Aph. I. 4. & 10. † Liv. 22. c. 18.

dat, aut non decipiat, sed quod sæpius fallat; solaque abstinencia sine ullo periculo medeatur. Cum præsertim etiam pro modo terroris moderari liceat: &, si leviora indicia fuerunt, satis sit à vino tantum abstinere; quod subtractum plus, quam si cibo aliquid dematur, adjuvat: si paulo graviora, satis sit, non aquam tantum bibere, sed etiam cibo carnem subtrahere: interdum panis quoque minus, quam pro consuetudine assumere, humidoque cibo esse contentum, & olere potissimum. Satisque sit, tum ex toto à cibo, à vino, ab omni motu corporis abstinere, cum vehementes notæ terruerunt. Neque dubium est, quin vix quisquam, qui non dissimulavit, sed per hæc mature morbo occurrit, ægroter.

CAP. III.

20 *De Febrium generibus.*

ATQUE hæc quidem sanis facienda sunt, tantum causam metuentibus. sequitur vero curatio febrium; quod & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus est. Ex his una a quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quædam redeunt, sed id raro evenit. In prioribus, & morbi sunt, & medicina.

30 Ac quartanæ quidem b simpliciores sunt. Incipiunt fere ab horrore; deinde calor erumpit; finitaque febre biduum integrum est. ita quarto die revertitur.

Tertianarum vero duo genera sunt. Al-

H 2

terum

terum eodem modo, quo quartana, & incipiens, & desinens; illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat integrum, tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem die revertitur, ex octo autem & quadraginta horis fere sex & triginta per accessionem occupat (interdum etiam vel minus, vel plus) neque ex toto in † remissione desistit; sed tantum levius est. Id genus plerique medici *ἐπιερίττιον* appellant.

Quotidianæ vero variæ sunt, & multiplices. Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus voco, ubi extremæ partes membrorum inalgescunt: horrorem, ubi totum corpus intremit. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas: aliæ sic, ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quædam reliquæ remaneant, donec altera accessio accedat: ac sæpe aliæ vix quicquam aut nihil remittunt, sed ita, ut cœpere, continuant. Deinde, aliæ fervorem ingentem habent, aliæ tolerabilem: aliæ quotidie pares sunt, aliæ impares; atque invicem altero die leniores, altero vehementiores: aliæ tempore eodem postridie revertuntur, aliæ vel ferius vel celerius: aliæ diem noctemque accessione & decessione implent, aliæ minus, aliæ plus: aliæ, cum decedunt, sudorem movent, aliæ non movent; atque aliàs per sudorem ad integritatem venit, aliàs corpus tantum imbecillius redditur. Accessio-

† Est proprium verbum medicorum, Gronov. ad Senec. Epist. 53.

cessiones etiam, modo singulæ singulis diebus fiunt, modo binæ pluresve concurrunt. Ex quo sæpe evenit, ut quotidie plures accessiones remissionesque sint; sic tamen, ut unaquæque alicui priori respondeat.

Interdum vero accessiones quoque confunduntur, sic ut notari neque tempora earum, neque spatia possint. Neque verum est, quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. Facilius enim semper curatio foret, si hoc verum esset. nam, quod evidentes causæ faciunt, facere etiam abditæ possunt. Neque de re, sed de verbo controversiam movent, qui, cum aliter aliterque in eodem morbo febres accedunt, non easdem inordinate redire, sed alias aliasque subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret, etiamsi vere diceretur. Tempora quoque remissionum modo liberalia, modo vix ulla sunt.

C A P. IV.

25

De Curationum diversis generibus.

ET febrium quidem ratio maxime talis est. Curationum vero diversa genera sunt, prout authores aliquos habent. Asclepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut jucunde curret. Id votum est: sed fere periculosa esse nimia & festinatio & voluptas solet. Qua vero moderatione utendum sit, ut quan-

H 3

tum

tum fieri potest, omnia ista contingant, prima semper habita salute, in ipsis partibus curationum considerandum erit.

Et ante omnia quæritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui, 5
medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur; eo quod a cruditatem maxime horrebant: deinde eam materiam, quæ lædere videbatur, ducendo sæpius alvum subtrahebant. Asclepiades medica- 100
29, 7. menta sustulit; alvum non toties, sed fe-
85, 7. re tamen in omni morbo, subduxit. Febre vero ipsa præcipue se ad remedium uti professus est. Convellendas etiam vires ægri putavit, luce, vigilia, siti ingenti; sic, ut 155
ne os quidem primis diebus elui fineret. Quo magis falluntur, qui per omnia jucundam ejus disciplinam esse concipiunt. Etenim ulterioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit, primis 200
vero tortoris vicem exhibuit.

Ego autem, medicamentorum dari portiones, & alvum duci non nisi raro debere, concedo. Et id non ideo tamen agendum, ut ægri vires convellantur, existimo: quo- 255
niam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantum materiam superantem oportet; quæ naturaliter digeritur, ubi nihil novi accedit. Itaque abstinendus à cibo primis diebus est, & in luce habendus 300
æger (nisi infirmus) interdium, quoniam corpus ista quoque digerit; isque cubare quam maximo conclavi debet.

Quod ad sitim vero somnumque pertinet,

net, moderandum est, ut interdiu vigilet;
 noctu, si fieri potest, conquiescat: ac ne-
 que potet, neque nimium siti crucietur.
 Os etiam ejus elui potest, ubi & siccum
 5 est, & ipsi foetet. quamvis id tempus aptum
 potioni non est. Commodeque Erasistratus
 dixit, sæpe, interiore parte humorum non
 requirente, os & fauces requirere; neque ad
 rem, male haberi ægrum, pertinere. Ac
 10 primo quidem sic tenendus est.

Optimum vero medicamentum est, op-
 portune cibus datus, qui quando primum
 dari debeat, quæritur. Plerique ex antiquis
 tarde dabant, sæpe quinto die, sæpe sexto,
 15 & id fortasse vel in Asia, vel in Ægypto, 8, 22.
 cœli ratio patitur. Asclepiades, ubi ægrum
 triduo per omnia fatigaverat, quartum diem
 cibo destinabat. At Themison iuper, non,
 quando coepisset febris, sed quando desisset,
 20 aut certe levata esset, considerabat, &, ab
 illo tempore expectato die tertio, si non
 accesserat febris, statim: si accesserat, ubi
 ea vel desierat, vel, si assidue inhærebat, si
 certe se inclinaverat, cibum dabat.

Nihil autem horum utique perpetuum 17, 2.
 est. Nam potest primo die primus cibus
 dandus esse, potest secundo, potest tertio,
 potest non nisi quarto, aut quinto; potest
 post unam accessionem, potest post duas; po-
 30 test post plures. Refert enim, qualis morbus
 sit, quale corpus, quale cœlum, quæ ætas,
 quod tempus anni. Minimeque, in rebus 18, 33.
 multum inter se differentibus, perpetuum
 esse præceptum temporis potest. In mor-

bo, qui plus virium aufert, celerius cibus dandus est: itemque eo b cœlo, quo magis digerit. Ob quam causam in Aphrica nullo die æger abstinere recte videtur. Maturius etiam puero, quam juveni: æstate, 5 quam hieme, dari debet. c Unum illud, & semper, & ubique servandum est, ut ægri
 78, 13. vires subinde assidens medicus inspiciat, &
 131, quamdiu supererunt, abstinencia pugnet;
 21, si imbecillitatem vereri cœperit, cibo sub- 10
 295, veniat. Id enim ejus officium est, ut ægrum,
 22. neque supervacua materia oneret, neque imbecillio- rem fame perdat. Idque apud Erasistratum quoque invenio: qui, quamvis parum docuit, quando venter, quando cor- 15
 pus ipsum exinaniretur, dicendo tamen, hæc esse videnda, & tum cibum dandum, cum corpori deberetur: satis ostendit, dum vires supereissent, dari non oportere; ne deficerent, consulendum esse. 20

Ex his autem intelligi potest, ab uno medico multos non posse curari: eumque, si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab ægro recedit. Sed, qui quæstui serviunt, quoniam is major ex populo est, li- 2
 beriter amplectuntur ea præcepta, quæ sedulitatem non exigunt; ut in hac ipsa re. Facile est enim dies vel accessiones numerare his quoque, qui ægrum raro vident: ille assideat necesse est, qui, quod solum 30
 opus est, visurus est, quando nimis imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit.

Est

- Est autem alia etiam de diebus d' ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum e impares sequebantur, eosque, tanquam tunc de ægris judicaretur, *ἡμέρας* † nominabant. † Hi
 5 erant dies tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, quartusdecimus, unus & vigesimus; ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni & vigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebant, ^{138, 9.}
 10 ut dierum imparium accessiones expectarent: deinde postea cibum, quasi levioribus accessionibus instantibus, darent: adeo ut Hippocrates, g si alio die febris desisset, recidivam timere sit solitus.
 15 Id Asclepiades jure ut vanum repudiavit; neque in ullo die, quia par imparve esset ægris vel majus vel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies pares fiunt; & opportunius post febrium ac-
 20 cessiones cibus datur. Nonnumquam etiam in ipso morbo, dierum ratio mutatur; fitque gravior, qui remissior esse consueverat. Atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam vim antiqui fatebantur.
 25 Qui cum octavum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius inciperet, ipsi sibi repugnabant, non octavum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendo, quasi potentio-
 30 rem plus enim tribuebant nono, & undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione, ab undecimo, non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem, ei, quem sep-
 H 5 timus

d I. Epidem. III. de Partu septim. VII. VIII.
 e Julian. Imper. Epist. pag. 207. † Cæl. Aurel.
 Acut. Morb. I. 14. † Aph. II, 23, 24. g Aph. IV, 61.

timus dies liberaturus sit, quantum esse gravissimum. Ita, illo quoque authore, in die pari & gravior febris esse potest, & certa futuri nota. Atque idem alio loco quantum quemque diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit; id est, quantum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimumseptimum: in quo ab impari ad paris rationem transit. Et ne in hoc quidem propositum conservavit: cum à septimo die undecimus, non quartus, sed quintus sit. Adeo apparet, quacumque ratione ad numerum respexerimus, nihil rationis, sub illo quidem authore, reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum Pythagorici numeri fefellerunt: cum hic quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri; & ex his conjectare, quando dandus cibus sit. 10 15 20

Illud autem magis ad rem pertinet, scire, cibumne oporteat dari, cum jam bene venæ conquieverunt, aut etiamnum manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum offerebant. Asclepiades, inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhaerente. In quo vanam rationem secutus est: non quod non sit interdum maturius cibus dandus, si mature timetur altera accessio: sed quod scilicet non nisi quam sanissimo dari debeat. * minus enim corrumpitur, quod integro corpori infertur. Neque tamen verum est, quod Themisoni videbatur, si duabus horis 25 30 ris

ris integer futurus esset æger, satius esse tunc dare; ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset optimum. Sed cum
 5 hoc breve tempus non præstet, satius est, principia cibi à decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi. Ita, si longius tempus secuturum est, quam integer-
 10 ex toto integer fiat. Quo loco vero integritas est, eodem est remissio, quæ maxime in febre continua potest esse. At hoc quoque quæritur, utrum tot horæ expectandæ sint, quot febrem habuerunt: an
 51 satis sit, primam partem earum præteriri, ut ægris jucundius insidat, quibus interdum non vacat. Tutissimum est autem, ante totius accessionis tempus præterire: quamvis, ubi longa febris fuit, potest in-
 20 dulgeri ægro maturius, dum tamen ante minimum pars dimidia prætereatur. Idque non in ea sola febre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus ita servandum est.

25

C A P. V.

De febrium speciebus, & singularum curationibus: & primo, quando cibus febricitantibus dandus sit.

30 **H**Æc magis per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit, eaque vel ex * inguine, vel ex lassitudine; vel ex æstu,

* Malim. *sanguine vel ingluvie*, quomodo enim ex inguine posset oriri febris? dein enumerat causas externas, quas inter inguen censer non potest.

æstu , aliave simili re fuit , sic , ut interior nulla causa metum fecerit , postero die , cum tempus accessionis ita transiit , ut nihil moveret , cibus dari potest. At , si ex alto calor venit ; & gravitas vel capitis vel præcordiorum secuta est ; neque apparet , quid corpus confuderit ; quamvis unam accessionem secuta integritas est : tamen , quia tertiana timeri potest , expectandus est dies tertius ; & , ubi accessionis tempus præterit , cibus dandus est , sed exiguus ; quia quartana quoque timeri potest. At die quarto demum , si corpus integrum est , eo cum fiducia utendum. Si vero postero , tertiove , aut quarto die secuta febris est ; scire licet , morbum esse. Sed tertianarum , quartanarumque (quarum & certus circuitus , & finis integer , & liberaliter quietæ tempora sunt) expeditior ratio est. de quibus suo loco dicam.

Nunc vero eas explicabo , quæ quotidie urgent. Igitur tertio quoque die cibus ægro commodissime datur ; ut alter febrem minuat , alter viribus subveniat. Sed is dari debet , si quotidiana febris est , quæ ex toto desinat , simulatque corpus integrum factum est : sin , quamvis non accessiones , febres tamen junguntur , & quotidie quidem increscunt , sed sine integritate tamen remittunt , cum corpus ita se habet , ut major remissio non expectetur : si altero die gravior , altero levior accessio est , post graviolem. Fere vero graviolem accessionem levior a nox sequitur : quo fit , ut graviolem accessionem nox quoque tristior antecedar.

At,

At, si continuatur febris, neque levior unquam fit, & dari cibum necesse est, quando dari debeat, magna dissensio est. Quidam, quia fere * remissius matutinum tempus ægris est, tunc putant dandum. Quod si respondet, non quia mane est, sed quia remissio est ægris, dari debet. Si vero ne tunc quidem ulla requies ægris est, quia hoc ipso pejus id tempus est, quod, cum sua natura melius esse debeat, morbi vitio non est, simulque insequitur tempus meridianum, à quo cum omnis æger fere pejor fiat, timeri potest, ne ille magis etiam, quam ex consuetudine, urgeatur. Igitur alii vespere tali ægro cibum dant. Sed, cum eo † tempore fere pessimi ‡ sint, qui ægrotant, verendum est, ne, si quid tunc moverimus, fiat aliquid asperius. Ob hæc alii differunt ad mediam noctem, decurso jam gravissimo tempore, eodemque longissime distante. Securius vero datur antelucanis horis; quibus omnes fere maxime dormiunt: deinde matutino tempore; quod natura sua levissimum est.

Si vero febres vagæ sunt: quia verendum est, ne cibum statim subsequantur; quandocunque quis ex accessione levatus est, tunc debet assumere. At, si plures accessiones eodem die veniunt, considerare oportet, pares ne per omnia sint (quod vix fieri potest) an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessionem cibus dari debet, quæ non inter meridiem & vespere definit. Si impares sunt: con-

fideran-

* Cæl. Aurel. Morb. Chronic. II. 14. p. 427. Buxtorf. Lex. Chald. p. 540. † Cæl. Aurel. A.M. I. I. c. 15. p. 48. ‡ Achill. Tassus de Clitophont. pag. 21.

siderandum est, quo distent. Nam, si altera gravior, altera levior est, post graviolem dari debet: si altera longior, altera brevior, post longiorem: si altera gravior, altera longior est, considerandum est, utra magis affligat, illa vi, an hæc tempore, & post eam dandus est. Sed plane plurimum interest, quantæ qualesque inter eas remissiones sint. Nam, si post alteram febrem motio manet, post alteram integrum corpus est; integro corpore, cibo tempus aptius est.

Si semper febricula manet; sed alterum tamen longius tempus remissionis est; id potius eligendum est: adeo ut, ubi accessiones continuantur, protinus, inclinata priore, dandus cibus sit. Etenim perpetuum est, ad quod omne consilium dirigi potest; cibum quam maxime semper ab accessione futura reducere: & hoc salvo, dare quam integerrimo corpore. Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones servabitur. Sed, cum sit aptissimum, tertio quoque die cibum dare; tamen, si corpus infirmum est, quotidie dandus est: multoque magis, si continentes febres sine remissione sunt; quantoque magis corpus affligunt; aut si duæ pluresve accessiones eodem die veniunt. Quæ res efficit, ut & à primo die protinus cibus dari quotidie debeat, si protinus venæ conciderunt: & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest. Illud tamen in his servandum est; ut post eas febres

bres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum vero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur; scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita: deinde, cum decessio ejus consistit: tertium, si necesse est, quandocumque decedit: cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse, consistente jam incremento febris, aliquid offerre, quam incrementum: satius esse, instante, quam incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is, qui deficit, non sit sustinendus.

Neque hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem; seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam mali affectus interveniunt.

Cum vero semper ægros securos agere conveniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum præcipue, ubi cibum sumpserunt. Itaque, si qua sunt, quæ exasperatura eorum animos sunt; optimum est, ea, dum ægrotant, eorum notitiæ subtrahere: si id fieri non potest, sustinere tamen post cibum, postque somni tempus, & cum experrecti sunt, tum exponere.

CAP. VI.

Quando potiones febricitantibus dari expediat.

SEd de cibo facilior quidem cum ægris ratio est: quoniam sæpe stomachus hunc

hunc respuit, etiam si mens concupiscit. De potione vero ingens pugna est; coque magis, quo major febris est. Hæc enim sitim accendit, & tum maxime aquam exigat, cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est, ubi febris conquieverit, protinus sitim quoque quieturam: longiorumque accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum: ita celerius cum desinere sitire, qui non bibit. Necessesse est tamen, quanto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinent, tanto magis ægris in potione, quam in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet: nisi subito sic venæ conciderunt, ut cibis quoque dari debeat. Secundo vero, cæterisque etiam, quibus cibis non dabitur, tamen, si magna sitis urgebit, potio dari potest.

Ac ne illud quidem, ab Heraclide Tarentino dictum, ratione caret: ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet, expedire quoque per modicas portiones misceri novam materiam corruptæ. Illud videndum est, ut, qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoque: ubi sine illo datur, deligantur, cum ægrum dormire cupimus: quod fere sitis prohibet. Satis autem convenit, cum omnibus a febricitantibus nimius humor alienus sit, tum præcipue esse foeminis, quæ ex partu in febres inciderunt.

Sed cum tempora cibo potionique febris & remissionis ratio det, non est expedi-

peditissimum scire , quando æger febricitet , quando melior sit , quando deficiat : sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus , † fallacissimæ rei ; quia sæpe istæ lentiores celerioresve sunt , & ætate , & sexu , & corporum natura. Et plerunque satis sano corpore , si stomachus infirmus est , nonnunquam etiam incipiente febre , subeunt & quiescunt : ut imbecillus is videri possit , cui facile lauro gravis instat accessio. Contra sæpe eas concitat & resolvit sol , & balneum , & exercitatio , & metus , & ira , & quilibet alius animi affectus. adeo ut , cum primum medicus venit , sollicitudo ægri dubitantis , quomodo illi se habere videatur , eas moveat. Ob quam causam , a periti medici est , non protinus ut venit , apprehendere manu brachium : sed primum residere hilari vultu , percunctarique , quemadmodum se habeat ; & , si quis ejus metus est , eum probabili sermone lenire ; tum deinde ejus carpo manum admovere. Quas venas autem conspectus medici movent , quam facile mille res turbant ! Altera res est , cui credimus , calor , æque fallax. Nam hic quoque excitatur æstu , labore , somno , metu , sollicitudine.

Igitur intueri quidem etiam ista oportet : sed his non omnia credere. Ac protinus quidem scire , non febricitare eum , cujus venæ naturaliter ordinatæ sunt , teporque talis est , qualis esse sanis solet : nec protinus etiam sub calore motuque febrem

I

sefe

† Pancirolæ observ. iv. 2 De decent. ornatu T. ix. x. Pallad. Sophist. in l. v. Epidem. pag. m. 201. Actuar. de M. M. II, 2.

sefe concipere : sed ita , si summa quoque arida inæqualiter cutis est ; si calor & in fronte est , & ex intimis præcordiis oritur ; si spiritus ex naribus cum fervore prorumpit ; si color , aut rubore , aut pallore novo mutatus est ; si oculi graves , & aut persicci , aut subhumidi sunt ; si sudor , cum fit , inæqualis est ; si venæ non æquis interval-
lis moventur. Ob quam causam medicus neque in tenebris , neque à capite ægri de-
bet residere ; sed illustri loco adversus eum , ut omnes notas , ex vultu quoque cubantis perspiciat.

Ubi vero febris fuit , atque decrevit , spectare oportet , num tempora , partesve cor-
poris aliæ paulum madescant , quæ sudorem venturum esse testentur. Ac si qua ejus nota est , tunc demum dare potui calidam aquam , cujus salubris effectus est , si sudorem per omnia membra diffundit. Hujus
135, 21. autem rei causa , continere æger sub veste satis multa manus debet ; eademque crura , pedesque contegere : qua mole plerique ægros in ipso imperu febris , potissimeque ubi ardens ea est , male habent. Si sudare
25 corpus cœpit , linteum tepescere oportet , paulatimque singula membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est , aut si is non venit , ubi quam maxime tepuit , & idoneus esse cibo æger videtur , sub veste leniter un-
30 gendus est , tum detergendus , deinde ei cibus dandus.

Cibus † autem febricitantibus humidus est aprissimus , aut humori certe quam
proxi-

proximus : utique ex materia quam levissima ; maximeque † sorbitio : eaque , si magnæ febres fuerunt , quam tenuissima esse debet. Mel quoque despumatum huic recte
5 adjicitur , quo corpus magis nutriatur : sed id , si stomachum offendit , supervacuum est ; sicut ipsa quoque sorbitio. Dari vero in vicem ejus potest , vel intrita ex aqua calida , vel alica elota ; si firmus est stomachus , & compressa alvus , ex aqua multa ;
10 si vel ille languet , vel hæc profluit , ex posca. Et primo quidem cibo ita satis est : secundo vero aliquid adjici potest , ex eodem tamen genere materiæ , vel olus ,
15 vel conchylium , vel pomum. At , dum febres quidem incresecunt , hic solus idoneus cibus est. Ubi vero aut desinunt , aut levantur , semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia levissima , adjiciendum
20 vero aliquid ex media , ratione habita subinde & virium hominis , & morbi.

Apponendi vero ægro varii cibi (sicut Asclepiades præcepit) tum demum sunt , ubi fastidio urgetur , neque satis vires sufficiunt ;
25 ut paulum ex singulis degustando , famem viter. At si neque vis , neque cupiditas deest , nulla varietate sollicitandus æger est ; ne plus assumat , quam concoquat. Neque verum est , quod ab eo dicitur , facilius
30 concoqui cibos varios ; eduntur quidem facilius : ad concoctionem autem materiæ genus & modus pertinent. Neque inter magnos dolores , neque incresecente b morbo , tutum est , ægrum cibo impleri ; sed

† Hippocr. de Vet. M. XI. XII. b Aph. I, 7, 8.

ubi inclinata jam in melius valetudo est.

Sunt aliae quoque observationes in febris necessariae; atque id quidem videntum est, quod quidam solum praecipunt, an adstrictum corpus sit, an profluat. Quorum alterum strangulat, alterum digerit. Nam, si adstrictum est, ducenda alvus est, movenda urina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest. Utile est etiam ducere in balneum, prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multaque aqua fovere inguina; interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere; uti cibo rarius & ferius, tenui, simplici, molli, calido, exiguo; maximeque oleribus, qualia sunt, lapathum, urtica, malva; vel jure etiam concharum, musculorumve, aut locustarum: neque danda caro, nisi elixa, est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc, ultra quam sitis coget. Poteritque à balneo etiam pingue jus, aut dulcius dari vinum: poterit semel, aut bis interponi Græcum falsum.

37, 7. Contra vero, si corpus profluat, sudor
147, coercendus, quies adhibenda erit; tenebris,
19. somnoque, quandocunque volet, utendum; non nisi levi gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subveniendum. Nam, si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decrevit, libera-

beraliter oportet aquam tepidam potui dare, & vomere cogere; nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet, aut vetus morbus est.

5 Si vero sudor exercet, duranda cutis est, vel nitro, vel sale; quæ cum oleo miscentur. At, si levius id vitium est, oleo corpus unguendum est: si vehementius, rosa, vel melino, vel myrteo, cui vinum austerum fit adjectum.

10 Quisquis autem fluore æger est, cum venit in balneum, prius unguendus, deinde in solum demittendus est. Si in cute vitium est, frigida quoque, quam calida aqua
51 melius utetur. Ubi ad cibum ventum est, dari debet his valens, frigidus, siccus, simplex, qui quam minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, vinum austerum, vel certe subausterum; &, si venter pro-
20 fluit, calidum: si sudores nocent, vomitulse sunt, frigidum.

C A P. VII.

Quomodo pestilentes febres curari debeant.

25 **D**ESIDERAT etiam propriam animadversionem in febribus pestilentiae casus. In hac minime utile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere
30 alvum. Si vires sinunt, sanguinem mittere optimum est; præcipueque, si cum ardore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut levata, vomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quam

in aliis morbis , ducere in balneum opus est ; vinum calidum , & meracius dare , & omnia glutinosa : inter quæ quoque carnem , generis ejusdem. Nam quo celerius ejusmodi tempestates corripiunt , eo maturius auxilia , etiam cum quadam temeritate , rapienda sunt. Quod si puer est , qui laborat ; neque tantum robur ejus est , ut sanguis mitti possit , cucurbitulis ei utendum est ; ducenda alvus vel aqua vel pri-
sanæ cremore ; tum demum is levibus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri , ut viri , curari debent. Ergo , ut in alio quoque genere morborum , parcius in his agendum est : non facile sanguinem mitte-
re , non facile ducere alvum , non cruciare vigilia , fameve , aut nimia siti , non vino curare. Vomitus post febrem eliciendus est : deinde dandus cibus ex levissimis ; tum is dormiat : postero die , si febris manet ,
abstineat : tertio , ad similem cibum redeat. Dandaque opera est , quantum fieri potest , ut inter opportunam abstinentiam cibo opportuno , omissis cæteris , nutriatur.

2. *Curatio ardentis febris.*

Si vero ardens febris extorret , nulla medicamenti danda potio est ; sed in ipsis accessionibus oleo & aqua refrigerandus est : quæ miscenda manu sunt , donec albescant. Etiam amplo conclavi tenendus ,
quo multum & purum aerem trahere possit ; neque multis vestimentis strangulandus , sed admodum levibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum im-
poni ,

poni, folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. Alendus maturius est, id est à die tertio, & antecibum iisdem perungendus. Si pituita in stomacho coit, inclinata jam accessione, vomere cogendus est; & tunc dandum frigidum olus, aut pomum, ex his, quæ stomacho conveniunt. Si siccus manet stomachus, protinus vel pisanæ, vel alicæ, vel oryzæ cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum vero in summo incremento morbus est, utique non ante diem quartum, magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem; & cum jam venter & præcordia ultra modum repleta, satisque refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt; sed ipsa aqua frigida, tantum ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Ubi utrumlibet factum est, multa veste operiendus est, ^{131,} & collocandus, ut dormiat. Fereque post ^{21,} longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus venit; per quem ingens sudor effunditur, idque præsentissimum auxilium est: sed in his tantum, in quibus præter ardorem, nulli dolores, nullus præcordiorum tumor; nihil prohibens, vel in pulmone, vel in faucibus; non ulcus, non defectio, non profluvium alvi fuit. Si quis autem in huiusmodi febre leniter a tussit, is neque vehementi siti conflictari, neque bibere aquam frigidam debet; sed eo modo

136 A. CORN. CELSI Lib. 3.
curandus est , quo in cæteris febribus præ-
cipitur.

C A P. VIII.

*Curatio semitertianæ febris , quæ
ἡμιτερίανος dicitur.*

AT, ubi id genus tertianæ est , quod
ἡμιτερίανος Medici appellant , magna
cura opus est, ne id fallat. Habet enim
plerunque frequentiores accessiones deces- 10
sionesque , ut aliud morbi genus videri pos-
sit ; porrigiturque febris in horas viginti
quatuor, & triginta sex ; ut, quod idem est,
non idem esse videatur. Et magnopere ne-
cessarium est , neque dari cibum, nisi in ea 15
remissione , quæ vera est ; & , ubi ea venit,
protinus dari. Plurimique sub alterutro cu-
rantis errore subito moriuntur. Ac , nisi
magnopere aliqua res prohibet , inter initia
sanguis mitti debet ; tum dari cibus , qui 20
neque incitet febrem , & tamen longum ejus
spatium sustineat.

C A P. IX.

Curatio lentarum febrium.

NONNUNQUAM etiam lentæ febres 25
sine ulla remissione corpus tenent ; ac
neque cibo , neque ulli remedio locus
est. In hoc casu medici cura esse debet , ut
morbum mutet : fortasse enim curationi 30
opportuniior fiet. Sæpe igitur ex aqua fri-
gida , cui oleum sit adjectum , corpus ejus
pertractandum est , quoniam interdum sic
evenit , ut horror oriatur , & fiat initium
quod-

quoddam novi motus; exque eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo & sale salubris videtur.

5 At, si diu frigus est, & torpor, & jactatio corporis, non alienum est, in ipsa febre dare
* mulsi tres aut quatuor cyathos, vel cum cibo vinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris; & major ortus calor simul
10 & priora mala tollit, & spem remissionis, inque ea curationis ostendit.

Neque hercule ista curatio nova est, qua nunc quidam traditos sibi ægros, qui sub cautiore medicis trahebantur, in-
15 terdum † contrariis remediis sanant. Siqui- 19, 15.
dem apud antiquos quoque ante Herophilum & Erasistratum, maximeque post Hippocratem fuit Petron quidam, qui febricitantem hominem, ubi acceperat, multis
20 vestimentis operiebat, ut simul calorem 134,
ingentem, suumque excitaret. Deinde, ubi 34.
paulum remitti cœperat febris, aquam frigidam potui dabat; ac, si moverat sudorem, explicuisse se ægrum judicabat: si non mo-
25 verat, plus etiam aquæ frigidaë ingerebat, & tum vomere cogebar. Si alterutro modo febre liberaverat, protinus suillam as-
sam, & vinum homini dabat. Si non liberaverat, decoquebat aquam sale adjecto,
30 camque bibere cogebar, ut vomendo ventrem purgaret.

Et intra hæc omnis ejus medicina erat. Eaque non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant; quam

I 5

nunc

* *Mulsa* Rom. I.eg. † Senec. de Clem. I. 9.

475, 19. nunc est his, quos Herophili vel Erasistrati æmuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina; quia plures, si proutinus à principiis excepit, interemit. Sed, cum eadem omnibus convenire non possint, fere, quos ratio non restituit, temeritas † adjuvat. Ideoque ejusmodi medici melius alienos ægros, 121, 9. quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoque hominis, & novare interdum, & 100 augere morbum, & febres accendere; quia curationem, ubi id, quod est, non recipit, potest recipere id, quod futurum est.

C A P. X.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, & præcordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabritiem linguæ.

CONSIDERANDUM etiam est, febres ne solæ sint, an alia his quoque mala accedant; id est, num caput doleat, num lingua aspera, num præcordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, & id ingerere: deinde habere duo pitacia, quæ latitudinem frontis, longitudinemque æquent: ex his invicem alterum in aceto & rosa habere, alterum in fronte; aut intinctam iisdem lannam succidam imponere. Si acetum offendit, pura rosa utendum est. Si rosa ipsa lædit, oleo acerbo. Si ista parum juvant, teri potest vel iris arida, vel nuces amaræ, vel quælibet herba ex refrigerantibus. Quorum quidlibet ex aceto impositum, dolorem

† Exemp. vide apud Valleriolam lib. 3. obs. 4.

dolorem minuit ; sed magis aliud in alio.
Juvat etiam panis cum papavere injectus,
vel cum rosa , cerusa , spumave argenti. Ol-
facere quoque vel serpillum , vel anethum ,
5 non lienum est.

At , si in præcordiis inflammatio & do-
lor est , primo superimponenda sunt cata-
plasmata reprimentia ; ne , si calidiora fue-
rint , plus eo materiæ concurrat. Deinde ,
10 ubi prima inflammatio se remisit , tunc de-
mum ad calida & humida veniendum est ;
ut ea , quæ remanserunt , discutiant. Notæ
vero inflammationis sunt quatuor , rubor ,
& tumor , cum calore , & dolore. Quo ma-
15 gis erravit Erasistratus , qui febrem nullam 5, 7.
sine hac esse dixit.

Ergo , si sine inflammatione dolor est ,
nihil imponendum est. hunc enim statim
ipsa febris solvet. At , si neque inflammatio , 70, 3.
20 neque febris , sed tantum præcordiorum
dolor est ; protinus calidis & siccis fomen-
tis uti licet. Si vero lingua sicca est , &
scabra , detergenda primum penicillo est
ex aqua calida : deinde ungenda mixtis in-
25 ter se rosa & melle. Mel purgat , rosa re-
primit , simulque siccescere non finit. At
si scabra non est , sed arida , ubi penicillo
deterisa est , ungi rosa debet , cui ceræ sit
paulum adjectum.

30

C A P. XI.

*Remedia contra frigus, quod febrem
præcedit.*

SOLET etiam ante febres esse frigus; idque vel molestissimum morbi genus est. Ubi id expectatur, omni potione prohibendus æger est: hæc enim paulo ante data, multum malo adjicit. Item maturius 100 veste multa tegendus est. Admovenda partibus his, pro quibus metuimus, sicca & calida fomenta: sic, ut ne statim vehementissimi calores incipiant, sed paulatim incrementum accipiant. Perfricandæ quoque eæ partes 155 manibus unctis ex vetere oleo sunt, eique adjiciendum aliquid ex calefacientibus. Contentique medici quidam una frictione, etiam ex quolibet oleo, sunt. In harum febrium remissionibus nonnulli tres quatuor 200 forbitionis cyathos, etiamnum manente febre, dant: deinde, ea bene finita, reficiunt stomachum cibo frigido & levi. Ego tum hoc puto tentandum, cum parum cibis, semel & post febrem datus, prodest. 25

Sed curiose prospiciendum est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoque genere valetudinis jam minui febris videtur, & rursus intenditur. Itaque ei remissioni credendum est, quæ etiam immoratur, & jactationem, fervoremque corporis, quem ζέσιν Græci vocant, minuit. Illud satis convenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie parvum cibum dandum: 300

dum : si impares, post graviolem, cibum ;
post leviolem, aquam mulsam.

C A P. XII.

Curatio horroris in febribus.

5 **H** O R R O R autem eas fere febres antece-
dit, quæ certum habent circuitum, &
ex toto remittuntur ; ideoque a tutif-
simæ sunt, maximeque curationes admit-
10 tunt. Nam ubi incerta tempora sunt, ne-
que alvi ductio, neque balneum, neque vi-
num, neque medicamentum aliud recte da-
tur. Incertum est enim, quando febris ven-
tura sit : ita fieri potest, ut, si subito vene-
15 rit, summa in eo perniciēs sit, quod auxilii
causa fuit inventum. Nihilque aliud fieri
potest, quam ut primis diebus bene absti-
neat æger : deinde, sub decessu febris ejus,
quæ gravissima est, cibum sumat.

20 At ubi certus circuitus est, facilius o-
mnia illa tentantur ; quia facilius propone-
re nobis & accessionum & decessionum
vices possumus. In his autem, cum b vetera-
verunt, utilis fames non est. Primis tan-
25 tummodo diebus ea pugnandum est : dein-
de dividenda curatio est, & ante horror,
tum febris discutienda. Igitur cum pri-
mum aliquis inhorruit, & ex horrore inca-
luit, dare ei oportet potui tepidam aquam
30 subsalsam, & vomere eum cogere : nam
fere talis horror ab his oritur, quæ biliosa
in stomacho resederunt. Idem faciendum
est, si proximo quoque circuitu æque ac-
cessit : sæpe enim sic discutitur. Jam-
que

a Aph. IV, 43. b *In vetera verunt*, Rittershus. ad
Phædr. 1. Fab. 2.

que , quod genus febris sit , scire licet.

Itaque sub expectatione proximæ accessionis , quæ instare incerta potest , deducendus in balneum est ; dandaque opera est , ut per tempus horroris in solio sit. Si ibi quoque senserit , nihilominus idem sub expectatione accessionis quarræ faciat : siquidem eo quoque modo sæpe is discutitur. Si nec balneum quidem profuit , ante accessionem allium edat , aut bibat calidam aquam cum pipere : siquidem ea quoque assumpta calorem movent ; qui horrorem non admittit. Deinde eodem modo , quo in frigore præceptum est , antequam inhorrescere possit , operiatur. fomentisque protinus calidioribus totum corpus circumdare convenit , maximeque involutis extinctis testis & titionibus.

Si nihilominus horror pertruxerit , multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur ; cui æque ex calefacientibus aliquid sit adjectum : adhibeaturque frictio , quantam is sustinere poterit , maximeque in manibus & pedibus : & spiritum ipse contineat. Neque desistendum est , etiam si horror redit. sæpe enim pertinacia juvantis malum corporis vincit.

Si quid evomuit , danda aqua tepida , iterumque vomere cogendus est ; utendumque eisdem est , donec horror finiatur. Sed præter hæc ducenda alvus est , si tardius horror quiescet : siquidem id quoque exonerato corpore prodest. Ultima post hæc auxilia sunt , gestatio & ambulatio. Cibus autem

autem in ejusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem alvum præstet, ac caro glutinosa. Vinum cum dabitur, austerum sit.

C A P. XIII.

Curatio quotidiana febris.

HÆc ad omnes circuitus febrium pertinent: discernendæ tamen singulæ sunt, sicut rationem habent dissimilem. Si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet; tum cibus, altero quoque die uri. Si res inveteraverit, post febrem experiri balneum, & vinum; magisque, si, horrore sublato, hæc superest.

C A P. XIV.

Curatio tertianæ febris.

SI vero tertianæ, quæ ex toto intermittit, aut quartana est; mediis diebus, & ambulationibus uri oportet, aliisque exercitationibus, & unctionibus. Quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus, in hoc genere morborum, multo ante accessionem, caput ægri multa ^a calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod, quamvis pleraque ejus viri præcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præteriit: est enim anceps.

Ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit alvum duci oportere: quinto, post horrorem vomitum elicere; deinde post febrem, sicut illi mos erat, adhuc

^a Aph. VII, 42.

huc calidis dare cibum & vinum: sexto die, in lectulo detineri: sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse, verisimile est. Tutius tamen est, hoc ipso ordine tria remedia, vomitus, alvi 5
ductionis, vini potus, per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare: nec vinum, nisi post accessionem, die septimo bibere.

Si vero primis diebus discussus morbus 10
non est, inciditque in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat; post febrem perfricetur: tum, cibo assumpto, bibat aquam; postero die, quo à cibo vacat, & ab exercitatione unctioneque, aqua tan- 15
tum contentus, conquiescat. Et id quidem optimum est. Si vero imbecillitas urgebit, & post febrem vinum; & medio die paulum cibi debet assumere.

C A P. XV.

20

Curatio quartanæ febris.

E A D E M in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tarde a admodum finiatur, nisi 25
si primis diebus discussa est, diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur, si cui cum horrore febris accessit, eaque desit, eodem die & postero tertioque continere se debet, & aquam tantummodo calidam primo die 30
post febrem sumere; biduo proximo, quantum fieri potest, ne hanc quidem: quarto die, si cum horrore febris revertitur, b vomere; sicut ante præceptum est: deinde post

post febrem , modicum cibum sumere ,
vini quadrantem. Postero tertioque die
abstinere ; aqua tantummodo calida , si si-
tis est , assumpta. Septimo die balneo frigus
5 prævenire , abstinere , continere se debet , &
aqua tantummodo calida , si sitis est , uti : ac-
tum ita nono die balneo frigus prævenire ,
& , si febris redierit , ducere alvum ; ubi ex
eo corpus conquieverit , inunctione vehe-
10 menter perfricari , eodem modo sumere
cibum , & vino biduo proximo se abstinere ,
frictione servata. Decimo tertio die
rursus balneum experiri ; & , si postea fe-
bris accessit , æque perfricari , vinum co-
15 piofius bibere. Ac sic proximum est , ut
quies tot dierum , & abstinencia cum cæte-
ris , quæ præcipiuntur , febrem tollant.

Si vero nihilominus remanet , aliud ex
toto sequendum est curationis genus ; id-
20 que agendum , ut , quod diu sustinendum
est , corpus facile sustineat. Quo minus
etiam curatio probari Heraclidis Tarenti-
ni debet , qui primis diebus ducendam
alvum , deinde abstinendum in septimum
25 diem dixit. Quod ut sustinere aliquis pos-
sit ; tamen etiam febre liberatus vix refe-
ctioni valebit. adeo , si febris sæpius accesserit
concidet. Igitur , si tertio decimo die
morbus remanebit , balneum neque ante
30 febrem , neque post eam tentandum erit ;
nisi interdum jam horrore discusso. Hor-
ror ipse per eadem , quæ supra præscripta
sunt , expugnandus. Deinde post febrem
oportebit ungi , & vehementer perfricari ;
K cibum

cibum & validum, & fortiter assumere; vino uti, quanto libebit: postero die, cum satis quieverit, ambulare, exerceri, ungi, perfricari fortiter; cibum accipere sine vino: tertio die abstinere.

Quo die vero febrem expectabit, ante surgere, & exerceri, dareque operam oportet, ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat: sic enim sæpe illa discutitur. At, si in opere occupavit, tum de-
mum se recipere. In ejusmodi valetudine, medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, vinum. Si venter adstrictus est, solvendus est.

Sed hæc facile validiores faciunt: si imbecillitas occupavit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est. Si hæc quoque vehemens onerat, intra quietem, & unctionem, & cibum consistendum est; danda-
que opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem † jugulat: sed, si ex ea facta quotidiana est, in malis æger est: quod tamen, nisi culpa vel ægri d vel curantis, nunquam
fit.

C A P. XVI.

Curatio duarum quartanarum.

AT, si duæ quartanæ sunt, neque, quas
proposui, exercitationes adhiberi possunt: aut ex toto quiescere opus est, aut, si id difficile est, leniter ambulare, hinc considerare, diligenter involutis pedibus

c Aristot. Probl. Sect. II, 58. † Tulpus observ. l. 3. cap. 53. d Hippocr. I. Epidem. Sect. III, 4.

bus & capite. Quoties febris accessit & defuit, cibum modicum sumere, & vinum; reliquo tempore, nisi imbecillitas urget, abstinere. At, si duæ febres pene junguntur, post utramque cibum sumere: deinde vacuo tempore, & moveri aliquantum, & post unctionem cibo uti. Cum vero vetus quartana raro, nisi vere a solvatur; utique eo tempore attendendum est, ne quid fiat, quod valetudinem impediat. Prodestque in vetere quartana, mutare subinde victus genus, à vino ad aquam, ab aqua ad vinum, à lenibus cibis ad acres, ab acribus ad lenes transire: esse radicem, deinde vomere: jureve pulli gallinacei ventrem resolvere: oleo ad frictiones adjicere calefacientia: ante accessionem sorbere, vel aceti cyathos duos, vel unum sinapis, cum tribus Græci vini falsi, vel mista paribus 37, 7. portionibus; & in aqua diluta, piper, castoreum, later, myrrham. Per hæc enim 27. similiaque corpus agitandum est, ut moveatur ex eo statu, quo detinetur.

Si febris quievit, diu meminisse ejus 25 diei convenit: eoque vitare frigus, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim revertitur, nisi à sano quoque aliquandiu timeretur.

C A P. XVII.

30 *Curatio quotidiana febris, quæ ex quartana facta sit.*

AT, si ex quartana, quotidiana facta est: cum id initio inciderit, per bi-

K 2

du-

duum abstinere oportet , vespere frictione
 uti , & aquam tantummodo potui dare.
 tercio die sæpe fit , ne febris accedat. Sed
 siue fuit , siue non fuit , cibus post accessio-
 nis tempus est dandus : & , si manet , per bi- 5
 duum abstinentia , quanta maxima impe-
 rari corpori potest , & frictione quotidie
 utendum est.

C A P. XVIII.

*De tribus insanix generibus : Et primo de
 ejus curatione , quæ à Græcis
 Φρενίτις dicitur.*

10

ET febrium quidem curatio exposita
 est. Superfunt vero alii corporis affe- 15
 ctus , qui huic superveniunt , ex qui-
 bus eos , qui certis partibus assignari pos-
 sunt , protinus jungam. Incipiam ab insa-
 nia , primamque hujus ipsius partem ag-
 grediar , quæ & acuta , & in febre est. Græci 20
 Φρενίτιν appellant.

Illud ante omnia scire oportet , inter-
 dum in accessione ægros desipere , & loqui
 aliena. Quod non quidem leve est ; neque
 incidere potest , nisi in febre vehementi , 25
 non tamen æque pestiferum est. nam ple-
 runque breve esse consuevit ; levatoque
 accessionis impetu , protinus mens redit.
 Neque id genus morbi remedium aliud
 desiderat , quam quod in curanda febre 30
 præceptum est.

Phrenitis a vero tum demum est , cum
 continua dementia esse incipit ; aut cum
 æger , quamvis adhuc sapiat , tamen quas-
 dam

dam vanas imagines accipit : perfecta est ,
ubi mens illis imaginibus addicta est. Ejus
autem plura genera sunt : siquidem ex
phreniticis alii hilares , alii tristes sunt : alii
5 facilius continentur , & intra verba desi-
piunt ; alii insurgunt , & violenter quædam
manu faciunt : atque ex his ipsis , alii nihil
nisi impetu peccant , alii etiam artes adhi-
bent ; summamque speciem sanitatis in ca-
10 prandis malorum operum occasionibus
præbent ; sed exitu deprehenduntur.

Ex his autem eos , qui intra verba desi-
piunt , aut leviter etiam manu peccant ,
onerare asperioribus coercitionibus su-
15 pervacuum est. Eos vero , qui violentius
se gerunt , vincire convenit ; ne vel sibi vel
alteri noceant. Neque credendum est , si
vinctus aliquis , dum levare vinculis cu-
pit , sanum jam se fingat ; quamvis pruden-
20 ter & miserabiliter loquatur , quoniam is
dolus insanientis est.

Fere vero antiqui tales ægros in tene-
bris habebant ; eo quod illis contrarium
esset , exterreri ; & ad quietem animi tene-
25 bras ipsas conferre aliquid judicabant. At
Asclepiades , tanquam ipsis tenebris terren-
tibus , † in lumine habendos eos dixit. Neu-
trum tamen perpetuum est. Alium enim
lux , alium tenebræ magis turbant. repe-
30 riunturque , in quibus nullum discrimen
deprehendi , vel hoc , vel illo modo possit.
Optimum itaque est , b utrumque experiri ;
& habere eum , qui tenebras horret , in lu-
ce ; eum , qui lucem , in tenebris. At ubi
K 3 nul-

† Cæl. Aurel. M. A. l. i. c. 15. p. 40. b. Cæl.
Aurel. Acut. Morb. l. 9. Arethaus de Curat. Acut. l. 1.

nullum tale discrimen est , æger , si vires habet , loco lucido : si non habet , obscuro continendus est.

Remedia vero adhibere , ubi maxime furor urget , supervacuum est : simul enim , febris quoque increfcit. Tum itaque nihil nisi continendus æger est. Ubi vero res patitur , festinanter subveniendum est. Asclepiades perinde esse dixit , his sanguinem * mitti , ac si c

25

Nec minus dubitari potest , an alvus du- cenda sit. Tum , interposito die , convenit caput ad † cutem tondere : deinde aqua fo- vere , in qua verbenæ aliquæ decoctæ sint ex reprimentibus : aut prius fovere , deinde 30 tondere , & iterum fovere : ac novissime rosa caput naresque implere ; offerre etiam naribus rutam , ex aceto contritam , & mo- vere sternutamenta medicamentis ad id effi-

* V. S. quando & qualis conveniat *Cæli. Aurel. Acut. Morb. I. c. 10.* c *Coel. Aurelian. Acut. Morb. I, 25.* d *Valeriola Observ. 1. lib. 1.* † *Coel. Aurel. Acut. Morb. I, 10. & c. 15.*

efficacibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus vires non defunt. Si vero imbecillitas est, rosa tantum caput, adjecto serpyllo, similive aliquo, madesaciendum est. Utiles etiam in quibuscumque viribus herbæ duæ sunt, solanum & muralis, si simul ex utraque, succo expresso, caput impleatur. Cum se febris remiserit, frictione utendum est: parcius tamen in his, qui nimis hilares, quam in his, qui nimis tristes sunt.

Adversus omnium autem sic insanientium animos gerere se pro cuiusque natura necessarium est. Quorundam enim vani metus levandi sunt: sicut in homine prædivite famem timente incidit; cui subinde falsæ hæreditates nunciabantur. Quorundam audacia coercenda est: sicut in his fit, in quibus continendis plagæ quoque adhibentur. Quorundam etiam intempestivus risus objurgatione & minis prohibendus est. Quorundam discutiendæ tristes cogitationes: ad quod symphonix, & cymbala, strepitusque proficiunt. Sæpius tamen assentiendum, quam repugnandum est: paulatimque, & non evidenter, ab his, quæ stulte dicuntur, ad meliora mens abducenda. Interdum etiam elicienda ipsius intentio: ut fit in hominibus studiosis literarum, quibus liber legitur, aut recte, si delectantur; aut perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando enim advertere animum incipiunt. Quin etiam recitare, si quæ meminerunt, cogen-

di sunt. Ad cibum quoque quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocaverunt.

Omniibus vero sic affectis somnus & facilis, & præcipue necessarius est. sub hoc enim plerique d sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad mentem ipsam componendam, crocinum unguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilant, quidam somnum moliantur potui dando a-¹⁰ quam, in qua papaver aut hyoscyamus decocta sint: alii mandragoræ mala pulvino subjiciunt: alii vel amomum, vel sycamini lachrymam fronti inducunt. Hoc nomen apud Medicos reperio. Sed cur Græci mo-¹⁵ rum *συκόμινον* appellant, cum mori nulla lachryma sit? Sic vero significatur lachryma arboris in Ægypto nascentis, quam ibi *συκόμορον* appellant. Plurimi decoctis papaveris corticibus, ex ea aqua cum spongia os²⁰ & caput subinde foveant.

Asclepiades ea supervacua esse dixit: quoniam in lethargum sæpe convertunt. Præcepit autem, ut primo die, à cibo, portione, somno abstineretur: vespere ei dare-²⁵ tur potui aqua: tum frictio admoveretur lenis, ita ut ne manum quidem, qui fricaret, vehementer imprimeret: postero deinde die, iisdem omnibus factis, vespere ei daretur sorbitio & aqua, rursusque frictio³⁰ adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem adeo, ut, illo confitente, nimia fricatio etiam lethargi periculum afferat. Sed

d Aph. II. 2, e Bodæus à Stapel ad Theophrast. Histor. Plant. IV, 2.

Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis arcessendus est: habita scilicet eadem moderatione, quæ hic quoque necessaria est; ne, quem obdormire volumus, excitare postea non possimus. Confert etiam aliquid ad somnum filanus juxta cadens; vel gestatio * post cibum, & noctu; maximeque lecti suspensi motus.

Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est, neque mens constat, neque somnus accedit, † occipitio inciso cucurbitulam admove: quæ quia levat morbum, potest somnum facere. Moderatio autem in cibo quoque adhibenda est: nam neque æger est implendus, ne insaniat: neque jejuni utique vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeque sorbitionis, & potione aquæ mulsæ, cujus ternos cyathos hieme, æstare vero quatuor dedisse satis est.

Alterum genus insanix est, quod spatium longius recipit; quia fere sine febre incipit, leves deinde febriculas excitat: & consistit in tristitia, quam videtur bilis fætra contrahere. In hac utilis detractio sanguine est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinentia: secunda, per album veratrum vomitumque purgatio: post utrumlibet, adhibenda bis die frictio est. Si magis valet, frequens etiam exercitatio; in jejuno vomitus; cibus, sine vino, dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet, etiam ex infirmissima dari posse, 155, 26.

K 5 dum

* Cœl. Aurel. A. M. I. 15. p. 46. † Cœl. Aurel. I. c. 11. p. 27. f Aretæus de Morb. Diut. l. 6. Trallian. I, 16.

dum ne ea sola quis utatur : valentissimam tantummodo esse removendam. Præter hæc , servanda alvus est quam tenerrima : removendi terrores , & potius bona spes afferenda : quærenda delectatio ex fabulis , ludisque , quibus maxime capi sanus assueverat : laudanda , si qua sunt , ipsius opera , & ante oculos ejus ponenda : leviter objurganda vana tristitia : subinde admonendus , in his ipsis rebus , quæ sollicitant , cur non 10 potius lætitiæ , quam solitudinis causa sit. Si febris quoque accessit , sicut aliæ febres curanda est.

Tertium insanix genus est ex his longissimum ; adeo ut vitam ipsam non impe- 15 diat. quod robusti corporis esse consuevit. Hujus autem species duæ sunt. Nam quidam imaginibus , non mente fallunt ; qualem insanientem Ajacem vel Orestem poetarum fabulæ ferunt : quidam animo desi- 20 piunt. Si imagines fallunt , ante omnia videndum est , tristes , an hilares sint. In tristitia , nigrum veratrum dejectionis causa ; in hilaritate , album , ad vomitum excitandum , dari debet. Idque , si in potione non 25 accipit , pani adjiciendum est , quo facilius fallat. Nam , si bene se purgaverit , ex magna parte morbum levabit. Ergo etiam , si semel datum veratrum parum profecerit , interposito tempore iterum dari debet. Ne- 30 que ignorare oportet , leviolem esse morbum cum g risu , quam serio insanientium. Illud quoque perpetuum est in omnibus morbis , ubi ab inferiore parte purgandus aliquis

aliquid est, h ventrem ejus ante solvendum esse: ubi à superiore, comprimendum.

Si vero consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optime curatur. Ubi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, vinculis, plagis coercendus est. Cogendus est & attendere, & ediscere aliquid, & meminisse. Sic enim fiet, ut paulatim metu cogatur considerare, quid faciat. Subito etiam terreri, & expavescere, in hoc morbo prodest; & fere, quicquid animum vehementer perturbat. Potest enim quædam fieri mutatio, cum ab eo statu mens, in quo fuerat, abducta est. Interest etiam, si ipse sine causa subinde rideat, an mæstus demissusque sit. Nam dementis hilaritas terroribus his, de quibus supra dixi, melius curatur. Si nimia tristitia est, prodest lenis, sed multa bis die frictio: item super caput aqua frigida infusa, demissumque corpus in aquam & oleum.

Illa communia sunt: insanientes vehementer exerceri debere; multa frictione uti; neque pinguem carnem, neque vinum assumere; cibis uti post purgationem, ex media materia, quam levissimis, non oportere esse vel solos, vel inter ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut negligant; mutare debere regiones, & si mens redit, annua peregrinatione esse jactandos.

Raro, sed aliquando tamen, ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium, specie simile, similique victus genere curandum est: præterquam quod in hoc

hoc infaniæ genere solo recte vinum datur.

CAP. XIX.

a De Cardiacis,

HIS morbis præcipue contrarium est id genus, quod καρδιακὸν à Græcis nominatur; quamvis sæpe ad eum phrenitici transeunt: siquidem mens in illis laborat, in hoc vero constat. Id autem nihil aliud est, quam nimia imbecillitas corporis; quod, stomacho languente, immodico sudore digeritur. Licetque protinus scire id esse, ubi venarum exigui imbecillique pulsus sunt; sudor autem supra consuetudinem, & modo, & tempore, ex toto thorace, & cervicibus, atque etiam ex capite prorumpit, pedibus tantummodo, & cruribus siccioribus, atque frigidis. Acuti id morbi genus est.

Curatio prima est, supra præcordia imponere, quæ reprimunt, cataplasmata: secunda, sudorem cohibere. Id præstat acerbum oleum, vel rosa, vel melinum, aut myrreum. Quorum aliquo corpus leniter perungendum; ceratumque ex aliquo horum tum imponendum est.

Si sudor vincit, delinendus homo est vel gypso, vel argenti spuma, vel cimolia creta, vel subinde horum pulvere respergendus. Idem præstat pulvis ex contritis aridæ myrti vel rubi foliis, aut ex austeri & boni vini arida fece. Pluraque similia sunt, quæ si desunt, satis utilis est quilibet

ex

a Coel. Aurelian. Acut. Morb. II, 30, 31. Tralian. VII, 9.

ex via pulvis injectus. Super hæc vero, quo minus corpus infudet, levi veste debet esse contextus, positusque loco non calido, fenestris patentibus, sic ut perflatus quoque aliquis accedat.

Tertium auxilium est, imbecillitati jacentis cibo vinoque succurrere. Cibus non multus quidem, sed sæpe tamen nocte ac die dandus est; ut nutriat, neque oneret. Is esse debet ex infirmissima materia, & stomacho aptus. Nisi autem necesse est, ad vinum festinare non oportet. Si verendum est, ne deficiat, tum & intrita ex hoc, & hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue, meraculum, egelidum subinde & liberaliter dandum est; adjecta polenta, si modo is æger parum cibi assumit. Idque vinum esse debet, neque nullarum virium, neque ingentium: recteque tota die ac nocte, duas vel tres heminas æger bibet; si vastius corpus est, plus etiam: si cibum non accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida convenit, & tum dare.

Quod si stomachus resolutus parum continet, & ante cibum, & post eum sponte vomere oportet; rursusque post vomitum cibum sumere. Si ne is quidem manserit, sorbere vini cyathum, interpositaque hora, sumere iterum. Si id quoque stomachus reddiderit, totum corpus bulbis contritis superillinendum est: qui, ubi inaruerunt, efficiunt, ut vinum in stomacho contineatur, exque eo toti corpori calor venisque vis redeat.

Ulti-

Ultimum auxilium est, in alvum ptisanæ vel alicæ cremorem ex inferioribus partibus indere, siquidem id quoque vires tuetur. Neque alienum est, naribus quoque æstuantis admovere, quod reficiat; ut est rosa & vinum: &, si qua in extremis partibus frigent, unctis & calidis manibus fovere. Per quæ si consequi potuimus, ut & sudoris impetus minuatur, & vita prorogetur, incipit jam tempus ipsum esse præsidio. Ubi esse in tuto videtur, verendum tamen est, ut ne in eandem imbecillitatem cito recidat. Itaque, vino tantum remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere; donec satis virium corpori redeat.

C A P. XX.

De Lethargicis.

ALTER quoque morbus est; aliter phrenitico † contrarius. In eo difficilior somnus, prompta ad omnem audaciam mens est: in hoc marcor, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas. *λήθαργον* Græci nominarunt. Id quoque genus acutum est, &, nisi succurritur, celeriter jugulat.

Proinde ex eo ægros quidam excitare nituntur, admotis his, per quæ sternutamenta evocantur, & his, quæ odore fœdo movent, qualis est pix usta, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cepa. Juxta etiam galbanum incendunt, aut cornu cervinum: si non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odore fœdo movent.

Thar-

† Alex. Trall. l. 14. * Coel. Aur. M. A. L. II. c. 1. a Trallian. l. 15. Aretæus de Morbor. Acut. Curat. l. 2.

Tharrias vero quidam , accessionis esse
malum , dixit , levarique , cum ea decessit.
itaque eos , qui subinde excitant , sine usu
male habere. Interest autem , in decessione
expergiscatur æger , an , cum febris levatur ,
ut , levata quoque ea , somnus urgeat. Nam
i expergiscitur , adhibere ei , ut sopito , su-
pervacuum est. neque enim vigilando
melior fit ; sed per se , si melior est , vigi-
at. Si vero continens ei somnus est , uti-
que excitandus est ; sed his temporibus ,
quibus febris levissima est , ut excernat
aliquid , & sumat. Excitat autem validissi-
me repente aqua frigida superinfusa. Post
remissionem itaque , perunctum oleo
multo totum corpus , tribus aut quatuor
amphoris totum per caput perfundendum
est. Sed hoc utemur , si æqualis ægro spi-
ritus erit , si mollia præcordia. Sin aliter
hæc erunt , ea potiora , quæ supra compre-
hensa sunt. Et , quod ad somnum quidem
pertinet , commodissima hæc ratio est.

Medendi autem causa , caput radendum ;
deinde posca fovendum est , in qua laurus ,
aut ruta decocta sit. Altera vero die impo-
nendum castoreum , aut ruta ex aceto con-
trita , aut lauri baccæ , aut hedera cum ro-
sa & aceto. Præcipueque proficit , & ad
excitandum hominem , naribus admo-
tum ; & ad morbum ipsum depellendum ,
capiti frontivi impositum sinapi. Gestatio
etiam in hoc morbo prodest : maximeque
opportune cibus datus , id est , in remissio-
ne , quanta maxima inveniri poterit. Ap-
tissima

tissima autem sorbitio est, donec morbus decreſcere incipiat. Si autem quotidie gravis accessio est, hæc quotidie detur: si alternis, post gravio-rem, sorbitio; post levio-rem, mulſa aqua. Vinum quoque cum tempeſtivo cibo datum non mediocriter adjuvat.

Quod si post longas febres ejusmodi torpor accessit, cætera eadem ſervanda ſunt. Ante acceſſionem autem, tribus quatuorve horis, si venter aſtrictus est, dandum est caſtoreum cum ſcammonea; si non est, per ſe ipſum caſtoreum cum aqua dandum est. Si præcordia mollia ſunt, cibis utendum est plenioribus: si dura, in iſſidem ſorbitio- nibus ſubſiſtendum; imponendumque præcordiis, quod ſimul & reprimat & emolliat.

451.

C A P. XXI.

a De Hydropicis.

SED hic quidem acutus est morbus. Longus vero fieri poteſt eorum, quos aqua inter cutem male habet: niſi enim primis diebus ſuccurritur, in ὕδρωπξ, quam Græci vocant, incidunt. Ejus tres ſpecies ſunt. Nam modo, ventre vehementer intento, creber intus, ex motu ſpiritus, ſonus est: modo corpus inæquale est, tumoribus aliter aliterque per totum id orientibus: modo intus in uterum aqua contrahitur; &, moto corpore, ita movetur, ut impetus ejus conſpici poſſit. Primum, τυμπανίτην: ſecundum, λευκοφλεγματίαν, vel

a Aretæus de Diuturn. Morb. II, 1.

vel ὑπὸ τὴν σάρακα ; tertium ἀπὸ τὴν Græci nominarunt. Communis tamen omnium est humoris nimia abundantia : ob quam ne ulcera b quidem in his ægris facile sanescunt. Sæpe vero hoc malum per se incipit : 68, 7. sæpe alteri vetusto morbo , maximeque quartanæ , supervenit.

Facilius in servis , quam in liberis tollitur. quia , cum desideret famem , sitim , & mille alia tædia , longamque patientiam , promptius iis succurritur , qui facile coguntur , quam quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem , qui sub alio sunt , si ex toto sibi temperare non possunt , ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus , Chryssippi discipulus , apud Antigouum regem , amicum quendam ejus , notæ intemperantiæ , mediocriter eo morbo implicitum , negavit posse sanari. Cumque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur ; respondit , illum ad morbum ægri respicere ; se , ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo , sed etiam regis custodiretur , tamen malagmata sua devorando , bibendoque suam urinam , in exitium sese præcipitavit.

Inter initia tamen , non difficillima curatio est , si imperata sunt corpori , quies , sitis , inedia. At si malum inveteravit , non sine magna mole discutitur. † Metrodorum tamen , Epicuri discipulum , referunt , cum hoc morbo tentaretur , neque æquo animo necessarium sitim sustineret , ubi diu

L

ab-

b Aph. vi. 8. † ejus vitam describit Diogenes Laertius.

abstinuerat, solitum bibere, deinde evomere. Quod, si redditur, quicquid receptum est, multum tædio demit: si à stomacho retentum est, morbum auget. ideoque in quolibet tentandum non est.

Sed si febris quoque est, hæc in primis submovenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est, tum demum ad ea veniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. 100
Atque hic quoque, quæcumque species est, si nondum nimis occupavit, iisdem auxiliis opus est. Multum ambulandum, currendum aliquando, & superiores maxime partes sic perfricandæ, ut calorem in cutem evocet: inter quæ, spiritum ipse contineat. Evocandus est sudor, non per exercitationem tantum, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusque aliis: maximeque utiles sunt natura- 20
les, & siccæ sudationes; quales super b Batas habemus in myrtetis. Balneum, atque 93, II. omnis humor alienus est. Jejuno recte catapotia dantur, facta ex duabus apsinthii, myrrhæ tertia parte.

Cibus esse debet ex media d quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat: optimaque est, quæ urinam movet. Alvum moliri cibo melius est, quam 30
medicamento. Si tamen res coger, ex his aliquid, quæ id præstant, erit decoquendum, eaque aqua potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardum,

dum, crocum, cinnamomum, cassia, myrrha, balsamum, galbanum, ladanum, cenanthe, epanaces, cardamomum, hebenus, cupressi semen, uva taminia, quam *sapida ἀγρίαν* Græci nominant, abrotanum, rosæ folia, acorum, amaræ nuces, tragoriganum, styrax, costum, junci quadrati & rotundi flos; illum *κύπερον*, hunc *σχοῖνον* Græci vocant. quæ quoties posuero, non quæ hic nascuntur, sed, quæ inter aromata afferuntur, significabo. Primo tamen, quæ lenissima ex his sunt, id est, rosæ folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum quoque utile est austerum, sed quam tenuissimum.

Commodum est etiam, lino quotidie ventrem metiri, &, qua comprehendit alvum, notam imponere: postero quoque die videre, plenius corpus sit, an extenuetur. id enim, quod extenuatur, medicinam sentit. Neque alienum est, metiri & portionem ejus, & urinam. nam si plus humoris excernitur, quam assumitur, ita demum secundæ valetudinis spes est. Asclepiades in eo, qui ex quartana in hydro-
 5 pa deciderat, se abstinencia bidui, & fricatione usum; tertio die, jam & febre, & aqua liberato, cibum, & vinum dedisse, memoriæ prodidit. Hactenus communiter de omni specie præcipi potest: si vehementius malum est, diducenda ratio curandi est.

Ergo, si inflatio, & ex ea dolor creber est, utilis quotidianus, aut altero quoque

L 2

die

die post cibum, vomitus est. Fomentis deinde siccis calidisque utendum est. Si per hæc dolor non finitur, necessariae sunt sine ferro cucurbitulae. Si ne per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, & 5
tum his utendum. Ultimum auxilium est, si cucurbitulae nihil profuerunt, per alvum infundere copiosam aquam calidam, eamque recipere. Quin etiam quotidie ter quaterve opus est uti fricatione vehementi, 10
cum oleo & quibusdam calefacientibus. Sed in hac frictione à ventre abstinendum est. Imponendum vero in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat; ferramentisque candentibus pluribus locis venter exulce- 15
randus est, & servanda ulcera diutius. Utiliter etiam scilla cocta deligatur super cutim. Sed diu post has inflationes abstinendum est ab omnibus instantibus.

At, si id vitium est, cui λευκοφλεγμυτία 20
nomen est, eas partes, quæ tument, subjicere soli oportet; sed non nimium, ne febriculam incendat: si is vehementior est, caput velandum est, utendumque fricatione, madefactis tantum manibus aqua, cui sal 25
& nitrum & olei paulum sit adjectum; sic, ut aut puerilis aut muliebres manus adhibeantur, quo mollior earum tactus sit. Idque si vires patiuntur, ante meridiem, tota hora; post meridiem, semihora fieri 30
oportet. Utilia sunt etiam cataplasmata, quæ reprimunt; maximeque, si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque super talum, quatuor fere digitis, ex parte inferiore

teriore est ; quo per aliquot dies frequens humor feratur : atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet : concutiendumque corpus est multa gestatione , atque , ubi inductæ vulneribus cicatrices sunt , adjiciendum exercitationibus & cibus , donec corpus ad pristinum statum revertatur. Cibus valens esse debet , & glutinosus , maximeque caro. Vinum , si per stomachum licet , dulcius. sed ita , ut invicem biduo tri-
10 duove , modo aqua , modo id bibatur. Prodest etiam lactucae marinæ , quæ grandis juxta mare nascitur , semen , cum aqua potui datum. Quod si valens est , qui id
15 accipit , ei scilla cocta simul super ventrem deligatur. Authoresque multi sunt , inflatis vesicis pulsandos tumores esse.

Si vero id morbi genus est , quo in uterum multa aqua contrahitur , ambulare ,
20 sed magis modice oportet ; malagma , quod digerat , impositum habere ; idque ipsum superimposito triplici panno , fascia , non nimium tamen vehementer , astringere. quod à Tharria profectum , servatum esse
25 à pluribus video. Si jecur , aut lienem affectum esse , manifestum est , ficum pinguem contusam , adjecto melle , superponere. Si per talia auxilia venter non siccatur , sed humor nihilominus abundat , celeriori via
30 succutere , ut is per ventrem ipsum emittatur. Neque ignoro , Erasistrato displicuisse hanc curandi viam. morbum enim hunc jocineris putavit : ideoque illud esse sanandum ; frustra que aquam emitti , quæ ,

vitiato illo , subinde renascantur. Sed primum , non hujus visceris unius hoc vitium est. Nam & splene affecto , & in totius corporis malo habitu fit. Deinde , ut inde cœperit , tamen aqua nisi emittitur , quæ contra naturam ibi substitit , & jecinori , & cæteris interioribus partibus nocet. Convenitque , corpus nihilominus esse curandum. Neque enim sanat emissus humor , sed medicinæ locum facit , quam intus inclusus impedit. Ac ne illud quidem in controversiam venit , quin non omnes in hoc morbo sic curati possint ; sed juvenes robusti , qui vel ex toto carent febre , vel certe satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est , quive ex atra bile huc deciderunt , quique malum corporis habitum habent , idonei huic curationi non sunt. Cibus autem , quo die primum humor emissus est , supervacuus est , nisi si vires desunt. In sequentibus diebus , & his vinum meracius quidem , sed non ita multum dari debet , paulatimque revocandus æger est ad exercitationes , fricationes , solem , sudationes , fatigationes , & idoneos cibos , donec ex toto convalescat. Balneum rarum res amat ; & frequentiore in jejuno vomitum. Si æstas est , in mari natare commodum est. Ubi convaleuit aliquis , diu tamen alienus ei veneris usus sit.

CAP. XXII.

De Tabæ, & ejus speciebus.

DIUTIUS sæpe & periculosius tabes
 5 eos male habet, quos invasit. Atque
 hujus quoque plures † species sunt.
 Una est, qua corpus non alitur, &, natura-
 liter semper aliquibus decedentibus, nullis
 vero in eorum locum subeuntibus, summa
 10 macies oritur; &, nisi occurritur, tollit.
 * ἀργοφίαν hanc Græci nominant. Ea duabus
 fere de causis incidere consuevit. Aut enim
 nimio timore aliquis minus, aut aviditate
 nimia plus, quam debet, assumit: ita vel,
 15 quod deest, infirmit: vel, quod superat,
 corrumpitur.

Altera species est, quam Græci καχεξίαν
 appellant: ubi malus corporis habitus est;
 ideoque omnia alimenta corrumpuntur.
 20 Quod fere fit, cum longo morbo vitata
 corpora, etiamsi illo vacant, refectionem
 tamen non accipiunt: aut cum malis medi-
 camentis corpus affectum est; aut, cum diu
 necessaria defuerunt; aut, cum inusitados &
 25 inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquidve
 simile incidit. Huic, præter tabem, illud
 quoque nonnunquam accidere solet, ut per
 assiduas pustulas, aut ulcera, summa cutis
 exasperetur, vel aliquæ corporis partes in-
 30 tumescant.

Tertia est, longeque periculosissima spe-
 cies, quam Græci φθίον nominaverunt.
 Oritur fere à capite: inde in pulmonem di-
 stillat. Ex hoc exulceratio accidit, & feбри-

L 4

cula

† Erant apud veteres qui tabem & longos morbos
 inducere poterant, *Philo Judæus de specialib. leg.*
 16. pag. 792. & 1691. * *Cœl. Aurel. Morb.*
Chron. II. 14.

72, 1. cula lenis fit; quæ etiam, cum quievit, tamen repetit. In ea quoque frequens tussis est, & pus excreatur; interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem a positum est, mali odoris est. Itaque, qui de morbo dubitant, hac nota utuntur.

b Cum hæc genera tabis sint, animadvertere primum oportet, quid sit in quo laboratur. Deinde, si tantum non ali corpus apparet, causam ejus attendere; &, si cibi minus assumptum sit aliquis quam debuit, adjicere oportet: sed paulatim, ne si corpus insuetum subita multitudine oneraverit, stomachus gravetur, & concoctionem impediat. Si vero plus justo quis assumere solitus est, abstinere uno die; deinde ab exiguo cibo incipere; quotidie adjicere, donec ad justum modum perveniat. Præter hæc convenit ambulare locis quam maxime frigidis, sole vitato: per manus quoque exerceri. Si infirmior est, gestari, ungi, perfricari, si potest, maxime per seipsum, sæpius eodem die, & ante cibum, & post eum, sic ut interdum oleo quædam adjiciantur calefacientia, donec insudet. Prodestque jejuno prehendere per multas partes cutem, & attrahere, ut relaxetur; aut, imposita resina, & abducta, subinde idem facere. Utile est etiam interdum balneum, sed post cibum exiguum. Atque in ipso folio recte cibi aliquid assumitur: aut si sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi vero esse debent ex his, qui facile concoquuntur, maximeque alunt. Ergo vini quoque, sed au-

austeri, necessarius usus est, movendæ urinæ.

At si malus habitus corporis est, primum abstinendum est; deinde alvus ducenda; tum paulatim cibi dandi, adjectis exercitationibus, unctionibus, fricationibus. Uti-
 5 lius his frequens balneum est, sed jejunis; etiam usque ad sudorem. Cibus vero opus est copiosis, variis, boni succi, quique etiam minus facile corrumpantur, vino
 10 austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est; sed paulatim, quotidieque pluribus diebus, cum eo, ut cætera quoque eodem modo ferventur.

Quod si mali plus est, & vera phthisis
 15 est, inter initia protinus occurrere necessarium est: neque facile enim hic morbus, cum inveteraverit, evincitur. Opus est, si vires patiuntur, b longa navigatione, cœli mutatione sic, ut densius quam id est,
 20 ex quo discedit æger, petatur. Ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur. Fereque id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus ætate firmissima maxime oriat, id est ab anno cduodevigesimo usque ad annum quintum & trigesi-
 25 mum. Si id imbecillitas non finit, nave tamen, sed non longe, vectari commodissimum est. Sin navigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus mo-
 30 vendum est: tum à negotiis abstinendum est, omnibusque rebus, quæ sollicitare animum possunt: somno indulgendum: cavendæ distillationes, ne, si quid cura levarit, exasperent; & ob id, vitanda cru-
 L 5 ditas,

ditas , simulque & sol , & frigus : os obtegendum , fauces velandæ , tussicula suis remediis finienda : & , quamdiu quidem febricula incurfat , huic interdum abstinencia , interdum etiam tempestivis cibis 5 medendum : eoque tempore bibenda aqua. Lac d quoque , quod in capitis doloribus , & in acutis febribus , & per eas facta nimia fiti , ac , si ve præcordia tument , si ve biliosa urina est , si ve sanguis fluxit , pro veno est ; in † phthisi tamen , sicut in omnibus longis difficilibusque febriculis , recte dari potest.

Quod si febris aut nondum incurfat , aut jam remisit , decurrendum est ad modicas 15 exercitationes , maximeque ambulationes , item lenes fricationes. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer , ut allium , porrum , idque ipsum ex aceto , vel ex eodem intubus , ocimum , lactuca : 20 deinde lenis forbitio ex prusana , vel ex alica , vel ex amylo , lacte adjecto. Oryza quoque , & , si nihil aliud est , far idem præstat. Tum invicem modo his cibis , modo illis utendum est : adjiciendaque quædam 25 ex media materia , præcipue vero ex prima , cerebellum , vel pisciculus , & his similia. Farina etiam cum sevo ovillo caprinove mista , deinde incocta , pro medicamento est. Vinum assumi debet leve aut 30 sterum.

Hactenus non magna mole pugnatur. Si vehementior noxa est , ac neque febricula , neque tussis quiescit , tenuarique corpus

pus apparet , validioribus auxiliis opus est. Exulcerandus est ferro candenti , uno loco sub mento , altero in gutture , duobus ad mammam utramque ; item sub imis ossibus
5 scapularum , quas ὀμοπλάτας Græci vocant , sic , ne sanescere sinas ulcera , nisi tussis finita fuerit : cui per se quoque medendum esse , manifestum est. Tunc ter quaterque die vehementer extremæ partes
10 perfricandæ sunt : thorax leni manu pertractandus ; post cibum intermittenda hora & perfricanda crura , brachiaque. Interpositis denis diebus , demittendus ager in solium est , in quo sit aqua calida &
15 oleum. Cæteris diebus bibenda aqua : tum vinum , si tussis non est , potui frigidum dandum : si vero est , egelidum. Utile est etiam in remissionibus quotidie cibos dari : frictiones gestationesque similiter adhiberi :
20 quarto , aut quinto die sumere , interdum herbam sanguinalem ex aceto , vel plantaginem esse. Medicamentum est etiam vel plantaginis succus per se , vel e marrubii , si cum melle sit incoctus ; ita ut illius cyathus sorbeatur , hujus cochleare plenum
25 paulatim delingatur ; vel inter se mista , & incocta resinæ terebinthinæ pars dimidia , butyri & mellis pars altera. Præcipua tamen ex his omnibus sunt victus , vehiculum , & navis , & sorbitio. Alvus fecita utique vitanda est. Vomitus in hoc morbo frequens , perniciosus est , maximeque sanguinis. Qui meliusculus esse cœpit , ad-
30 jicere debet exercitationes , fricationes , cibos : 91, 34.

205, 4. bos: deinde ipse se, suppresso spiritu, perfricare; diu abstinere à vino, † balneo, venere.

CAP. XXIII.

a De Comitiali morbo.

5

INTER notissimos morbos est etiam is, qui * comitialis, vel major nominatur.

73, 20.

Homo subito concidit, ex ore spumæ moventur, deinde interposito tempore ad 10 se redit, & per seipsum consurgit. Id genus sæpius viros, quam fœminas occupat; ac solet quidem etiam longum esse, usque ad mortis diem, & vitæ non periculosum. Interdum tamen cum recens est, hominem 15 consumit; & sæpe eum, si remedia non sustulerunt, in b pueris veneris, in puellis menstruum initium tollit. Modo cum distentione membrorum aut nervorum probabitur aliquis; modo sine illa.

47, 4.

20

Quidam hos quoque iisdem, quibus lethargicos, excitare conantur: quod admodum supervacuum est: &, quia ne lethargicus quidem his sanatur; &, quia, cum possit ille nunquam expergisci atque ita fame 25 terire, hic ad se utique revertitur.

Ubi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utique † sanguis mitti debet: si accessit, non utique mittendus est, nisi alia quoque hortantur. Necessarium 30 autem est, ducere alvum, vel nigro veratro purgare, vel utrumque facere, si vires patiuntur: tunc caput tondere, oleoque & aceto perungere; cibum post diem tertium,

173,

23.

87, 19.

† Colum. 1. 6. a Aretæus de Diurnis. M. 1. 1. c. 4. * Vocatur: *lues deifica*, morbus Sacer. b Aph. II, 45. V, 7 † Valleriol. 1. 3. obs. 7.

tium, simul ac transiit hora, qua concidit,
dare. Neque sorbitiones his aut alioqui mol-
les, & faciles cibi; neque caro, minimeque
suilla convenit; sed mediæ materiæ: nam^{96.}
5 & viribus opus est, & c cruditates cavendæ
sunt. Cum quibus fugere oportet solem,
balneum, ignem, omniaque calefacientia:
item, frigus, vinum, venerem, loci præci-
pitis conspectum, omniumque terrentium,
10 vomitum, lassitudinem, sollicitudines, ne-^{87, 10.}
gotia omnia: &, ubi tertio die cibus datus
est, intermittere quartum, & invicem al-
terum quemque; eadem hora cibi servata,
donec quatuordecim dies transeant. Quos
15 ubi morbus excessit, acuti vim deposuit:
at si manet, curandus jam ut longus est.

Quod si non, quo die primum is incidit,
medicus accessit; sed is, qui cadere consue-
vit, post ei traditus est; protinus eo genere
20 victus habito, qui supra comprehensus est,
expectandus est dies, quo prolaborur; uten-
dumque tum vel sanguinis d missione, vel
ductione alvi, vel nigro veratro, sicut præ-^{172,}
ceptum est. In sequentibus deinde diebus,^{30.}
25 per eos cibos, quos proposui, vitatis omni-
bus, quæ cavenda dixi, nutriendus est.

Si per hæc morbus finitus non fuerit,
confugiendum erit ad album veratrum; ac^{87, 19.}
ter quoque aut quater eo utendum, non ita
30 multis interpositis diebus; sic tamen, ne
iterum unquam sumat, nisi conciderit.
Mediis autem diebus vires ejus erunt nu-
triendæ; quibusdam, præter ea, quæ supra
scripta sunt, adjectis. Ubi mane experre-
ctus,

ctus est , corpus ejus leniter ex oleo vetere (cum capite , excepto ventre) permulceatur : tum ambulatione quam maxime longa & recta utatur : post ambulationem loco tepido vehementer & diu , ac non minus ducenties , nisi infirmus erit . perfricetur : deinde super caput multa aqua frigida perfundatur ; paulum cibi assumat ; conquiescat ; rursus ante noctem ambulatione utatur ; iterum vehementer perfricetur , sic ut 10 neque venter , neque caput contingatur : post hæc cœnet , interpositisque tribus aut quatuor diebus , uno aut altero acria assumat.

Si ne per hæc quidem fuerit liberatus , 15 caput radatur ; ungatur oleo vetere , adjecto aceto & nitro ; perfundatur aqua salsa ; bibat jejunos ex aqua castoreum ; nulla aqua , nisi decocta , potionis causa utatur . Quidam jugulati e gladiatoris calido sanguine 20 potu tali morbo se liberarunt . Apud quos miserum auxilium tolerabile miserius malum fecit . Quod ad medicinam vero pertinet , ultimum est , juxta talem , ex utroque crure paulum sanguinis mittere : 25 occipitium incidere , & cucurbitulas admove : ferro candente in occipitio quoque & infra , qua summa vertebra cum capite committitur , adurere duobus locis , ut per ea perniciosus humor evadat . Quibus 30 si finitum malum non fuerit , prope est , ut perpetuum sit . Ad levandum id , tantummodo utendum erit exercitatione , cibisque his , qui supra comprehensi sunt : præcipue-

e Plin. xxviii, 1. Lang. Epist. 14. lib. 1. Minucius Felix. pag. 34. Vide duo exempla ejus nominis indicantia apud Tulpium *obs. l. 4. c. 4.*

Cap. 24. MEDICINA. 175
cipueque vitanda omnia, quæ ne fierent,
excepimus.

C A P. XXIV.

De Regio morbo.

5 **Æ**QUE notus est morbus, quem interdum arquaturn, † interdum regium nominant. Quem Hippocrates ait, si post septimum diem a febricitante
10 ægro supervenit, tutum esse, mollibus tantummodo præcordiis substantibus. Dioscles ex toto, si potest febrem oritur, etiam prodesse; si post hunc febris, occidere. Co- 52, 7.
lor autem cum morbum deregat, maxime
15 oculorum, in quibus, quod album esse debet, fit luteum. Soletque accedere & sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & præcordiorum dextra parte durities; &
ubi corporis vehemens motus est, spiritus
20 difficultas, membrorumque resolutio: atque, ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbescit.

Primo die abstinere ægrum oportet: secundo ducere alvum: tum, si febris est,
25 eam victus genere discutere: si non est, scamnoneam potui dare, vel cum aqua betam albam contritam, vel cum aqua mulla nuces amaras, apsinthium, anisum, sic, ut pars hujus minima sit. Asclepiades
30 aquam quoque salsam, & quidem per bidduum, purgationis causa bibere cogebat, iis, quæ urinam movent, rejectis. Quidam, superioribus omissis, per hæc, & per eos cibos, qui extenuant, idem se consequi dicunt.

Ego

† Plin. H. N. 22. c. 24. a Aph. IV, 62.

Ego utique, si satis virium est, validiora; si parum, imbecilliora auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam triduo primo modice cibum oportet assumere ex media materia, & vinum bibere Græcum falsum, 5 ut solutio ventris remaneat: tum altero triduo validiores cibos, & carnis quoque aliquid esse, intraque aquam manere: deinde ad superius genus victus reverti, cum eo, ut magis satietur; omisso Græco vino bi- 100 bere nigrum austerum; atque ita per hæc variare, ut interdum acres quoque cibos interponat, interdum ad falsum vinum redeat. Per omne vero tempus utendum est exercitatione, fricatione, &, si hiems est, 155 balneo; si æstas, frigidis natationibus: lecto etiam, & conclavi^a cultiore, usu, loco, ludis, lascivia, aliis, per quæ mens exilaretur: ob quæ regius morbus dictus videtur. Malagma quoque, quod digerat, super præ- 200 cordia datum prodest; vel arida ibi ficus imposita, si jecur aut lienis affectus est.

C A P. XXV.

b *D^e Elephantia.*

IGNOTUS autem pene in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem ἐλεφαντίασι Græci vocant; isque longis annumeratur. Quo totum corpus afficitur ita, ut ossa quoque 300 vitiari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas crebrosque tumores habet. Rubor earum paulatim in atrum colorem convertitur. Summa cutis inæquali-

a Seren. Sammon. de Regio morbo. b Mercurial. Variar. Lect. I, 2.

qualiter crassa, tenuis, dura, mollisque, quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit, os, suræ, pedes intumescunt. Ubi vetus morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur; febricula oritur, quæ facile tot malis obrutum hominem consumit.

Protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet; aut nigro veratro venter solvi. Adhibenda triduum, quantara sustinere potest, inedia est: paulum deinde vires reficiendæ & ducenda alvus: post hæc, ubi corpus levatum est, utendum est exercitatione, præcipueque cursu: sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus evocandus: frictio adhibenda: moderandumque inter hæc, ut vires conserventur: balneum rarum esse debet: cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine insantibus. Vinum, præterquam primis diebus, recte datur. Corpus contrita plantago & illita optime tueri videtur.

CAP. XXVI.

De Attonitis.

ATTONITOS quoque raro videmus, quorum & corpus & mens stupet. Fit interdum ictu fulminis, interdum morbo. hunc ἀποπληξίαν Græci appellant. His sanguis mittendus est. Veratro quoque albo, vel alvi ductione utendum. Tum adhibendæ frictiones; & ex

M

media-

media materia minime pingues cibi ; quidam etiam acres : & à vino abstinendum.

C A P. XXVII.

De Resolutione nervorum.

AT resolutio nervorum frequens ubique morbus est. Sed interdum tota corpora , interdum partes infestat. Veteres authores illud a ἀποπληξίαν ; hoc παράλυσιν nominaverunt. nunc utrumque παράλυσιν appellari video. Solent autem , qui per omnia membra vehementer resoluti sunt , celeriter rapi. ac si correpti non sunt , diutius quidem vivunt ; sed raro tamen ad sanitatem perveniunt ; & plerumque miserum spiritum trahunt , memoria quoque amissa. In partibus vero nonnunquam acutus , sæpe longus , fere b insanabilis morbus est.

† Si omnia membra vehementer resoluta sunt , sanguinis detractio vel occidit , vel liberat. Aliud curationis genus vix unquam sanitatem restituit ; sæpe mortem tantum differt ; vitam interim infestat. Post sanguinis missionem , si non redit & motus & mens , nihil spei superest : si redit , sanitas quoque prospicitur.

At , ubi pars resoluta est , pro vi & malo corporis , vel sanguis mittendus est , vel alvus ducenda. Cætera eadem in utroque casu facienda sunt. Siquidem vitare præcipue convenit frigus ; paulatimque ad exercitationes revertendum est , sic , ut ingrediatur ipse protinus , si potest. Si id crurum

a Cæl. Aurelian. Acut. Morb. III, 5. b Aretæus de Morb. Diurn. I, 7. † De præservatione Crato apud Schol. consilio 35, 36.

rum imbecillitas prohibet, vel gestetur, 91, 26.
vel motu lecti concutiat: tum id mem-
brum, quod deficit, si potest, per se; sin mi-
nus, per alium moveatur, & vi quadam ad
5 consuetudinem suam redeat. Prodest etiam
torpentis membri summam cutem exaspe-
rasse, vel urticis caesam, vel imposito sina-
pi, sic, ut ubi rubere coeperit corpus, hæc
removeantur. Scilla quoque contrita, bul-
o bique contriti cum thure recte imponun-
tur. Neque alienum est, resina cutem ter-
tio quoque die diutius vellere, pluribus
etiam locis, aliquando sine ferro, cucurbi-
tulas admove. Uctioni vero aptissimum
5 est vetus oleum, vel nitrum aceto & oleo
admixtum. Quinetiam fovere aqua calida
marina; vel, si ea non est, tamen salsa, ma-
gnopere necessarium est. Ac, si quo loco
vel naturales, vel etiam manufactæ tales
0 natationes sunt, iis potissimum utendum
est; præcipueque in his agitanda membra,
quæ maxime deficiunt. si id non est, bal-
neum tamen prodest. Cibus esse debet ex
media materia, maximeque ex venatione:
5 potio, sine vino, aquæ calidæ. Si tamen
vetus morbus est, interponi quarto vel
quinto die purgationis causa vinum Græ-
cum salsum potest. Post cœnam utilis vo-
mitus est.

2. De Doloꝛe nervoꝝum.

Interdum vero etiam nervoꝝum doloꝛ
oriri solet. In hoc casu non vomere, non
medicamentoꝝ urinam movere, non exerci-
tatione sudores, ut quidam præcipiunt, ex-

pedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est; deinde, retento spiritu, in ipsa, exercitatione potius superiores partes movendæ: balneo raro utendum: mutandum subinde peregrinationibus cœlum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo, nitro ex aqua perungenda est; deinde involvenda, & subjicienda pruna lenis, & sulphur; atque ita id suffumigandum; idque aliquandiu faciendum, sed jejuno, cum bene jam concoxerit. Cucurbitulæ quoque sæpe dolenti parti admovendæ sunt, pulsandusque leniter inflaris vesicis bubulis is locus est. Utile est etiam sebum miscere cum cumini & urticæ contritis seminibus; sic, ut omnium par modus sit, idque imponere: fovere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Utriculi quoque recte imponuntur aqua calida repleti, aut bitumen cum hordeacea farina mixtum. Atque in ipso potissimum dolore, utendum gestatione vehementi, est. quod in aliis doloribus pessimum est.

3. De Tremore nervorum.

Tremor autem nervorum æque vomitu medicamentisque urinam moventibus intenditur. Inimica etiam habet balnea, assa-que sudationes. Bibenda aqua est: acri ambulatione utendum, item unctionibus, frictionibusque, maxime per seipsum: pila, similibusque superiores partes dimovendæ: cibo quolibet utendum, dummodo concoctioni utique studeatur. Secundum cibum, curis abstinendum: rarissima venere uten-

utendum est. Si quando quis in eam prolapsus est, tum oleo leniter diuque in lectulo perfricari manibus puerilibus potius, quam virilibus, debet.

4. *De Suppurationibus internis.*

Suppurationes autem, quæ in aliqua interiori parte oriuntur, ubi ortæ fuerint, primum id agere oportet per ea cataplasinata, quæ reprimunt, ne coitus inutilis materiæ fiat. deinde, si hæc victa sunt, ut per ea malagmata, quæ digerunt, dissipetur. Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut evocetur: deinde, ut maturescat. omnis tum vomicæ finis est, ut rumpatur. Indiciumque est, pus vel alvo vel ore redditum. Sed nihil facere oportet, quominus, quicquid est puris, exeat. Utendum maxime sorbitionibus est, & aqua calida. Ubi pus ferri desit, transeundum ad faciles quidem, sed tamen validiores & frigidos cibos, frigidamque aquam sic, ut ab egelidis tamen initium fiat. primoque cum melle quædam edenda, ut nuclei pinei, vel Græcæ nuces, vel avellanæ. Postea submoven- dum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, succus assumptus vel porri vel marrubii, & omni cibo porrum ipsum adjectum. Oportebit autem uti in his partibus, quæ non afficiuntur, fricationibus, item ambulationibus lenibus. Vitandumque erit, ne vel luctando, vel currendo, vel alia ratione sanescencia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoque omni modo cavendus sanguinis vomitus est.

LIBER QUARTUS.

CAP. I.

De humani corporis interioribus sedibus.

HACTENUS reperiuntur ea genera morborum, quæ in totis corporibus ita sunt, ut iis certæ sedes assignari non possint: nunc de his dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi † curationesque in notitiam venient, si prius eorum sedes breviter ostendero.

Caput igitur, eaque, quæ in ore sunt, non lingua tantummodo palatoque terminantur, sed etiam, quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraque circa guttur venæ grandes, quæ σφαγιτιδες nominantur; itemque arteriæ (quas καρωτιδες vocant) sursum procedentes ultra aures 46, 26. feruntur. Atque in ipsis cervicibus glandulæ positæ sunt, quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt: alterum, * asperam arteriam nominant; alterum, stomachum. Arteria exterior ad pulmonem: stomachus interior ad ventriculum fertur. illa spiritum: hic cibum recipit. Quibus cum diversæ viæ sint, qua coeunt, exigua in arteria sub ipsis faucibus lingula est: quæ, cum spiramus, attollitur; cum cibum potionemque assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria, dura & cartilaginosa, in gutture assurgit,

† Soran. Ephes. Isagog. cap. xii. * i. e. Gulam. Mercurial. Var. Lect. I. c. i.

git ; cæteris partibus residit. Constat ex
 circulis quibusdam , compositis ad imagi-
 nem earum vertebrarum , quæ in spina
 sunt . ita tamen , ut ex parte exteriori
 aspera ; ex interiori , stomachi modo læ-
 vis sit. eaque descendens ad præcordia
 cum pulmone committitur. Is spongio-
 sus , ideoque spiritus capax , & à tergo
 spinæ ipsi junctus , in duas* fibras , ungulæ
 bubulæ modo , dividitur. Huic cor an-
 nexum est , natura musculosum , in pectore
 sub sinisteriore mamma situm ; duosque
 quasi ventriculos habet. At sub corde at-
 que pulmone , transversum ex valida mem-
 brana septum est , quod à præcordiis ute-
 rum diducit , æque nervosum ; multis etiam
 venis per id discurrentibus ; à superiore
 parte , non solum intestina , sed jecur quo-
 que lienemque discernit. Hæc viscera pro-
 xime , sed infra tamen posita , dextra si-
 nistraque sunt. Iecur à dextra parte sub
 præcordiis ab ipso septo orsum , intrin-
 secus cavum , extrinsecus gibberum est.
 quod prominens leviter ventriculo infi-
 det , & in quatuor fibras dividitur. Ex in-
 feriore vero parte ei fel inhæret. At lien in
 sinistra , non eidem septo , sed intestino
 annexus est , natura mollis & rarus , lon-
 gitudinis crassitudinisque modicæ ; isque
 paulum à costarum regione in uterum ex-
 cedens , ex maxima parte sub his condi-
 tur. atque hæc quidem juncta sunt. Renes
 vero divisi : qui lumbis sub imis coxis in-
 hærent , à parte earum resimi , ab altera ro-
 tundi ;

* Hippocr. Coac. Sent. 300. Van der Linden
 Med. Physiol. c. IV. p. 232. a Hippocrat. de Cor.
 de T. IV.

rundi ; qui & venosi sunt , & tunicis super
 conteguntur. Ac viscerum quidem hæ se-
 des sunt. Stomachus vero , qui intestino-
 rum principium est , nervosus à septima
 spinæ vertebra incipit , ac circa præcordia
 cum ventriculo committitur. Ventriculus
 autem , qui receptaculum cibi est , constat
 ex duobus tergoribus. isque inter lienem
 & jecur positus est ; utroque ex his paulum
 super eum ingrediente. Suntque etiam
 membranulæ tenues , per quas inter se
 tria ista connectuntur , jungunturque ei
 septo , quod transversum esse , supra posui.
 Inde ima ventriculi pars paulum in dex-
 teriorem partem conversa , in summum in-
 testinum coarctatur. Hanc juncturam *πυ-
 λωρον* Græci vocant , quoniam portæ mo-
 do in inferiores partes ea , quæ excreturi
 sumus , emittit. Ab ea jejunum intestinum
 incipit , non ita implicitum. cui tale voca-
 bulum est , quia nunquam , quod accepit ,
 continet ; sed protinus in inferiores partes
 transmittit. Inde tenuius intestinum est ,
 in sinus vehementer implicitum : orbes
 vero ejus per membranulas singuli cum
 interioribus connectuntur ; qui in dexte-
 riorum partem conversi , & è regione dex-
 terioris coxæ finiti , superiores tamen par-
 tes magis complent. Deinde id intestinum
 cum crassiore altero transverso committi-
 tur ; quod à dextra parte incipiens , in si-
 nisteriorem pervium & longum est , in dex-
 teriorem non est ; ideoque cæcum nomina-
 tur. At id , quod pervium est , late fusum at-
 que

183,
19.

100

11

200

255

300

que sinuatum , minusque quam superiora
 intestina nervosum , ab utraque parte huc
 atque illuc volutum , magis tamen siniste-
 riores inferioresque partes tenens , contin-
 5 git jecur atque ventriculum : deinde cum
 quibusdam membranulis à sinistro rene
 venientibus jungitur ; atque hinc ad dex-
 tra recurvatum in ima dirigitur , qua ex-
 cernit ; ideoque id ibi rectum intestinum
 10 nominatur. Contegit vero universa hæc
 omentum , ex inferiore parte læve & ad-
 strictum , ex superiore mollius. Cui adeps
 quoque innascitur ; quæ sensu , sicut cere-
 brum quoque & medulla , caret. At à re-
 15 nibus singulæ venæ , colore albæ , ad vesi-
 cam feruntur ; *ὑδρῆνες* Græci vocant, quod
 per eas inde descendentem urinam in ve-
 sicam distillare concipiunt. Vesica autem
 in ipso sinu nervosa & duplex , cervice ple-
 20 na atque carnosa , jungitur per venas cum
 intestino , eoque osse , quod pubi subest :
 ipsa soluta atque liberior est ; aliter in viris
 atque in fœminis posita. Nam in viris jux-
 ta rectum intestinum est , potius in fini-
 25 stram partem inclinata : in fœminis super
 genitale earum posita est , & , superne lapsa,
 ab ipsa vulva sustinetur. Tum in masculis
 iter urinæ spatiosius & compressius à cer-
 vice hujus descendit ad colem : in fœmi-
 30 nis brevius & plenius , super vulvæ cervi- 474,
 cem se ostendit. Vulva autem in virginibus 20
 quidem admodum exigua est : in mulieri- 48, 22.
 bus vero , nisi ubi gravidæ sunt , non multo
 major , quam ut manu comprehendatur.

Ea , recta tenuataque cervice , quam canalem vocant , contra mediam alvum orsa , inde paulum ad dexteriores coxas convertitur ; deinde super rectum intestinum progressa , iliis foeminae latera sua innectit. 5
 Ipsa autem ilia inter coxas & pubem imo ventre posita sunt. A quibus ac pube abdomen sursum versus ad praecordia pervenit ; ab exteriori parte , evidenti cute ; ab interiori levi membrana inclusum ; quæ 10
 omento jungitur ; περιτόναιος autem à Græcis nominatur.

C A P. II.

De curationibus morborum , qui nascuntur à capite.

15

His veluti in conspectum quendam , quatenus scire curanti necessarium est , adductis , remedia singularum laborantium partium exequar , orsus à ca- 20
 pite : sub quo nomine nunc significo eam partem , quæ capillitio tegitur : nam oculorum , aurium , dentium dolor , & si quis similis est , alias erit explicandus.

2. De Capitis dolore.

25

In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est , quam κεφαλαίαν Græci vocant. Cujus notæ sunt , † horror validus , nervorum resolutio , oculorum caligo , mentis alienatio , vomitus , sic ut vox sup- 30
 primatur ; vel sanguinis ex naribus cursus , sic ut corpus frigescat , anima deficiat. Præter hæc , dolor intolerabilis , maxime circa tempora , vel occipitium. Interdum autem
 in

† Soran. Ephes. I. Isag. c. 6.

in capite longa imbecillitas, sed neque
 gravis, neque periculosa, per hominis æta-
 tem est. Interdum gravior dolor, sed bre-
 vis, neque tamen mortiferus; qui vel vino,
 5 vel cruditate, vel frigore, vel igne, aut
 sole contrahitur. Hique omnes dolores
 modo in febre, modo sine hac sunt; modo
 in toto capite, modo in parte; interdum
 sic, ut oris quoque proximam partem ex-
 10 crucient. Præter hæc etiam invenitur ge-
 nus, quod potest longum esse: ubi humor
 cutem inflat, eaque intumescit, & præmen-
 ti digito cedit: ὄδρακέφαλον Græci appel-
 lant.

15 Ex his id, quod secundo loco positum
 est, dum leve est, qua sit ratione curan-
 dum, dixi a, cum persequerere ea, quæ sani
 homines in imbecillitate parvis alicujus fa-
 cere deberent. Quæ vero auxilia sint capi-
 20 tis, ubi cum febre dolor est, eo loco expli-
 citum est, quo febrium curatio exposita 17, 8.
 est. nunc de cæteris dicendum est. 188,

Ex quibus id, quod acutum est, & id, 23.
 quod supra consuetudinem intenditur, id-
 25 que, quod ex subita causa, etsi non pesti-
 ferum, tamen vehemens est, primam cu-
 rationem habet, qua sanguis mittatur. Sed
 id, nisi intolerabilis est dolor, superva-
 cuum est. Satiusque est, abstinere à cibo;
 30 si fieri potest, etiam à potione: si non po-
 test, aquam bibere. Si postero die dolor
 remanet, alvum ducere, sternutamenta
 evocare, nihil assumere, nisi aquam. Sæpe
 enim dies unus aut alter totum dolorem
 hac

hac ratione discutit, utique, si ex vino vel cruditate origo est.

Si vero in his auxilii parum est, tondere oportet ad cutem: deinde considerandum est, quæ causa dolorem excitarit. Si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit; spongiam concavam imponere, subinde aqua frigida expressam; ungere rosa & aceto, vel potius his tinctam lanam succidam imponere, aliave refrigerantia cataplasmata. At si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida marina, vel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit; tum caput vehementer perfricare; deinde calido oleo implere & veste velare. quidam etiam id devinciunt: alii cervicalibus vestimentisque onerant, & sic levantur: alios calida cataplasmata adjuvant. Ergo etiam, ubi causa incognita est, videre oportet, refrigerantia magis, an calefacientia leniant, & his uti, quæ experimentum approbarit.

At si parum causa discernitur, perfundere caput, primum aqua calida, sicut supra præceptum est, vel salsa, vel ex lauro decocta, tum frigida posca. Illa in omni vetusto capitis dolore communia sunt: sternutamenta excitare, inferiores partes vehementer perfricare, gargarizare † his, quæ salivam movent, cucurbitulas temporibus & occipitio admoveere, sanguinem ex naribus detrahete, resina subinde tempora pervellere, & imposito sinapi exulcerare ea, quæ male habent, ante linteolo subjecto,

ne

† Soran. Ephes. Isag, c. 6.

ne vehementer erodat , candentibus ferra-
mentis , ubi dolor est , ulcera excitare , ci-
bum semper modicum cum aqua sumere :
ubi levatus est dolor , in balneum ire , ibi
5 multa aqua prius calida , deinde frigida 35, 5-
caput perfundi. Si discussus ex toto dolor
est , etiam ad vinum reverti ; sed postea
semper , antequam quicquam aliud , aquam
bibere.

10 Dissimile est id genus , quod humorem
in caput contrahit. In hoc tonderi ad cu-
tem necessarium est : deinde imponere si-
napi , sic ut exulceret : si id parum profuit ,
scalpello utendum est. Illa cum hydropicis 160.
15 communia sunt , ut exerceatur , insudet ,
vehementer perfricetur , cibis potionibus-
que utatur urinam præcipue moventibus.

2.

20 *De morbo , qui circa faciem nascitur.*

CIRCA faciem vero morbus innascitur ,
quem Græci a κυνικὸν πικρὸν nomi-
nant. Is cum acuta febre oritur. Os
cum rictu quodam pervertitur , ideoque
25 nihil aliud est , quam distortio oris. Acce-
dit crebra coloris in facie totoque corpore
mutatio : somnus in promptu est.

In hoc sanguinem mittere optimum
est. Si finitum eo malum non est , ducere
30 alvum. Si ne sic quidem discussum est , al-
bo veratro vomitum movere. Præter hæc
necessarium est vitare solem , lassitudinem ,
vinum. Sed si discussum his non est , uten-
dum est cursu , & fricatione in eo , quod læ-
sum

sum est, leni & multa; in reliquis partibus brevior, sed vehementi. Prodest etiam movere sternutamenta, caput radere, idque perfundere aqua calida, vel marina, vel certe falsa, sic ut ei quoque sulphur adjiciatur: post perfusionem iterum perfricari, sinapi manducare; eodemque tempore affectis oris partibus ceratum, integris item sinapi, donec erodat, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

10

3.

De Resolutione linguæ.

AT si lingua resoluta est, quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit, sic ut sermo hominis non explicetur; oportet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum, vel hyssopum, vel nepeta decocta sit; aquam bibere; caput, & os, & ea, quæ sub mento sunt, & cervicem vehementer perfricare; lasere linguam ipsam linere; manducare, quæ sunt acerrima, id est sinapi, allium, cepam; magna vi luctari, ut verba exprimantur; exerceri retento spiritu, caput sæpe aqua frigida perfundere, nonnunquam multam esse radiculam, deinde vomere.

4.

a De Distillatione ac gravedine.

30

DIstillat autem humor de capite interdum in nares, quod lenius est; interdum in fauces, quod peius est; interdum etiam in pulmonem, quod pessimum

a Coel. Aurelian. Morbor. Chronic. II, 7.

5 mum est. Si in nares distillaverit, tenuis per has pituita profluit, caput leniter dolet, gravitas in eo sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, has exasperat, tussiculam movet. Si in pulmonem, præter sternutamenta & tussim, est etiam capitis gravitas, lassitudo, sitis, æstus, biliosa

10 Aliud autem (quamvis non multum distans) malum, gravedo est. Hæc nares claudit, vocem obtundit, tussim siccam movet. Sub eadem vero salsa est saliva, sonant aures, venæ moventur in capite, turbida urina est. Hæc omnia *κορυζα* Hippocrates no-
15 minat. Nunc video apud Græcos in gravedine hoc nomen servari: distillationes, *κατασχυμς* appellari. Hæc communia & brevia; sed si neglecta sunt, longa esse consuerunt. Nihil pestiferum est, nisi quod
20 pulmonem exulcerat.

Ubi aliquid ejusmodi sentimus, protinus abstinere à sole, à balneo, à venere debemus. Inter quæ unctione, & assueto cibo nihilominus uti licet. Ambu-
25 latione tantum non acri, sed recta utendum est, & post eam caput atque os supra quinquagies perfricandum. Raroque fit, ut si biduo, vel certe triduo nobis temperavimus, id vitium non levetur. Quo levato,
30 si in distillatione crassa facta pituita est, vel in gravedine, nares magis pallent, balneo utendum est, multaue aqua prius calida, post egelida, fovendum os, caputque; deinde cum cibo pleniore vinum bibendum.

dum. At, si æque tenuis die quarto pituita est, vel nares æque clausæ videntur, assumendum est vinum aminæum, austerum; deinde rursus biduo aqua, post quæ ad balneum, & ad consuetudinem reverrendum est.

Neque tamen ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tamquam ægros agere: sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt, præterquam si diutius aliquem, & vehementius ista sollicitare consuerunt. huic enim quædam curiosior observatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces distillavit, præter ea, quæ supra retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est, perfricandæ vehementer inferiores partes, levior fricatio adhibenda thoraci erit, levior capiti, demenda assueti cibo pars dimidia, sumenda ova, amyllum, similiaque, quæ pituitam faciunt crassiores, siti, quanta maxima sustineri potest, pugnandum est. Ubi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoque usus est, adji-ciendus est cibo pisciculus, aut caro; fictamen, ne protinus justus modus cibi sumatur: vino meraco copiosius utendum est.

At, si in pulmonem quoque destillat, multo magis & ambulatione & frictione opus est, eademque adhibita ratione in cibis. Si non satis illi proficiunt, acrioribus utendum est, magis somno indulgendum est, abstinendumque à negotiis omnibus, aliquando, sed serius, balneum tentandum.

In

In gravedine autem, primo die quiescere, neque esse, neque bibere, caput velare, fauces lana circumdare : postero die surgere, diu abstinere à potione, aut, si res coegerit, 5 non ultra heminam aquæ assumere : tertio die panis non ita multum ex parte interiore cum pisciculo, vel levi carne sumere, aquam bibere : si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniore victu utatur, 10 vomere : ubi in balneum ventum est, multa aqua calida caput & os fovere usque ad sudorem, tum ad vinum redire. Post quæ vix fieri potest, ut idem incommodum maneat. sed, si manserit utendum erit cibis 15 frigidis, aridis, levibus, humore quam minimo, servatis frictionibus exercitationibusque, quæ in omni tali genere valetudinis necessariae sunt.

25 C A P. III.

De Cervicis morbis.^a

A C A P I T E transitus ad cervicem est, quæ gravibus admodum morbis obnoxia est. Neque tamen alius importunior b acutiorque morbus est, quam is, 25 qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis, modo mentum pectori adnectit, modo rectam & immobilem cervicem intendit. Primum Græci c ὀπισθότρονον, sequentem ἐμπροσθότρονον, ultimum τέτανον d appellant : quamvis minus subtiliter quidam in discretis his nominibus utuntur. Ea sæpe intra quartum e diem tollunt : si hunc evaserunt, sine periculo sunt.

N

Eadem

^a Galen. Introd. in Med. c. 13. b Aretæus de Morb. Acut. 1, 6. c Cæl. Aurelian. Morb. Acut. 111, 6. d Suid. in ead. voce. e Aphor. v, 6.

78, 34. Eadem omnia ratione curantur; idque
convenit. Asclepiades utique f mittendum
sanguinem credidit. Id quidam utique vi-
tandum esse dixerunt, eo quod maxime
tum corpus calore egeret; isque esset in
sanguine venarum. Hoc quidem falsum est.
neque enim natura sanguinis est, ut utique
calet; sed ex his, quæ in homine sunt, is
celerrime vel calescit, vel refrigescit. Mit-
ti vero nec ne debeat, ex his intelligi po-
78, 79. test, quæ de sanguinis missione præcepta
sunt. Utique autem recte datur † castoreum,
& cum hoc piper, vel laser. Deinde opus
est fomento humido & calido. Itaque ple-
rique aqua calida multa cervices subinde
perfundunt. id in præsentia allevat; sed
opportuniore nervos frigori reddit. quod
utique vitandum est.

Utilius igitur est, cerato liquido pri-
mum cervicem perungere; deinde admo-
vere vesicas bubulas vel utriculos g oleo
calido repletos, vel ex farina calidum ca-
taplasma, vel piper cum ficu contusum.
Utilissimum tamen est, humido sale ‡ fovere.
95, 16. quod quomodo fieri debeat, jam ostendi.
Ubi eorum aliquid factum est, admove-
re ad ignem, vel si æstas est, in sole ægrum oportet;
maximeque oleo vetere; si id non est h Sy-
riaco; si ne id quidem est, adipe * quam ve-
tustissima, cervicem, & scapulas, & spinam
perfricare.

Fricatio cum omnibus vertebrais homi-
num utilis sit, tum iis præcipue, quæ in
col-

f Cæl. Aurelian. Acut. Morb. III, 8. † Marcell. de
Medic. c. XVIII. p. 320. g Cæl. Aurel. Acut. Morb.
III, 8. ‡ Marcell. de Med. c. XVIII. p. 320. h Plin.
N. H. XV, 7. * Marcell. de Med. c. XVIII. p. 320.

collo sunt. Ergo die nocteque, interpositis
tamen quibusdam temporibus, hoc reme-
dio utendum est: dum intermittitur, im-
ponendum † malagma aliquod ex calefacien-
5 tibus. Cavendum vero & præcipue frigus.
ideoque in eo conclavi, quo curatur æger,
ignis continuus esse debet, maximeque
tempore antelucano, quo præcipue frigus
intenditur. Neque inutile erit, caput at-
10 tonsum habere, idque irino vel cyprino
calido madefacere, & superimposito pileo
velare: nonnunquam etiam in calidum
oleum totum descendere, vel in aquam ca-
lidam, in qua fœnum græcum decoctum
15 sit, & adjecta olei pars tertia. Alvus i quo-
que ducta sæpe superiores partes resolvit.
Si vero etiam vehementius dolor crevit,
admovendæ cervicibus cucurbitulæ sunt,
sic ut cutis incidatur. Eadem aut ferramen-
20 tis aut sinapi adurenda. Ubi levatus est do-
lor, moverique cervix cœpit, scire licet,
cedere remediis morbum. Sed diu vitan-
dus cibus, k quisquis mandendus est. Sor-
bitionibus utendum, itemque ovis forbi-
25 libus, aut è pullis mollibusve jus aliquod
assumendum. Id si bene processerit, jam-
que ex toto recte se habere cervices vide-
buntur, incipiendum erit à pulticula, vel
intrita bene madida. Celerius tamen etiam
30 panis mandendus, quam vinum gusan-
dum: siquidem hujus usus præcipue peri-
culosus; ideoque in longius tempus diste-
rendus est.

† Marcellus de Med: c. XVIII. p. 320.

i Aph. VII, 5. k Cælius Aurelianus, Morb. Acut. III,

CAP. IV.

^a De Faucium morbis: & primum de Angina.

UT hoc autem morbi genus circa totam cervicem; sic alterum, æque pestiferum acutumque, in faucibus esse confuevit. Nostri anginam vocant: apud Græcos nomen, prout species est. Interdum enim neque rubor, neque tumor ullus apparet; sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra solvuntur. id ¹⁰
^b συνάγχην vocant. Interdum lingua faucesque cum rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultusque est, ὡς συνάγχη vocatur. Illis communia sunt; æger non cibum devorare, ¹⁵
 non potionem potest; spiritus ejus intercluditur. Levius est, ubi † tumor tantummodo & rubor est, cætera non sequuntur. id παρασυνάγχην appellant.

Quicquid est, si vires patiuntur, ‡ sanguis ²⁰
 mittendus est, etsi non abundat: secundum est, ducere alvum. Cucurbitula quoque recte sub mento, & circa fauces admove-
 tur; ut id, quod strangulat, evocet. Opus est deinde fomentis humidis. nam sicca ²⁵
 spiritum elidunt. Ergo admoveere spon-
 gias oportet: quæ melius in calidum oleum, quam in calidam aquam subinde dimittuntur. Efficacissimumque est hic quo-
 que, salem calidis cum faccellis superpone- ³⁰
 re. Tum commodum est, hyssopum, vel nepetam, vel thymum, vel apīnathium, vel etiam furfures, aut ficus aridas, cum mul-
 sa

^a Aræteus de Morb. Acut. I, 7. ^b Cæl. Aurelian. Morb. Acut. III, c. 1, 2, 3, 4. Æginet. III, 27. D. Hieronym. in Job. cap. VII. † Aphorism. VI, 37.

‡ Marcell. de Med. c. XV. p. 303.

sa decoquere, eaque gargarizare: post hæc palatum ungere vel felle taurino, vel eo medicamento, quod ex moris est. Polline etiam piperis recte respergitur.

- 5 Si per hæc parum proficitur, ultimum est, incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, & in palato circa uvam, vel eas venas, quæ sub † lingua sunt; ut per ea vulnera morbus erumpat. Quibus si
10 non fuerit æger adjutus, scire licet, à malo victum esse. Si vero his morbus levatus est, jamque fauces cibum & potum capiunt, facilis ad bonam valetudinem recursus est. Atque interdum natura c quoque adjuvat, si
15 ex angustiore sede vitium transit in latiorrem. Itaque rubore & tumore in præcordiis orto, scire licet fauces liberari.

- Quicquid autem eas levarit, incipiendum est ab humidis, maximeque aqua mulsa:
20 deinde assumendi molles & non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum habitum revertantur. Vulgo audio ‡, si quis d pullum hirundinum ederit, angina toto anno non periclitari. Servatumque eum
25 ex e fale, cum is morbus urget, comburi, carbonemque ejus contritum in aquam mulsam, quæ potui detur, infriari, & prodesse. Id cum idoneos authores ex populo habeat, neque habere quicquam periculi possit, quam-
30 vis in monumentis medicorum non legerim, tamen inferendum huic operi meo credidi.

† Marcell. de Med c. XV, p. 305. c Aph. VI, 37.

‡ Plin. Histor. N. X. c. 33. d Plin. H. N. XXX, 4.

• Plinius H. N. XXX, 4.

2. De Difficultate spirandi.

EST etiam circa fauces malum, quod apud Græcos aliud aliudque nomen habet, prout se intendit. Omne in difficultate spirandi consistit: sed hæc dum modica est, neque ex toto strangulat, f *δυσπνοια* appellatur: cum vehementior est, ut spirare æger sine sono & anhelatione non possit, † *ἀσπμα*: cum accessit id quoque, ne nisi recta cervice ‡ spiritus trahatur, *ὀρθόπνοια*. Ex quibus id, quod primum est, potest diu aliquem trahere: duo insequentia acuta esse consuerunt. His communia sunt; quod propter angustias, per quas spiritus evadit, g sibilum elidit; dolor in pectore præcordiisque est, interdum etiam in scapulis, isque modo decedit, modo revertitur; adhæc tussicula accedit.

Auxilium vero est, nisi aliquid prohibet, in sanguinis detractiōe. Neque id satis est, sed lac caprinum calidum jejuno dandum; &, si non febrit, venter solvendus est. Liquanda alvus, interdum etiam duccenda, quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem etiam in lecto sublime habendum est: thorax fomentis, cataplasmatisque calidis, aut ficcis, aut etiam humidis adjuvandus est; & postea malagma superimponendum, vel ceratum ex cyprino, vel irino unguento. Sumenda deinde jejuno in potum mulsa, vel aqua, cum qua vel hyssopus cocta, vel

con-
f Cæl. Aurelian. Tard. Passiō. III, 1. *Æginet.* III, 29. † Hieronym. in Job. cap. IX. ‡ *Sublimis spiritus* dicitur Horatio. Vide Not. Dan. Heins. ad Horat. l. 15. v. 31. g Trallian. I, 2.

contrita capparis radix fit. Deligitur etiam
 utiliter, aut nitrum, aut ^h nasturtium, allium-
 ve frictum, deinde contritum & cum melle
 mixtum: simulque coquuntur mel, galba-
 5 num, resina, terebinthina: ubi autem coie- 275, 33:
 runt, ex his, quod fabæ magnitudinem ha-
 bet, quotidie sub lingua liquatur: aut sul-
 phuris ignem non experti ^p*. & quadrans,
 abrotani ^p*, in vini cyatho teruntur, idque
 10 tepesfactum sorbetur. Est etiam non vana
 opinio, vulpinum jecur ⁱ, ubi siccum & ari-
 dum factum est, contundi oportere, polli-
 nemque ex eo potioni aspergi; vel ejusdem
 pulmonem quam recentissimum assum, sed si-
 15 ne ferro coctum, edendum esse. Præter hæc,
 sorbitionibus & lenibus cibis utendum est: in-
 terdum vino tenui austero: nonnunquam vo-
 mitu. Profunt etiam, quæcumque urinam
 movent: sed nihil magis, quam ambulatio
 20 lenta pene usque ad lassitudinem; fricatio
 multa, præcipue inferiorum partium, vel
 in sole, vel ad ignem, & per seipsum, &
 per alios, usque ad sudorem.

3. De Faucium exulceratione

25 In interiore vero faucium parte inter-
 dum exulceratio esse consuevit. In hac
 plerique extrinsecus cataplasmatibus calidis,
 fomentisque humidis utuntur. Volunt
 30 etiam vaporem calidum ore recipi, per
 quem molliores alii partes eas fieri dicunt,
 opportunioreque vitio jam hærenti. Sed, si
 bene sic vitari morbus potest, tuta illa
 prælidia: si metus ejus est, supervacua sunt.

N 4

Uti-

^h Cæl. Aurelian. Tard. Pass. III, 1. i Scribon. Larg.
 c. 19. Comp. 76. Plin. H. N. XXVIII, 13.

Utique autem perfricare fauces periculosum est. exulcerat enim. Neque utilia sunt, quæ urinæ movendæ sunt apta : quia possunt, dum transeunt, ibi quoque pituitam extenuare; quam suppressi melius est.

Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoque secuti sumus, author bonus, acetum ait quam acerrimum esse sorbendum. hoc enim sine ulla noxa comprimere ulcera. Sed id suppressere sanguinem potest, ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei licium est; quod idem quoque æque probat: vel porri, vel marrubii succus, vel nuces Græcæ k cum tragacantho contritæ & cum passo mixtæ, vel lini semen contritum & cum dulci vino mixtum. Exercitatio quoque ambulandi currendique necessaria est. Fricatio à pectore vehemens toti inferiori parti adhibenda.

Cibi vero esse debent, neque nimium acres, neque asperi; mel, lenticula, tragus, lac, ptisana, pinguis caro, præcipueque porrum, & quicquid cum hoc mixtum est. Potioris quam minimum esse convenit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua malum cotoneum, palmulæve decoctæ sunt. Gargarizationes quoque lenes: si hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt.

Hoc genus neque acutum est, & potest esse non longum: curationem tamen maturam, ne vehementer & diu lædat, desiderat.

4. De Tussi.

Tussis vero fere propter faucium exulcerationem

k *Amygdala*. Vide Rhodii Lexicon Scribonianum. Macrobius Saturn. II, 14.

cerationem molesta est : quæ multis ¹ modis contrahitur. Itaque, illis restitutis, ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque male habere : & vix, cum vetus facta est, eliditur. ac modo arida est, modo pituitam facit vel citat.

Oportet autem hyssopum altero quoque die bibere : spiritu retento currere, sed minime in pulvere : ac lectione uti vehementi ; quæ primo impeditur à tussi, post eam vincit : tum ambulare : deinde per manus quoque exerceri, & pectus diu perfricare. Post hæc quam pinguiissimæ ficus uncias tres, super prunam incoctas, esse.

Præter hæc, si humida est, prosunt fricationes validæ, cum quibusdam calefacientibus, sic, ut caput quoque simul vehementer perfricetur : item cucurbitulæ pectori admotæ, sinapi ex parte exteriori faucibus impositum, donec leviter exulceret ; potio ex menta, nucibusque Græcis & amylo ; primoque assumptus panis aridus, deinde aliquis cibus lenis.

At, si sicca tussis est, cum ea vehementissime urget, adjuvat vini austeri cyathus assumptus ; dum ne amplius id, interposito tempore aliquo, quam ter aut quater fiat : item laseris quam optimi paululum devorare opus est ; porri vel marrubii succum assumere ; scillam delingere ; acetum ex ea, vel certe acre sorbere, aut cum spica allii contriti duos vini cyathos.

Utilis etiam in omni tussi est peregrinatio, navigatio longa, loca maritima, nata-

N 5

tiones.

tiones. Cibus interdum mollis, ut malva, ut urtica : interdum acer, ut lac cum allio coctum. Sorbitiones, quibus laser sit adjectum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit. Ovum quoque forbile, sulphure adjecto, forbeatur. In potum vero primum aqua calida, deinde invicem aliis diebus hæc, aliis vero vinum.

m 5. De Sanguinis sputo.

Magis terreri potest aliquis, cum sanguinem expuit. sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit enim modo ex gingivis, modo ex ore. & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere, sine gingivarum ullo vitio; ita ut nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atque interdum sanguis profluit, interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnumquam autem is à summis faucibus fertur, modo exulcerata ea parte, modo non exulcerata; sed aut ore venæ alicujus adaperto, aut tuberculis quibusdam natis, ex hisque sanguine erumpente. Quod ubi incidit, neque lædit potio aut cibus, neque quicquam, ut ex ulcere, excreatur. Aliquando vero, gutture & arteriis exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque extundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut jocinore feratur. Sæpe foemine, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc expuunt. Authoresque medici ferunt, vel exesa parte aliqua sanguinem exire,

m Aretæus de Morb. Acutis II, 2. Cæl. Aurelian. Morb. Chronic. Lib. II. c. 9.

exire, n vel rupta, vel ore alicujus venæ patefacto. Primam διαβρωσιν, secundam πημοχαρμόν, tertiam ἀνατόμασιν appellant. Ultima minime nocet; prima gravissime. Ac
 5 sæpe quidem evenit, uti sanguinem opus sequatur.

Interdum autem, qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad valetudinem profuit. Sed si secuta ulcera sunt, si pus, si tussis est,
 10 prout sedes ipsa est, ita varia & periculosa genera morborum fiunt. Si vero sanguis tantum fluit, expeditius & remedium & finis est. Neque ignorari oportet, eis, quibus fluere p sanguis solet, aut quibus spina
 15 dolet, coxæve, aut post cursum vehementem vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocri profluvium : idque per urinam redditum ipsam quoque lassitudinem solvere. Ac ne
 20 in eo quidem terribile esse, qui ex superiore 79,39. loco decidit : si tamen in ejus urina nihil aliud + novabit. Neque vomitum hujus afferre periculum, etiam cum repetit, si ante confirmare & implere corpus licuit : &
 25 ex toto nullum nocere, qui in corpore robusto, neque nimius est, neque tussim aut calorem movet. Hæc pertinent ad universum. nunc ad ea loca, quæ proposui, veniam.

30 Si ex gingivis exit, portulacam manducasse satis est. Si ex ore, continuissè eorum vinum : si id parum proficit, acetum. Si inter hæc quoque graviter erumpit, quia consumere hominem potest, commodi-

n Cæl. Aurelian. Tard. Pass. II, 9, 10. Aretæus Morb. Acutor. Curat. II, 2. Trallian. VII, 1. o Aph. VII, 78. p Aph. VII, 37. + Notabit.

diffimum est, impetum ejus, admota † occipitio cucurbitula, sic ut cutis quoque incidatur, avertere. Si id mulieri, cui menstrua non feruntur, evenit, eandem cucurbitulam, incisus inguinibus ejus, ad-
5
movere.

72, 32. At, si ex faucibus interioribusve partibus processit, & metus major est, & cura major adhibenda. Sanguis mittendus est; &, si nihilominus ex ore processit, iterum 100 tertioque, & quotidie paulum aliquid: protinus autem debet sorbere vel acetum, vel etiam cum thure plantaginis aut porri succo; imponendaque extrinsecus supra id, 290, 21. quod dolet, lana succida ex aceto est, & id 295, 21. spongia subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoque & femora brachiaque pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo non prodesse, ut etiam inimicum esset, proposuit. Sed id sæpe com- 200 mode respondere experimenta testantur.

Neque tamen pluribus locis deligari necesse est: sed sat est infra inguina, & super talos, summosque humeros, etiam brachia. Tum, si febris urget, danda est sorbitio; & 25 potui aqua, in qua aliquid ex his, quæ alvum adstringunt, decoctum sit. At, si abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua frigida, & molle quoque ovum dari potest potui, vel idem, quod supra scriptum est, 30 vel vinum dulce, vel aqua frigida. sed sic bibendum erit, ut sciamus, huic morbo sitim prodesse.

Præter hæc necessaria sunt quies, securitas,

ritas, silentium. Caput hujus quoque cubantis sublime esse debet; recteque tondetur. Facies sæpe aqua frigida fovenda est. At inimica sunt vinum, balneum, venus, 172, 2.
 5 in cibo oleum, acriora q̄ omnia, item calida fomenta, conclave calidum & inclusum, multa vestimenta corpori injecta, etiam fricationes, nisi ubi bene sanguis conquievit. Tum vero incipiendum est à brachiis, 10 cruribusque; à thorace abstinendum. In hoc casu per hiemem, locis maritimis; per ætatem, mediterraneis opus est.

C A P. V.

De Stomachi morbis.

15 **F**AUCIBUS subest stomachus; in quo plura a longa vitia incidere consuerunt. Nam modo ingens calor, modo inflatio hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit. Interdum pituita, interdum 20 bilis adoritur. Frequentissimumque est ejus malum, quo resolvitur: neque uila re magis aut afficitur, aut corpus afficit.

Ut diversa autem vitia ejus, sic etiam re- 25 media sunt. Ubi exæstuat, aceto cum rosâ extrinsecus subinde fovendus est; imponendusque pulvis cum oleo; & ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & molliunt. Potui, nisi quod obstat, gelida aqua 30 præstanda.

Si inflatio est, profunt admotæ † cucurbitulæ; neque incidere cutem necesse est: profunt sicca & calida fomenta, sed non vehementissima. Interponenda abstinencia est.

q Cæl. Aurelian. Acut. Morb. II, 24. a Cæl. Aurelian. Tard. Pass. III, 2. Trallian. VII, 3. † sub scapulis, uti duobus exemplis confirmat Aloisius Mundella Epi st. 7. pag. 125. & seqq.

est. Utilis in jejuno potio est apsinthii, aut hyssopi, aut rutæ. Exercitatio † primo levis, deinde major adhibenda est; maximeque, quæ superiores partes moveat. quod genus in omnibus stomachi vitiis aptissimum est. 5
Post exercitationem opus est unctione, fricatione; balneo quoque nonnunquam, sed rarius; interdum alvi ductione. Cibis deinde calidis, neque inflantibus: eodemque modo calidis potionibus, primo aquæ; post, ubi 10
resedit inflatio, vini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi vitiis præcipiendum est; ut, quo modo se quisque ager refecerit, eodem sanus utatur. nam redit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defenditur bona valetudo, 15
quibus reddita est.

At si inflammatio aliqua est, quam fere tumor & dolor sequitur, prima sunt quies, & abstinencia; lana sulphurata circumdata; in jejuno apsinthium. Si ardor stomachum 20
urget, aceto cum rosâ subinde fovendus est: deinde cibis quidem utendum est modicis; imponenda vero extrinsecus quæ simul & reprimunt & molliunt: deinde, his detractis, utendum calidis ex farina cataplasmatibus, quæ 25
reliquias digerant: interdum alvus ducenda: adhibenda exercitatio, & cibus plenior.

At, si exulceratio stomachum infestat, eadem fere facienda sunt, quæ in faucibus 30
exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi lenes & glutinosi cibi, sed citra satietatem. Omnia acria atque acida removenda.

199.

† Equitatio. Plin. XXVIII. 4. in fine.

venda. Vino, si febris non est, dulci, aut, si id inflat, certe leni utendum: sed neque perfrigido, neque nimis calido.

Si vero pituita stomachus impletur, necessarius modo in jejuno, modo post cibum vomitus est. Utilis exercitatio, gestatio, navigatio, fricatio. Nihil edendum, bibendumque, nisi calidum; vitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consueverunt.

10 Molestius est, si stomachus bile vitiosus est. Solent autem hi, qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus, hanc, & quidem, quod pessimum est, atram vomere. His recte alvus ducitur: potiones ex apsinthio
15 dantur: necessaria gestatio, navigatio, &, si fieri potest, ex nausea vomitus: vitanda cruditas: sumendi cibi faciles & stomacho non alieni, vinum austerum.

Vulgatissimum vero pessimumque stomachi vitium est resolutio, id est, cum cibi non btenax est, soletque desinere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones, exercitationesque superioris partis necessariae,
25 item unctiones, fricationesque: hinc perfrundi frigida, atque in eadem natare, canalibus ejusdem subicere etiam stomachum ipsum, & magis etiam à scapulis id quod contra stomachum est: consistere in
30 frigidis, medicatisque fontibus, quales cCutiliarum Sumbruinarumque sunt, salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter coquuntur, quam facile vitiantur. Ergo plerique, qui nihil
aliud

b Aretæus de Morb. Diurn. II, 7. c Plin. II, 95. & XXXI, 2. Vitruvius VIII, 3. Cælius Aurelianus, Tard. Pass. V, 2. p. 518.

aliud concoquere possunt, bubulam co-
quunt. Ex quo colligi potest, neque
avem, neque venationem, neque piscem
dari debere, nisi generis durioris. Potui
quidem aptissimum est vinum frigidum, 5
vel certe bene calidum meracum, potissi-
mum ^d Rheticum, vel Allobrogicum, aliud-
ve, quod & austerum & relina conditum
est: si id non est, quam asperrimum, ma-
ximeque ^e Signinum. 100

Si cibus non continetur, danda aqua, &
eliciendus plenior vomitus est; iterumque
dandus cibus, & tum admovendæ duobus
infra stomachum digitis cucurbitulæ, ibi-
que duabus aut tribus horis continendæ 15
sunt. Si simul & vomitus, & dolor est, im-
ponenda supra stomachum est lana succi-
da, vel spongia ^f ex aceto, vel cataplasma,
quod refrigeret. Perfricanda vero non diu,
sed vehementer brachia, & crura, & cale- 20
facienda.

Si plus doloris est, infra præcordia qua-
tuor digitis cucurbitula utendum est: pro-
tinus dandus panis ex posca frigida. Si non
continuit, post vomitum leve aliquid ex 25
his, quæ non aliena stomacho sint. Si ne
id quidem tenuit, singuli cyathi vini, sin-
gulis interpositis horis, donec stomachus
consistat. Valens etiam medicamentum
est, radiculæ succus: valentius, acidi puni- 30
ci mali, cum pari modo succi, qui ex dul-
ci punico malo est, adjecto etiam intubi
succo, & mentæ, sed hujus minima parte;
quibus tantundem, quantum ex his omni-
bus

^d Serv. ad Virgil. II. Georg. 96. Sueton. in August.
c. 77. Plin. XIV, 6. ^e Plin. XIV, 6. ^f Trallian. VII, 7.

bus est, aquæ frigidæ quam optime miscetur. Id enim plus quam vinum ad comprimendum stomachum potest. Supprimendus autem vomitus est, qui per se venit, 5 etsi nausea est.

Sed si coacuit intus cibus, aut computruit, quorum utrumlibet ructus ostendit, ejiciendus est; protinusque, cibis assumptis iisdem, quos proxime posui, stomachus re-
10 stituendus. Ubi sublatus est præsens metus, ad ea redeundum est, quæ supra præcepta sunt.

C A P. VI.

De Laterum doloribus.

15 S T O M A C H U S lateribus cingitur; atque sin his quoque vehementes dolores esse consuerunt. Eorum initium vel ex frigore, vel ex ictu, vel ex nimio cursu, 20 vel ex morbo est. Sed interdum id malum intra dolorem est: isque modo tarde, modo celeriter solvitur. interdum ad perniciem quoque procedit; oriturque acutus morbus, qui *πλευριτικός* à Græcis nomi-
25 natur. Huic dolori lateris, febris ^b & tussis accedit: & per hanc excreatur, si tolerabilis morbus est, pituita; si gravis, sanguis. Interdum etiam sicca tussis est, quæ nihil emolitur, idque vitio primo gravius, 30 secundo tolerabilius est.

Remedium vero est magni & recentis doloris, sanguis ^c missus. At, si levior, si vetustior casus est, vel supervacuum, vel serum id auxilium est; confugiendumque

O

ad

ad cucurbitulas est, ante summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec ulcera pustulasque excitet; & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc, circumdare

483, 3. primum oportet latus hapso lanæ sulphuratae: deinde, cum paululum inflammatio se remisit, ficcis & calidis fomentis uti. Ab his transitus ad malagmata est.

250.

252.

Si vetustior dolor remanet, novissime refina imposita discutitur. Utendum cibis potionibusque calidis: vitandum frigus. Inter hæc tamen non alienum est extremas partes oleo & sulphure perfricare. Si levata tussis est, leni lectione uti: jamque & acres cibos, & vinum meracius assumere. Quæ ita à medicis præcipiuntur. Attamen

15

324, 18. sine his rusticos nostros epota ex aqua trixago satis adjuvare dicitur.

Hæc in omni lateris dolore communia sunt: plus negotii est, si acutus quoque morbus is factus est. In hoc, præter ea, quæ supra posita sunt, hæc animadvertenda sunt: ut cibus sit quam maxime tenuis & lenis, præcipueque sorbitio, eaque ex ptisana potissimum, aut jus in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit: idque non nisi tertio die detur: si tamen per vires licebit: potui vero aqua mulsa, in quo hyssopum, aut ruta decocta sit. Quæ quibus temporibus danda sint, ex ratione vel adauctæ, vel levatæ febris apparebit, sic, ut in remissione quam maxima dentur: cum eo tamen, ut sciamus, non esse ejus generis tussi aridas fau-

20

25

30

fauces committendas. sæpe enim, ubi nihil est, quod excreetur, continuatur, & strangulat. Ob quam causam dixi etiam pejus id genus esse tussis, quod nihil, quam quod ^{209, 3.} pituitam moveret. Sed hic vinum forbere, ut supra præcepimus, morbus ipse non patitur: in vicem ejus, cremor ptisanæ sumendus est.

Ut his autem in ipso morbi fervore sustinendus æger est, sic, ubi paulum is se remisit, alimenta pleniora, & vini quoque aliquid dari potest; dum nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectiōe vero manserit tussis, intermittere oportebit uno die; posteroque, cum cibo vini paulo plus assumere. At, invalescente quoque tussi, tum non erit alienum, ut supra quoque positum est, vini cyathos forbere. sed in hoc genere valetudinis, dulce, vel certe lene commodius est. Si malum inveteravit, athletico victu corpus firmandum est.

CAP. VII.

De Viscerum morbis: & primo, de Pulmonē.

ACOMPAGINE corporis ad viscera transeundum est; & inprimis ad pulmonem veniendum. Ex quo vehemens & acutus morbus oritur, quem *πνεύμονιαν* Græci vocant. Ejus hæc conditio est. a Pulmo totus afficitur. hunc casum ejus subsequitur tussis, bilem vel pus trahens; præcordiorum totiusque pectoris gravitas, spiritus difficultas, magnæ febres,

O 2

con-

continua vigilia, cibi fastidium, tabes.
 b Id genus morbi plus periculi quam doloris habet.

Oportet, si satis validæ vires sunt, sanguinem cmittere: sin minores, cucurbitulas sine ferro præcordiis admove. Quod si satis valet, gestando ægrum, digerere: si parum, intra domum tantum dimovere. In potionem autem hyssopum dare, cum quo ficus arida sit incocta; aut aquam mulsam, in qua vel hyssopum vel ruta decocta sit. Fricatione uti diutissime in scapulis, proxime ab his in brachiis, & pedibus, & cruribus, leniter contra pulmonem; idque bis quotidie facere.

Quod ad cibum vero pertinet, huic nec falsis opus est, neque acribus, neque amaris, neque alvum adstringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est forbitio ptisanæ, vel alicæ, vel oryzæ, cum qua recens adeps cocta sit. Cum hac, forbile ovum, nuclei pinei: ex melle, panis, vel elota alica ex aqua mulsa. Potui danda deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida; aut, si æstas est, etiam frigida; nisi quid obstat. Hæc autem altero quoque die, incrementum mo. bo dare satis est.

Ubi incrementum constitit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, præterquam aqua egelida. Si vires defunt, adjuvandæ sunt aqua mulsa. Profuntque adversus dolores imposita calida fomenta, vel ea, quæ simul & reprimunt & emolliunt. Prodest etiam impositus super pectus sal bene

bene contritus, cum cerato mistus; quia
 leviter cutem erodit, eoque impetum ma-
 teriæ, qua pulmo vexatur, evocat. Utile
 etiam aliquod malagma est ex his, quæ ma-
 5 teriam trahunt. Neque alienum est, dum 250.
 premit morbus, clausis fenestris ægrum
 continere: ubi paulum levatus est, ter aut
 quater die, fenestris aliquantum apertis,
 † purum aerem recipere. Deinde in refectio-
 10 ne pluribus diebus à vino abstinere; ge-
 statione, fricatione uti; sorbitionibus, &
 prioribus cibis adjicere, ex oleribus por-
 rum; ex carne, ungulas, & summa truncu-
 lorum, atque pisciculos, sic, ut diu nihil
 15 nisi molle & lene sumatur.

C A P. VIII.

De Hepaticis,

20 **A**LTERIUS quoque visceris morbus,
 id est jecinoris, æque modo longus,
 modo acutus esse consuevit. ἡπατικὸν
 Græci vocant. Dextra parte sub præcordiis
 vehemens dolor est: idemque ad latus dex-
 trum, & ad jugulum, a humerumque
 25 partis ejusdem pervenit: nonnunquam ma-
 nus quoque dextra torpet: horror validus
 est. Ubi male est, bilis evomitur: inter-
 dum singultus prope strangulat. Et hæc
 quidem acuti morbi signa sunt. Longioris
 30 vero, ubi suppuratio in jecinore est; dolor-
 que modo finitur, modo intenditur; dextra
 parte præcordia dura sunt, & tument; post
 cibum major spiritus difficultas est: accedit
 maxillarum quædam resolutio. Ubi invete-

O 3

ravit

† parvum vult Rhodius in Lexico Scribon. V. *exiguum*
vinum. a Aretæus de Diuturn. Morb. I, 13. Cælius Au-
 relian. Tard. Pass. III, 4.

ravit malum , venter & crura pedesque intumescunt; pectus atque humeri, circaque jugulum utrunque extenuatur.

In initio sanguinem mittere optimum est: tum venter solvendus est; si non potest aliter, per nigrum veratrum. Imponenda extrinsecus cataplasmata; primum quæ reprimant; deinde calida, quæ diducant; quibus recte iris vel apsinthium adjicitur: post
251, 5. hæc, malagma. Dandæ vero sorbitiones sunt, omnesque cibi & calidi, & qui non multum alunt, & fere qui pulmonis quoque dolori conveniunt; præterque eos, qui urinam movent, potionesque ad id efficaces. Utilia in hoc morbo sunt thymum, satureia, 15 hyssopum, nepeta, amaracum, sesamum, lauri baccæ, pini flos, herba sanguinalis, mentha, ex malo cotoneo medium, columbæ jecur recens & crudum. Ex quibus quædam per se esse, quædam adjicere 20 vel sorbitioni vel potioni licet; sic tamen, ut parce assumantur. Neque alienum est, apsinthium contritum ex melle & pipere, ejusque catapotium quotidie devorare. Abstinentium utique est ab omnibus frigidis. 25 neque enim res ulla magis jecur lædit. Frictionibus utendum in extremis partibus. Vitandus omnis labor, omnis vehementior motus: ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, ja- 30 ctus, cursus, in hoc inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua, si hiems est, calida; si æstas, tepida: itemque liberalis unctio, & in balneo sudor.

Si

Si vero jecur vomica blaborat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam ultra id scalpello caperunt, & ipsam vomicam ad-
5 urunt.

C A P. IX.

De Lienosis. ^a

AT lienis ubi affectus est, intumescit, simulque cum eo pars sinistra; quæ
10 & dura est, & prementi renititur; venterque intentus est: aliquis etiam cruribus tumor est. Ulcera aut omnino non
sanescunt, aut certe cicatricem vix recipiunt. In intenta ambulatione, vel cursu,
15 dolor, & quædam difficultas est. 62, 26.

Hoc vitium quies auget. itaque exercitatione & labore opus est: habita tamen ratione, ne febrem ista, si nimium processerit, excitent. Unctiones ^b, frictionesque, &
20 sudores necessarii sunt. Dulcia omnia inimica sunt: item lac & caseus. Acida autem maxime conveniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, & magis etiam, quod scilla conditum est, expedit. Edenda sunt
25 fassamenta, vel oleæ ex muria duræ; lactucæ intinctæ in aceto; intubi † quoque & betæ ex eodem; & sinapi, armoraciæ, & pastinacæ: de carnibus vero ungulæ, rostra, aves macræ, ejusdemque generis venatio.
30 Potui vero jejuno dari debet apsinthium aquæ incoctum: at post cibum aqua c à ferrario fabro, in qua candens ferrum subinde extinctum sit. hæc enim vel præcipue

^b Aret. de Morb. Diut. Curat. I, 13. ^c Aph. VII, 45. ^a Cæl. Aurel. Tard. Pass. III, 4. Aret. de Morb. Diut. I, 14. Marcell. de Medic. cap. XXIII, p. 345. ^b Nicol. Myreps. de Ung. Sect. III, c. 64 65. 66. 86. 87. † Nonn. de Re Cib. I, 12. ^c Scribon. Larg. c. 32. c. 132.

251,
48.

250. &
seqq.

lienem coarctet. quod animadversum est in his animalibus, quæ apud hos fabros educata exiguos lienes habent. Potest etiam dari vinum tenue, austerum; omniaque in cibis & potionibus, quæ urinæ movendæ sunt: præcipueque ad id valet vel trifolii semen, vel cuminum, vel apium, vel serpyllum, vel cytissus, vel thymum, vel hyssopum, vel satireia. hæc enim inde commodissime videntur humorem educere. ¹⁰ Lienis quoque bubulus utiliter esui datur: præcipueque cruca & nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt, quæ levant. fit ex unguentariis glandulis, quas *μυροβαλάντες* d Græci ¹⁵ vocant: fit ex lini & nasturtii semine, quo vinum & oleum adjicitur: fit ex cupressu viridi, & arida ficu: fit ex sinapi, cui sevi hircini à renibus quarta pars ponderis adjicitur, teriturque in sole, & protinus im- ²⁰ ponitur. Multisque modis huic rei cappar aptum est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & muriam ejus cum aceto forbere commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem ejus cum ²⁵ fursuribus, aut ipsum cappari cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

C A P. X.

De Renum morbis. a

30

AT renes ubi affecti sunt, diu male habent. Pejus vero est, si frequens biliosus vomitus accedit. Oportet

con-

d Scribon. Larg. c. XXXII. c. 131. a Aretæus de Diut. Morb. II, 3. Curat. Morb. Diut. II, 3. Cælius Aurelianus. Tard. Pass. V, 3.

conquiescere : cubare molliter : solvere al-
vum; si aliter non respondet, etiam duce-
re : sæpe desidere in aqua calida: neque ci-
bum, neque † potionem frigidam assumere:
5 abstinere ab omnibus falsis, acribus, acidis,
pomis: bibere liberaliter: adjicere modo ci-
bo, modo potioni piper, porrum, ferulam,
album papaver. quæ maxime inde urinam
movere consueverunt.

10 Auxilio quoque his exulceratis sunt, si
adhuc ulcera purganda sunt, cucumeris se-
mina detractis corticibus sexaginta, nuclei
ex pinu silvestri quindecim, anisi quod tri-
bus digitis sumi possit; croci paulum, con-
15 trita & in duas multi potiones divisa.

Si vero dolor tantum levandus est, ejus-
dem cucumeris semina triginta, iidem nu-
clei viginti, nuces Græcæ quinque, croci
paululum, contrita & cum lacte potui data.

20 Ac insuper quoque recte quædam malagma-
ta injiciuntur; maximeque ea, quæ humo- 250.
ri extrahendo sunt.

C A P. XI.

25 *De Intestinorum morbis: & primo
de Cholera.*

A VISCERIBUS ad intestina veniendum
est, quæ sunt & acutis & longis mor-
bis obnoxia. Primoque facienda men-
30 tio est cholerae; quia commune id sto-
machi atque intestinorum vitium videri
potest. Nam simul & dejectio & vomitus
est: præterque hæc inflatio est, intestina
torquentur, bilis supra infraque erumpit,

O 5

pri-

† Plin. de R. M. L. V. C. 32.

a Aræteus de Morb. Acut. II, 5. Cælius Aurelian.
Acut. Morb. III, 19.

primum aquæ similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnumquam nigra, vel varia. Ergo eo nomine morbum hunc *χολέραν* Græci nominarunt. Præter ea vero, quæ supra 5 comprehensa sunt, sæpe etiam crura manusque contrahuntur; urget sitis, anima deficit. quibus concurrentibus, non mirum est, si subito quis moritur. Neque tamen ulli morbo minori momento succurritur. 10

Protinus ergo, ubi ista coeperunt, aquæ tepidæ b quam plurimum bibere oportet, & vomere. Vix unquam ea sine vomitu sumitur: sed etiam si non incidit, tamen corrump- 128, ptæ miscuisse novam materiam prodest; 15 24. parsque sanitatis est, vomitum esse suppressum. Si id incidit, protinus ab omni potione abstinendum est. Si vero tormina sunt, oportet frigidis & humidis fomentis stomachum fovere: vel, si venter dolet, iisdem 20 egelidis, sic ut venter ipse mediocriter calentibus juvetur. Quod si vehementer & vomitus, & dejectio, & sitis vexant, & adhuc subcruda sunt, quæ vomuntur, nondum vino maturum tempus est: aqua, neque 25 ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. Admovendumque naribus est pulegium ex aceto, vel polenta vino aspersa, vel mentha, vel quod secundum naturam est.

At cum discussa cruditas est, tum magis 30 verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad c vinum. Id esse oportet tenue, odoratum, & cum aqua frigida mixtum, vel polenta adjecta, vel infracto pane;

b Trallian. VII, 14. c Aretæus Acutor. Morb. Curat. II, 4.

pane; quem ipsum quoque assumere expedit: quotiesque aliquid aut stomachus, aut venter effudit, toties per hæc vires restituere. Erasistratus primo tribus ⁵ ni guttis, aut quinis aspergendam potionem esse dixit; deinde paulatim merum adjiciendum. Is, si ab initio vinum dedit, & metus cruditatis secutus est, non sine causa fecit: si vehementem infirmitatem ¹⁰ adjuvari posse tribus guttis putavit, erravit.

At si inanis est homo, & crura ejus contrahuntur, interponenda potio apsinthii est. Si extremæ partes corporis frigent, un- ¹⁵ gendæ sunt calido oleo, cui ceræ paulum sit adjectum; calidisque fomentis nutriendæ. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admovenda est, aut sinapi super- ²⁰ imponendum. Ubi is constitit, dormire oportet: postero die utique à potione abstinere: die tertio in balneum ire: paulatim se cibo reficere; somnoque, quisquis facile adquiescit; vitetque lassitudinem, & frigo- ²⁵ ra. Si post suppressam choleram febricula manet, alvum duci necessarium est: tum cibis vinoque utendum est. Sed hic quidem morbus & d acutus est, & inter intestina stomachumque versatur sic, ut, cujus po- ³⁰ tissimum partis sit, non facile dici possit.

CAP.

CAP. XII.

De Cœliaco ventriculi morbo.

IN ipſius vero ventriculi porta conſiſtit
is, qui & longus eſſe conſuevit, & κοιλια- 5
κός à Græcis nominatur. Sub hoc venter
indureſcit, dolorque ejus eſt: alvus nihil
reddit, ac ne ſpiritum quidem † tranſmittit:
extremæ partes frigeſcunt: difficulter ſpiri-
tus redditur.

10

Commodiſſimum eſt inter initia calida
cataplaſinata toti ventri imponere, ut dolo-
rem leniant. Poſt cibum vomere, atque ita
ventrem exinanire. Proximis deinde die-
bus cucurbitulas ſine ferro ventri & coxis 15
admoveſcere. Ventrem ipſum liquare dato la-
cte, & vino ſalſo, frigido. Si tempus anni
patitur, etiam viridibus ficis; ſic tamen,
ne quis aut cibus, aut humor univerſus de-
tur, ſed paulatim. Ergo per intervalla 20
temporis ſat eſt cyathos binos ternosve aſſu-
mere, & cibum pro portione hujus. com-
modeque facit cyatho lactis cyathus aquæ
miſtus, & ſic datus. Cibique calentes &
acres utilioreſ ſunt: adeo ut lacti quoque 25
recte contritum allium adjiciatur.

Procedente vero tempore, opus eſt ge-
ſtari; maximeque navigare; perfricari ter
aut quater die ſic, ut nitrum oleo adjicia-
tur; perfundi aqua calida poſt cibum; dein- 30
de ſinapi imponere per omnia membra, ex-
cepto capite, donec arrodantur & rubeant;
maximeque ſi corpus durum & virile eſt.
paulatim deinde faciendus eſt tranſitus ad
ea,

† Planè contrarium dicit Marcellus cap. XXVII.
p. 363.

ca, quæ ventrem comprimunt. Assa caro danda, valens, & quæ non facile corrumpatur: in potum vero pluviatilis aqua decocta; sed quæ per binos ternosve cyathos bibatur.

Si vetus vitium est, oportet laser quam optimum ad piperis magnitudinem devorare: altero quoque die vinum vel aquam bibere, interdum interposito cibo, singulos vini cyathos forbere: ex interiori parte infundere aquam pluviatilem egelidam; maximeque, si dolor in imis partibus remanet.

CAP. XIII.

De Tenuioris intestini morbo.

INTRA ipsa vero intestina consistunt duo morbi: quorum unus in tenuiore, alter in pleniore est. Prior acutus est: infequens esse longus potest. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum *αχέδαψον*, plenioris *εἰλεδν* nominavit. A plerisque video nunc illum priorem *εἰλεδν*, hunc *κολικόν* nominari. Sed prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem movet. Fit in alterutro loco inflammatio: nec alvus, nec spiritus b infra transmittitur. Si superior pars affecta est, cibus: si inferior, sterqus per os redditur: si utralibet, metus est. Adjicitur periculo, si vomitus c biliosus, mali odoris, aut varius, aut niger est.

Remedium est, sanguinem mittere; vel cucurbitulas pluribus locis admoveere, non ubique cute incisa: id enim duobus aut tribus locis satis est: ex cæteris spiritum evoca-

a Cæl. Aurelian. Acutor. Morb. III, 17. b Aretæus de Morb. Acut. II, 6. c Aph. VII, 10.

evocare abunde est. Tum animadvertere oportet, quo loco malum sit. solet enim contra id tumere. Et si supra umbilicum est, alvi ductio utilis non est. Si infra est, alvum ducere interdum, ut Erasistrato d^d placuit, optimum est, & sæpe id auxilii in his partibus magnum remedium est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore, cum oleo & melle sic, ut præterea nihil adjiciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere 10 oportet supra summum ventrem, paulatimque deducere. invenietur enim mali locus; qui necesse est renitatur: & ex eo demum deliberari poterit, ducenda, nec ne alvus sit.

Illa communia sunt: calida cataplasmata admove, eaque imponere à mammis usque ad inguina, & spinam; ac sæpe mutare: brachia, cruraque perfricare: demittere totum hominem in calidum oleum. Si do- 20 lor non quiescit, etiam in alvum ex parte inferiore tres aut quatuor cyathos calidi olei dare. Ubi per hæc consecuti sumus, ut ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui mulsū tepidum non mul- 25 tum. (nam ante magna cura vitandum est, ne quid bibat.) si id commode cessit, adjicere sorbitionem.

Ubi dolor & febricula quierunt, tum demum uti cibo pleniore; sed neque inflante, 30 neque valido, ne intestina adhuc imbecilla lædantur. potui vero nihil præterquam puram aquam. Nam sive quid vinolentum sive acidum est, id huic morbo alienum est.

Ac

Ac postea quoque vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, cæterosque corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit; & cum frigus subit, siue aliqua jactatio, nisi bene jam confirmatis intestinis, revertitur.

CAP. XIV.

De Morbo intestini plenioris. a

IS autem morbus, qui in intestino pleniore est, in ea maxime parte est, quæ cæcum esse proposui. Vehemens fit inflatio, vehementes dolores, dextra magis parte: intestinum verti videtur; quod prope spiritum elidit. In plerisque post frigora cruditatesque oritur, deinde quiescit; & per ætatem sæpe repetens sic cruciat, ut vitæ spatio nihil demat.

Ubi is dolor cepit, admoveere ficca & calida fomenta oportet; sed primo lenia, deinde validiora; simulque fricatione ad extremas partes, id est, crura brachiaque materiam evocare. Si discussus non est, quæ dolet, cucurbitulas sine ferro defigere. Est etiam medicamentum ejus rei causa comparatum, quod *κολικόν* nominatur. Id se repperisse Cassius gloriabatur. magis prodest potui datum. sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem levat.

Nisi finito vero tormento, recte neque cibis neque potio assumitur. Quo victu sit utendum iis, qui hoc genere tentantur, jam mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod

^a Trallian. X, 1. Aretæus de Morb. Diurn. II, 8.
Gal. Aurelian. Tard. Pass. IV, 7.

281, 7. quod *κολικόν* nominatur, ex his ^b constat. Costi, anisi, castorei, singulorum *p.** III. petroselinii *p.** IV. piperis longi, & rotundi, singulorum *p.** V. papaveris lacrymæ, junci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum *p.** VI. quæ melle excipiuntur. Id autem & devorari potest, & ex aqua calida sumi.

C A P. XV.

De Torminibus.

69, 3. **P**ROXIMA his inter intestinorum mala ¹⁰ tormina esse consueverunt. *δυσεντερία* Græce vocatur. Intus intestina a exulcerantur : ex his cruor manat;isque modo cum stercore aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quasi mucosis ex- ¹⁵ cernitur; interdum simul quædam † carnosæ descendunt. Frequens dejiciendi cupiditas, dolorque in ano est. Cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur : atque eo quoque tormentum intenditur; idque post ²⁰ tempus aliquod levatur, exiguaque requies est, somnus interpellatur, febricula oritur, longoque tempore id malum, cum inveteraverit, aut tollit hominem, aut, etiamsi finitur, excruciat. ²⁵

Oportet inprimis conquiescere; siquidem omnis agitatio exulcerat : deinde jejunum sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquefolii sit adjecta : imponere cataplasmata super ventrem, quæ repri- ³⁰ munt; quod in superioribus ventris morbis non expedit : quotiesque defecit, subluere aqua calida, in qua decoctæ verbenæ sint :

^b Scrib. Larg. cap. XXIX. Com. 120. Nicol. Myreps. sect. xxxi. de Catapl. c. 5. a Trallian. VIII, 9. Aretæus de Morb. Diuturn. II, 9. Hippocr. de Affection. XXIV. † Aphor. IV, 26.

sint : portulacam vel coctam , vel ex duramuria edisse ; cibos potionesque eas , quæ adstringunt alvum.

- Si vetustior morbus est , ex inferioribus
 5 partibus tepidum infundere vel ptisanæ cremorem , vel lac , vel adipem liquatam , vel medullam cervinam , vel oleum , vel cum rosa butyrum ; vel cum eadem album crudum ex ovis , vel aquam , in qua lini semen
 10 decoctum sit ; vel , si somnus non accedit , vitellos cum aqua , in qua rosæ floris folia cocta sint. Levant enim dolorem hæc , & mitiora ulcera efficiunt ; maximeque utilia sunt , si cibi quoque secutum fastidium est.
 15 Themison b muria dura quam asperrima sic utendum memoriæ prodidit.

- Cibi vero esse debent , qui leniter ventrem adstringant. At ea , quæ urinam moveant , si id consecuta sunt , in aliam partem
 20 humorem avertendo profunt : si non sunt consecuta , noxam augment. itaque nisi in quibus prompte id facere consuerunt , non sunt adhibenda. Potui , si febricula est , aqua pura calida , vel ea , quæ ipsa quoque adstringat , dari debet : si non est , vinum leve , austerum. Si pluribus diebus nihil remedia
 25 illa juverunt , vetusque jam vitium est , aquæ bene frigidæ potio assumpta ulcera adstringit , & initium secundæ valetudinis
 30 facit. Sed ubi venter suppressus est , protinus ad calidam potionem revertendum est.

293, 20.

Solet autem interdum etiam putris fæces , pessimique odoris descendere : solet &

P

inter-

b Cæl. Aurelian. Tard. Pass. IV;6. Galen. Meth. Med. XII. c. 1. Joan. Baptist. Sylvat. Med. Histor. 62.

interdum purus sanguis profluere. Si superius vitium est, alvus aqua mulsa delui debet; tum deinde etiam infundi, quæ supra comprehensa sunt. Valensque est etiam adversus cancerem intestinorum, minii gleba cum salis hemina contrita: sin minus, mista his aqua in alvum datur. At, si sanguis profluit, cibi potionesque esse debent, quæ adstringant.

CAP. XVI.

De Levitate intestinorum. 2

64, 10.

EX torminibus ^b interdum intestinorum levitas oritur; qua continere nihil possunt, & quicquid assumptum est, ¹⁵ inconfectum protinus reddunt. Id interdum agros trahit, interdum præcipitat.

In hoc utique adhibere oportet compri-
mentia; quo facilius tenendi aliquid inte-
stinis vis sit. Ergo & super pectus ponatur ²⁰
sinapi; exulcerataque cute, malagma, ^c quod
humorem evocet: & ex verbenis decocta
in aqua desideat; & cibos potionesque assu-
mat, quæ alvum adstringunt; & frigidis uta-
tur perfusionibus. ²⁵

Oportet tamen prospicere, ne, simul his
omnibus admotis, vitium contrarium per
immodicas inflationes oriatur. Paulatim
ergo firmari intestina debebunt, aliquibus
quotidie adjectis. Et cum in omni fluore ³⁰
ventris, tum in hoc præcipue necessarium
est, non quoties libet desidere, sed quoties
necesse est, ut hæc ipsa mora in consuetu-
dinem ferendi oneris intestina deducat.

Alte-

a Hippocr. de Affection. T. XXV. Aretæus de
Morb. Diutur. II, 10. b Aphor. VII, 76. c Nicol.
Myreps. Sect. XXXIV. c. 9.

Alterum quoque, quod æque ad omnes
similes affectus pertinet, in hoc maxime
servandum est; ut, cum pleraque utilia in-
suavia sint, qualis est plantago, & rubi, &
5 quicquid malicorio mixtum est, ea potissi-
mum ex his dentur, quæ maxime æger vo-
let. Deinde, si omnia ista fastidiet, ad ex-
citandam cibi cupiditatem, interponatur ali-
quid minus utile, sed magis gratum. Exer-
10 citationes & fricationes huic quoque morbo
necessariæ sunt: & cum his sol, ignis, bal-
neum, vomitus d, ut Hippocrati visum est;
etiam albo veratro e, si cætera parum profi-
cient, evocatus.

CAP. XVII.

De Lumbricis alvum occupantibus.

20 **N**ONNUNQUAM autem lumbrici quo-
que occupant alvum, hique modo
ex inferioribus partibus; modo, quod
fœdus, ore a redduntur. Atque interdum
latos eos, qui pejores sunt; interdum tere-
tes videmus.

25 Si lati sunt, aqua potui dari debet, in
qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit;
aut cui adjectum sit contritum vel hyssop-
pum, vel piperis acetabulum, scammonæ
paulum. Vel etiam pridie, cum multum al-
30 lium ederit, vomat. Posteroque die mali
punici tenues radículas colligat, quantum
manu comprehendet; easque contusas in
aquæ tribus sextariis decoquat, donec ter-
tia pars supersit; huic adjiciat nitri paulum,
& jejunos bibat. Interpositis deinde tribus

P 2

horis,

d Aph. IV, 12. e De Victu Acutor. LVI, 6. Quate-
nus sc. fluxio ex capite, de Affection. XXV, 6. a Seren.
Sam. XXX, 5. Cælius Aurel. Tard. Pass. IV, 8.

103, 31. horis, duas potiones sumat talis aquæ, vel
 muriæ duræ huic adjectæ; tum desideat, sub-
 jectæ calida aqua in pelve.

Si vero teretes sunt, qui pueros maxime
 exercent, & eadem dari possunt, & quæ- 5
 dam leviora; ut contritum semen urticæ,
 aut brassicæ, aut cumini cum aqua, vel men-
 tha b cum eadem, vel apfinthium decoctum,
 vel hyssopum ex aqua mulsa, vel nasturtii
 semen cum aceto contritum. Edisse etiam 10
 & lupinum, & allium prodest; vel in alvum
 oleum subter dedisse.

C A P. XVIII.

De Teneſmo.

EST autem aliud levius omnibus proxi- 15
 mis, de quibus supra dictum est, quod
 τενεσμον Græci vocant. Id neque acu-
 tis neque longis morbis annumerari de-
 bet, cum facile a tollatur, neque unquam
 per se jugulet. In hoc æque atque in tor- 20
 minibus frequens desidendi † cupiditas est;
 æque dolor, ubi aliquid excernitur. De-
 scendunt autem pituitæ b mucisque similia;
 interdum etiam leviter subcruenta; sed his
 interponuntur nonnunquam ex cibo quoque 25
 recte cocta.

Desidere oportet in ‡ aqua calida; sæpius-
 que ipsum anum nutrire. cui rei plura me-
 dicamenta idonea sunt: butyrum c cum ro- 30
 sa; acacia ex aceto liquata; emplastrum id,
 quod τετραφάρμακον Græci vocant, rosa li-
 quatum; alumen lanæ circumdatum, & ita
 appositum. eademque ex inferiore parte
 in-

262, II.

b Seren. Sammon. XXX, II. a Plin. H. N. XXVIII.
 14. † Marcell. de Med. c. XXVIII. p. 372. b Hip-
 pocrat. de Affection. T. xxvii. ‡ Hippocrat. de
 Fistul. c Al. Trallian. VIII, 6.

indita, quæ torminum auxilia sunt: eadem verbenæ decoctæ, ut inferiores partes fo-
veantur. Alternis vero diebus aqua, alter-
nis leve & austerum d vinum bibendum est.

5 Potio esse debet egelida & frigida pro-
pior: ratio victus talis, qualem ad tormina
supra præcepimus.

C A P. XIX.

De Ventris fluxu.

10 **L**EVIOR etiam, dum recens, dejectio,
Lubi & liquida alvus, & sæpius quam
ex consuetudine fertur. In qua inter-
dum tolerabilis dolor est, interdum gra-
15 vissimus; idque pejus est. Sed uno die flue-
re alvum sæpe pro valetudine est: atque
etiam pluribus, dum febris absit, & intra
septimum diem id conquiescat. Purgatur
enim corpus, &, quod intus læsurum erat,
20 utiliter effunditur. Verum spatium pericu-
losum est. interdum enim tormina ac febri-
culas excitat, viresque consumit.

Primo die quiescere satis est; neque im-
petum ventris prohibere. Si per se desit,
25 balneo uti, paulum cibi capere: si mansit,
abstinere non solum à cibo, sed etiam à po-
tione. Postero die, si nihilominus liquida
alvus est, æque conquiescere; paululum
adstringentis cibi sumere. Tertio die in bal-
30 neum ire; vehementer omnia præter ven-
trem perfricare; ad ignem lumbos, scapu-
lasque admoveere; cibis uti, sed ventrem
contrahentibus; vino non multo, meraco.
Si postero quoque die fluet, plus edisse, sed

P 3

vomere

vomere etiam. Ex toto, donec conquiescat, contra siti, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, ut, post hanc animadversionem, alvus non contrahatur.

232, 5. Alia via est, ubi velis suppressere, coenare, deinde vomere: postero die lecto conquiescere, vesperi ungi, sed leviter: deinde panis circa selibram ex vino a aminæo mero sumere; tum assum aliquid, maximeque avem; & postea vinum idem bibere aqua pluviatili mixtum, idque usque quintum diem facere, iterumque vomere. Frigidam autem assidue potionem esse debere, contra priores authores Asclepiades affirmavit, & quidem quam frigidissimam. Ego experimentis quemque in se credere debere existimo, calida potius, an frigida utatur.

Interdum autem evenit, ut id malum, pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. A vomitu oportet incipere: deinde postero die vesperi tepido loco ungi; cibum modicum assumere, vinum meracum quam asperrimum; impositam super ventrem habere cum cerato rutam. In hoc autem affectu corporis neque ambulatione, neque fricatione opus est: vehiculo sedisse, vel magis etiam equo, prodest. neque enim ulla res magis intestina confirmat.

Si vero etiam medicamentis utendum est, aptissimum est, quod ex pomis fit. Vindemiæ tempore in grande vas conjicienda sunt pira atque mala silvestria. si ea non sunt,

sunt, pira ^b Tarentina viridia, vel Signina, mala ^c Scandiana vel [†] Amerina, ^d myrrhapia: hisque adjicienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punica, sorba, &, quibus magis utimur, etiam torminalia, sic ut hæc tertiam ollæ partem teneant: tum deinde ea musto implenda est; coquendumque id, donec omnia, quæ indita sunt, liquata, in unitatem quandam coeant. Id gustui non insuave est: &, quodocunque opus est, assumptum leniter, sine ulla stomachi noxa, ventrem tenet. duo aut tria cochlearia uno die sumpsisse, satis est. Alterum valentius genus: myrti baccas legere, ex his vinum exprimere, id decoquere, ut decima pars remaneat, ejusque cyathum sorbere. Tertium, quod quodocunque fieri potest, malum punicum excavare, exemptisque omnibus seminibus, membranas, quæ inter ea fuerunt, iterum conjicere: tum infundere cruda ova, rudiculaque miscere: deinde malum ipsum super prunam imponere; quod, dum humor intus est, non aduritur: ubi siccum esse coepit, remove oportet, extractumque cochleari, quod intus est, edisse. Hoc, aliquibus adjectis, majus momentum habet. Itaque etiam in piperatum conjicitur, misceturque cum sale & pipere, esturque ex his. Edenda est pulicula etiam, cum qua paulum ex favo vetere coctum sit. Et lenticula cum malicorio cocta, rubique cacumina in aqua decocta, & ex oleo atque aceto assumpta, efficacia sunt: ut & ea aqua, in

P 4

qua

^b Plin. H. N. XV, 15. ^c Scribon. Larg. Comp. 104. Plin. H. N. XV, 15. [†] Gataker. Adversar. Miscellan. cap. 5. pag. 35. I. Rhodius ad Scribon. Larg. comp. 64. ^d Myrrapia Plin. H. N. XV. 15.

230, 8.

qua vel palmulæ, vel malum cotoneum, vel arida sorba, vel rubi decocti sunt, potata. quod genus significo, quoties potionem dandam esse dico, quæ adstringat. Triticum quoque hemina in vino aminæo auctero decoquitur; idque triticum jejuno ac sitienti datur; superque id vinum id sorbetur. quod jure valentissimis medicamentis annumerari potest. Atque etiam potui datur vinum Signinum, vel resinatium austerum, vel quodlibet austerum. Contunditurque cum corticibus, seminibusque suis punicum malum, vinoque tali miscetur: idque vel merum sorbet aliquis, vel bibit mixtum. Sed medicamentis uti, nisi in vehementibus malis, supervacuum est.

234, 9.

CAP. XX.

De Vulvæ morbo.

EX vulva quoque fœminis vehemens malum nascitur: proximeque ab stomacho, vel afficitur hæc, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat, ut tanquam comitiali a morbo prosterнат. Distat tamen hic casus, eo quod neque oculi vertuntur, nec spumæ profluunt, nec nervi distenduntur: sopor tantum est. Id vitium quibusdam fœminis crebro revertens perpetuum evadit.

Ubi incidit, si satis virium est, b sanguis missus adjuvat: si parum est, cucurbitulæ tamen defigendæ sunt in inguinibus. Si diutius aut jacet aut alioqui jacere consuevit,

a Areteus de Morb. Acut. II, 11. b Idem de Curat. Acut. II, 19.

suevit, admoveere oportet naribus extin-
ctum ex lucerna linamentum, vel aliud ex
his, quæ foedioris esse & odoris retuli, quod
mulierem excitet. Idemque aquæ frigidæ
5 perfusio efficit. Adjuvatque ruta contrita
cum melle, vel ex cyprino ceratum, vel
quodlibet calidum & humidum catapla-
sma, naturalibus pube tenus impositum. In-
ter hæc etiam perfricare coxas, & poplites
10 oportet.

Deinde, ubi ad se rediit, circumciden-
dum vinum est in totum annum †, etiam si
casus idem non revertitur. Fricatione quo-
tidie utendum totius quidem corporis,
15 præcipue vero ventris, & poplitem. Cibus
ex media materia dandus. Sinapi super
imū ventrem tertio quoque aut quarto
die imponendum, donec corpus rubeat.

Si durities manet, mollire commode
20 videtur solanum in lac demissum, deinde
contritum, & cera alba atque medulla cer-
vina cum irino; aut sebum taurinum vel
caprinum cum rosâ mistum. Dandum po-
tui etiam vel castoreum est, vel git, vel
25 anethum. Si parum pura est, purgetur
junco quadrato. Si vero vulva exulcerata
est, ceratum ex rosâ fiat: etiam recens suil-
la adeps, & ex ovis album misceatur, idque
apponatur; vel album ex ovo cum rosâ
30 mistum, adjecto, quo facilius consistat,
contritæ rosæ pulvere. Dolens vero vulva
sulphure suffumigari debet.

At, si purgatio nimia mulieri nocet, reme-
dio sunt cucurbitulæ, cute incisa, inguini-

P 5

bus

c Hippocr. II. de Morb. Mulier. LX. 10. 11. Are-
tæus de Curat. Acut. II. 10. † delet Rittershusius ad
Phædrum L. IV. fab. 20.

234 A. CORN. CELSI Lib. 4.
83, 23. bus d vel etiam sub mammis admotæ. Si ma-
ligna purgatio est, subjicienda sunt *coer-
centia. Id faciunt etiam albæ † violæ, ni-
grum papaver cum melle assumptum, &
gummi cum trito semine apii liquatum, &
cum cyatho passî datum.

Præter hæc, in omnibus vulvæ doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt, id est spica nardi, croco, cinnamomo, casia, similibusque. Idemque etiam decocta lentiscus præstat. Si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiam sanguinis detractio apta est; aut certe coxis admotæ cucurbitulæ cute incisa.

2. De Urinæ nimia profusione.e

At cum urina super potionum modum mingitur, & jam sine dolore profluens maciem & periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione & fricatione, maximeque in sole, vel ad ignem. Balneum rarum esse debet, neque longa in eo mora: cibus comprimens: vinum fausterum meracum; per æstatem, frigidum; per hiemem, egelidum; sed tantum, quantum minimum sit. Infima alvus quoque vel ducenda vel lacte purganda est. Si crassa urina est, vehementior esse debet & exercitatio, & fricatio: longior in balneo mora: cibus opus est teneris: vinum idem. In utroque morbo vitanda omnia sunt, quæ urinam movere consuerunt.

C A P.

d Aphor. V, 50. † Mercurialis Variar. Lect. L. I. c. 3. videtur *olivas* legisse, quo loco multa de olivis albis. e Aretæus de Morb. Diuturn. II, 2. Æginet. II, 14. & III, 45. Trall. IX, 8. f Aretæus de Curat. Diut. II, 2.

CAP. XXI.

De Seminis nimia ex naturalibus profusione.^a

⁵ EST etiam circa naturalia vitium, nimia profusio feminis. quod sine venere, sine nocturnis ^b imaginibus sic fertur, ut, interpolito spatio, tabe hominem consumat.

^o In hoc affectu salutare sunt vehementes fricationes, perfusiones, natationesque quam frigidissimæ: neque cibi, nec potio, nisi frigida assumpta. Oportet autem vitare cruditates, & omnia infantia: nihilque ex ⁵ his assumere, quæ contrahere semen videntur; qualia sunt, filigo, similia, ova, alica, amyllum, omnis caro glutinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neque alienum est, fovere inferiores partes aqua, decocta ^o ex verbenis comprimentibus, ex iisdem aliqua cataplasmata imo ventri inguinibusque circundare; præcipueque ex aceto. Vitare autem oportet rutam, & ne supinus dormiat.

CAP. XXII.

De Coxarum morbis.^a

³ SUPEREST, ut ad extremas partes corporis veniam, quæ articulis inter se conferuntur. Initium à coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit: isque hominem sæpe debilitat, & quosdam non dimittit. Eoque id genus difficillime curatur, quod fere post longos ^b morbos vi pestifera 75, 22.

^a Aret. de Morb. Diut. II, 5. & de Cur. Diut. II, 5. Tral. XI, 9. ^b Cæl. Aurel. Tard. pass. V, 5. ^a Equitatio. Plin. XXVIII. cap. 4. in fine. II. Præd. XLV. Aret. de Diut. II, 12. ^b Aret. de Curat. Diut. II, 12.

fera huc se inclinat : quod ut alias partes liberat ; sic hanc ipsam quoque affectamprehendit.

Fovendum primum aqua calida est : deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse videtur, aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mixtus capparidis cortex concisus ; vel lolii farina ex vino diluto cocta, & mista cum arida fece. quæ quia refrigescunt, imponere noctu malagmata commodius est. Inulæ quoque radix contusa, & postea ex vino austero cocta, & late super coxam imposita, inter valentissima auxilia est. Si ista non solverunt, sale calido & humido utendum est.

Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admovendæ sunt cucurbitulæ: movenda urina: alvus, si compressa est, ducenda. Ultimum est, & in uteri quoque morbis efficacissimum, tribus aut quatuor locis super coxam, † cutem candentibus ferramentis exulcerare. Fricatione quoque utendum est, maxime in sole, & eodem die sæpius : quo facilius ea, quæ coeundo nocuerunt, digerantur. Eaque, si nulla exulceratio est, etiam ipsis coxis : si est, cæteris partibus adhibenda est. Cum vero sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramenti sit, ut materia inutilis evoceatur, illud perpetuum est, non, ut primum fieri potest, hujus generis ulcera sanare: sed ea trahere, donec id vitium, cui per hæc opiculamur, conquiescat.

C A P.

CAP. XXIII.

De Genuum dolore. a

COxis proxima genua sunt. in quibus ipsis nonnunquam dolor esse consuevit. In iisdem autem cataplasmatibus cucurbitulisque præsidium est : sicut etiam, cum in humeris, aliisque commissuris dolor aliquis exortus est. Equitare ei, cui ^{240, 7.} genua dolent, inimicissimum omnium est. Omnes autem ejusmodi dolores, ubi inveteraverunt, vix citra unctionem finiuntur.

CAP. XXIV.

De Manuum & pedum articulorumque vitiis. a

IN manibus pedibusque articulorum vitia frequentiora longioraque sunt. Quæ in podagricis chiragricisve esse consue-
runt, ea raro vel b castratos, vel c pueros ante foeminæ coitum, vel d mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, tentant.

Ubi sentire cœperunt, † sanguis mittendus est. id enim inter initia statim factum, sæpe annuam, nonnunquam perpetuam valetudinem bonam præstat. Quidam etiam, cum asinino lacte poto ex toto se eluissent, in perpetuum hoc malum evaserunt. Quidam, cum toto anno à vino, mulso, venere sibi temperassent, securitatem totius vitæ consecuti sunt. idque utique post primum dolorem servandum est, etiamsi quievit. Quod si jam consuetudo ejus facta est, potest quidem aliquis esse se-
curior

a Marcell. de Med. c. XXXIV. a Cæll. Aurelian. Tard. Pass. V, 2. Trall. XI, 1. Aret. de Morb. Diut. II, 12. b Aph. VI, 28. c Aph. VI, 30. d Aph. VI, 29. † Chesneau IV, 1. de Arthrit. pag. 419, 420. Willis cap. 14. de Arthrit.

43. 28.

curior his temporibus, quibus dolor se remisit: majorem vero curam adhibere debent hi, quibus id revertitur. quod fere e vere autumnove fieri solet.

Cum vero dolor non urget, mane gestari debet; deinde ferri, aut inambulatione leni se dimovere, & si podagra est, interpositis temporibus exiguis, invicem modo sedere, modo ingredi; tum, antequam cibum capiat, sine balneo, loco calido leniter perfri-
cari, sudare, perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia,† interpositis rebus urinam moventibus, quotiesque plenior est, evomere.

Ubi dolor vehemens urget, interest, sine
tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor jam etiam obcaluerit. Nam, si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel muriam duram fervere facere oportet; deinde in pelvem conjicere, & cum jam homo pati potest, pedes demittere superque pallam dare, & vestimento tegere, paulatim deinde juxta labrum ipsum ex eadem aqua leniter infundere, ne calor intus destituat; ac deinde
nocte cataplasmata f calefacientia imponere, maximeque hibisci ‡ radicem ex vino coctam. Si vero tumor calorque est, utilioraque sunt refrigerantia, recteque in aqua
quam g frigidissima articuli continentur; sed
neque quotidie, neque diu fiat, ne nervi indurescant. Imponendum vero est cataplasma, quod refrigeret: neque tamen in hoc ipso diu permanendum; sed ad ea trans-

e Aphor. VI, 55. † Optime, quia materia serosa est. f Aretæus de Curat. Diut. II, 12. ‡ Plin. H. N. L. XX. c. 4. g Aph. V, 25.

eundum, quæ sic reprimunt, ut emolliant.

Si major est dolor, papaveris cortices in vino coquendi, miscendique cum cerato sunt, quod ex rosa factum sit: vel ceræ & adipis suillæ tantundem una liquandum, deinde his vinum miscendum, atque ubi, quod ex eo impositum est, incaluit, detrahendum, & subinde aliud imponendum est.

Si vero tumores etiam obcaluerunt, & dolent, levat spongia imposita, quæ subinde ex oleo, vel aceto, vel aqua frigida exprimitur; aut pari portione inter se mista, pix, cera, alumen. Sunt etiam plura idonea manibus pedibusque h malagmata. Quod si nihil superimponi dolor patitur, id, quod sine tumore est, fovere oportet spongia, quæ in aquam calidam demittatur, in qua vel papaveris cortex, vel cucumeris silvestris radix decocta sit; tum inducere articulis crocum cum succo papaveris & ovillo lacte.

At si tumor est, foveri quidem debet aqua egelida, in qua lentiscus, aliave ex reprimentibus verbena decocta sit: induci vero medicamentum ex nucibus amaris cum aceto tritis; aut ex cerussâ, cui contritæ herbæ muralis succus sit adjectus. Lapis etiam, qui carnem edit, quem *σαρνοφάγος* Græci vocant, excisus sic, ut pedes capiat, demissos eos, cum dolent, retentosque ibi levare consuevit. Ex quo in Assio i sepulchra faciunt. Et lapidi Assio k gratia est ad juvandum.

Ubi

h Nicol. Myreps. Sect. XXXIV. c. X, XI. Scrib. Larg. c. XLI. Comp. 158, 159. i Plin. H. N. XXXVI. 17. k Plin. loco. cit. Oribas. Synops. II, 56.

Ubi dolor & inflammatio se remiserunt, (quod intra dies l triginta fit, nisi vitium hominis accessit) modicis exercitationibus, abstinencia, unctionibus lenibus utendum est sic, ut etiam cum acopo, vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est.

237.9.

Quibus vero articulorum dolor certis temporibus revertitur, hos ante & curioso victu cavere oportet, ne inutilis materia corpori supersit : & crebriore vomitu, &, si quis ex corpore metus est, vel, alvi ductione uti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis m expulit : ne in inferiores partes factus cursus pedes repletet : cum evidens sit omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri.

C A P. XXV.

De Refectione convalescentium à morbo.

20

EX quocunque autem morbo quis convalescit, si tarde confirmatur, vigilare prima luce debet; nihilominus in lecto conquiescere : circa tertiam horam leniter unctis manibus corpus permulcere. Deinde delectationis causa, quantum juvat, ambulare, circumcisa omni negotiosa actione. Tum gestari diu : multa fricatione uti : loca, coelum, cibos sæpe mutare. Ubi triduo quatrduove vinum bibit, uno aut etiam altero die interponere aquam. Per hæc enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, & ut mature vires suas recipiat. Cum vero

25

30

1 Alii quadraginta, Aph. VI, 49. m Libro quo de Podagra scripsit. Cælius Aurelianus. Tard. Pass. II, 2. in fine.

vero ex toto convaluerit, periculose vitæ genus subito mutabit, & inordinate aget. Paulatim ergo debebit, omiffis his legibus, eo transire, ut arbitrio suo vivat.

LIBER QUINTUS.

PRÆFATIO.

DIXI de his malis corporis, quibus victus ratio maxime sub-^{3, 29.} venit. nunc transeundum est ad eam medicinæ partem, quæ magis medicamentis pugnat. His multum antiqui authores tribuerunt, & Erasistratus, & hi qui se *ἐμπειροὶ* nominaverunt; præcipue tamen Herophilus, deductique ab illo viri; adeo ut nullum morbi genus sine his curarent. Multaque etiam de facultatibus medicamentorum memoriæ prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andreæ, vel Apollonii, qui Mus cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte Aselepiades non sine causâ sustulit; & cum omnia fere medicamenta stomachum^{29, 7.} lædant, malique succi sint, ad ipsius victus^{85, 7.} rationem potius omnem curam suam tran-^{84, 25.} stulit. Verum, ut illud in plerisque morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuerunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem pervenire non possunt. Id ante omnia scire convenit, quod omnes medicinæ partes ita connexæ sunt a ut ex toto separari non possint; sed ab

Q

eo

eo nomen trahant, à quo plurimum petunt. Ergo ut illa, quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet; sic illa, quæ præcipue medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem victus debet; quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac sæpe simplicia opitulentur, sæpe mista; non alienum videtur ante proponere & nomina, & vires, & misturas eorum: quo minor ipsam curationem exsequentibus mora sit.

C A P. I.

De simplicibus facultatibus quarumcunque rerum, ex quibus medicamenta sunt:

& primo de his, quæ Sanguinem supprimunt.

SANGUINEM supprimunt, atramentum sutorium, quod Græci χάλκανθον appellant, chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloe, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta vel cimolia vel figularis, misy, frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinum, squama † & ferri & æris; atque hujus quoque duæ species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris.

C A P. II.

Quæ vulnus glutinent.

GLUTINANT vulnus, myrrha, thus, gummi, præcipueque acanthinum, psyllium, tragacantha, cardamomum;

† Et utriusque ferri legendum dicit Rubeus, p. 193.

mum, bulbi, lini semen, nasturtium, ovi album, gluten, ichthyocolla, vitis alba, contusæ cum testis suis cochleæ, mel coctum, sponsia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa: ex iisdem lana succida, si levis plaga est; etiam a aranea.

Reprimunt, alumen & scissile, quod *χυσόν* vocatur, & liquidum, melinum, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentum futorium.

C A P. III.

Quæ concoquant, & moveant pus.

CONCOQUUNT & movent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris & fuligo & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, sebum, adeps, oleum.

C A P. IV.

Quæ aperiant vulnera.^a

VULNERA aperiunt tanquam ora in corporibus, quod *ἀνοστομῶν* Græce dicitur, cinnamomum, balsamum, paces, juncus quadratus, pulegium, flos albæ violæ, bdellium, galbanum, resina terebinthina & pinea, propolis, oleum vetus, piper, pyrethrum, chamæpitys, uva taminia, sulphur, alumen, rutæ semen.

C A P. V.

Quæ purgent.

PURGANT, ærugo, auripigmentum, quod *ἀρσενικόν* à Græcis nominatur (huic autem

Q 2

tem

^a Petron. Sat. c. 58.

^a Oribas. Synopsis. II, 42, 47.

tem & sandarachæ in omnia eadem vis;
 sed validius est) squama æris, pumex, iris,
 balsamum, styrax, thus, thuris cortex, re-
 sina, & pinea, & terebinthina liquida, œnan-
 the, lacerti stercus, sanguis columbæ, & 5
 palumbi, & hirundinis, ammoniacum,
 bdellium (quod in omnia idem, quod am-
 moniacum, potest; sed hoc valentius est)
 abrotonum, ficus arida, coccum gnidium,
 a scobis eboris, omphacium, radícula, coa- 10
 gulum, sed maxime leporinum (cui eadem,
 quæ cæteris coagulibus, facultas, sed utique
 validior est) fel taurinum, vitellus crudus,
 cornu cervinum, gluten, mel crudum, misy,
 chalcitis, crocum, uva taminia, spuma 15
 argenti, galla, squama æris, lapis hæma-
 tites, minium, costum, sulphur, pix cruda,
 sebum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenti-
 cula, ervum.

CAP. VI.

20

Quæ rodant.

RODUNT, alumen liquidum, sed magis
 rotundum, ærugo, chalcitis, misy,
 squama æris, sed magis rubri, æs 25
 combustum, sandaracha, minium sinopi-
 cum, casia, balsamum, myrrha, thuris cor-
 tex, galbanum, resina terebinthina liquida,
 piper utrunque, sed rotundum magis, car-
 damomum, auripigmentum, calx, nitrum, 30
 & spuma ejus, apii semen, narcissi radix,
 omphacium, alcyonium, oleum ex amaris
 nucibus, allium, mel crudum, vinum, len-
 tiscus, squama ferri, fel taurinum, scam-
 monea,

monea, uva taminia, cinnamomum, styrax, ruthæ semen, resina, narcissi semen, sal, nuce amaræ, ut oleum earum, atramentum
5 futorium, chryfocolla, concharum cinis.

C A P. VII.

Quæ exedant corpus.

10 **E**XEDUNT corpus, acaciæ succus, hebenus, ærugo, squama æris, chryfocolla, cinis Cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur, eruca, sandaracha, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum futorium, ochra, calx, acetum,
15 galla, alumen, lac caprifici, vel lactucæ marinæ, quæ *πιδύμαλλον* à Græcis nominatur, fel, thuris fuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hæmatites, & a Phrygius, & Alius, & scissilis,
20 misy, vinum, acetum.

C A P. VIII.

Quæ adurant. a

25 **A**DURUNT, auripigmentum, atramentum futorium, chalcitis, misy, ærugo, calx, charta combusta, sal, squama æris, fex combusta myrrha, stercus & lacerti, & columbæ, & palumbi, & hirundinis, piper, coccum gnidium, allium, diphryges, lac utrumque (quod proximo capite supra comprehensum est) veratrum & album & nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, salamandra, eruca, sandaracha, uva taminia, chryfocolla, ochra,
30

Q 3

alu-

a Plin. H. N. XXXVI, 19.

a Oribas. Synops. II, 48.

alumen scissile, ovillum stercus, oenanthe.

C A P. IX.

Quæ crustas ulceribus inducant.

EADEM fere crustas ulceribus tanquam igne adustis inducunt, sed præcipue chalcitis, utique si cocta est, flos æris, ærugo, auripigmentum, misy, & id quoque magis coctum.

C A P. X.

Quæ crustas ulceribus resolvant.

CRUSTAS vero has resolvit, farina triticea cum ruta, vel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adjectum est.

C A P. XI.

Quæ discutiant ea, quæ in aliqua parte corporis coierunt.

AD discutienda vero ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt, maxime possunt, abrotonum, helanium, amaracus, alba viola, mel, lilium, sanfucus, cyperus, lac, fertula campana, serpyllum, cupressus, cedrus, iris, viola purpurea, narcissus, rosa, crocum, prasium, juncus quadratus, nardum, cinnamomum, casti, ammoniacum, cera, resina, uva taminia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini & narcissi semen, bitumen, fordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut molaris, crudus vitellus, amaræ nuces, sulphur.

C A P.

CAP. XII.

Quæ evocent, & educant.

5 **E**VOCAT & educit, ladanum, alumen rotundum, hebenus, lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, resina terebinthina & pinea, propolis, ficus arida decocta, stercus columbæ, pumex, farina lolii, grossi in aqua cocti, elaterium, 10 lauri baccæ, nitrum, sal.

CAP. XIII.

Quæ exasperata levent.

15 **L**EVANT id, quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, ovi album, lac, tragacanthum.

CAP. XIV.

Quæ carnem nutriant, & ulcus impleant.

20 **C**ARNEM alunt, & ulcus implent, resina pinea, ochra a Attice, mel, asteriace, 255, 27. cera, butyrum.

CAP. XV.

Quæ molliant.

25 **M**OLLIUNT, æs combustum, terra Eretria, nitrum, papaveris lachryma, ammoniacum, bdellium, cera, sebum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum, 30 fertula campana, narcissi & radix & semen, rosæ folia, coagulum, vitellus crudus, amaræ nuces, medulla omnis, stimmi, pix, cochlea cocta, cicutæ semen, plumbi re- trimentum, σκαρίαν μολύβδου Græci vo- 267, 17. cant,

Q 4

cant, panaces, cardamomum, galbanum, resina, uva taminia, styrax, iris, balsamum, fordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

CAP. XVI.

Qua cutem purgent.

CUTEM purgat mel, sed magis, si est cum galla, vel ervo, vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro, vel ærugine. 10

CAP. XVII.

De misturis simplicium rerum; & de ratione ponderum.

EXPOSITIS simplicibus facultatibus, dicendum est, quemadmodum misceantur, quæque ex his fiant. Miscentur autem varie, neque hujus ullus modus est, cum ex similibus alia demantur, alia adjiciantur; iisdemque servatis, ponderum ratio mutetur. Itaque, cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia misturarum genera sunt; quæ comprehendendi si possent, tamen esset supervacuum. Nam & iidem effectus intra paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet, cognitis facultatibus, facile est. Itaque contentus his ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo, quæ vel desiderari in prioribus potuerunt; vel ad eas curationes pertinent, quas protinus hic comprehendam sic, ut tamen, quæ magis communia sunt, simul jungam. Si qua singulis, vel etiam paucis com-
mo- 15 20 25 30

modata sunt, in ipsorum locum differam.

Sed & ante sciri volo, in uncia pondus denariorum septem esse. Unius deinde denarii pondus dividi à me in sex partes, id est sextantes ^a, ut idem in sextante denarii habeam, quod Græci habent in eo, quem ὀβολόν ^b appellant. Is ad nostra pondera ^c relatus paulo plus dimidio scrupulo facit.

2. *Quid d Malagma, & Emplastrum, & Pastillus inter se differant.*

Malagmata vero, atque emplastra, pastillique, quos τροχίσκος Græci vocant, cum plurima eadem habeant; differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus eorumque etiam furculis, emplastra pastillique magis ex quibusdam metallicis fiunt. Deinde malagmata contusa abunde mollescunt: nam super integram cutem injiciuntur: laboriose vero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastillique fiunt; ne lædant vulnera, cum imposita sunt. Inter emplastrum autem & pastillum hoc interest, quod emplastrum utique liquati aliquid accipit: in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore junguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. Arida medicamenta per se teruntur: deinde mistis his instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est; & ea rursus ex eo teruntur. Ea vero, quæ liquari possunt, ad ignem simul liquantur; & si quid olei misceri debet, tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Ubi facta sunt, quæ separatim fieri debuerunt,

Q 5

in
^a Rhod. de Ponderib. p. 24. ^b Rhod. de Ponderib. p. 27. ^c Rhod. de Ponderib. p. 24. ^d Reines. Variar. Lect. II. 8. p. 189.

250 A. CORN. CELSI Lib. 5.
in unum omnia miscentur. At pastilli hæc
ratio est. Arida medicamenta contrita hu-
more non pingui, ut vino vel aceto, cogun-
tur, & rursus coacta, inarescunt: atque, ubi
utendum est, ejusdem generis humore di-
luuntur. Tum emplastrum imponitur, pa-
stillus illinitur, aut alicui molliori, aut ce-
rato miscetur.

C A P. XVIII.

De Malagmatis. a

1. *Malagma adversus calidas podagras.*

His cognitis, primum malagmata subji-
ciam; quæ fere non sunt refrigerandi,
sed calefaciendi causa reperta. Est ta-
men, quod refrigerare potest; ad calidas po-
dagras aptum. Habet gallæ & immaturæ &
alterius, coriandri seminis, cicutæ, lachry-
mæ aridæ, gummi, singulorum plenum a-
cetabulum, cerati eloti, quod *πεπλυμένον* 20
Græci vocant, felibram. Reliqua fere ca-
lescunt. Sed quædam digerunt ma-
263, 20 teriam, quædam extrahunt, quæ *ἐπισπαστικά*
vocantur: pleraque certis partibus membro-
rum accommodata sunt. 25

2. *Malagma ad materiam extrahendam.*

SI materia extrahenda est, ut in hydro-
pico, in lateris dolore, in incipiente
abscessu, in suppuratione quoque me-
diocri, aptum est id, quod habet resinæ ari-
dæ, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum
p. *. ceræ p. *. Aut in quo hæc sunt: æru-
ginis rasæ, thuris, singulorum p. 11. *. am-
moniaci

moniaci salis p. vi. *. squamæ æris, ceræ.
singulorum p. viii. *. resinæ aridæ. p. xii. *.
aceti cyathus. Idem præstat cumini farina
cum struthio, & melle p. ii. *.

3. *Malagma ad jecur dolens.*

Si jecur dolet, id in quo est balsami la-
chrymæ p. xii. *. costi, cinnamomi, cassiæ
corticis, myrrhæ, croci, junci rotundi, bal-
sami feminis, iridis illyricæ, cardamomi, a-
momi, nardi, singulorum. p. xvi. *. Qui-
bus adjicitur nardinum unguentum, do-
nec cerati crassitudo sit. Et hujus quidem
recentis usus est: si vero servandum est, re-
sinæ terebinthinæ p. xvi. *. ceræ p. x. *. ex
vino leni contunduntur, & cum eo miscen-
tur:

4. *Malagma ad lienem.*

At, si lienis torquet, glandis, quam *μυρρε* 216, 15.

βάλανος Græci vocant, cortex & nitrum pa-
ribus portionibus contunduntur, resper-
gunturque aceto quam acerrimo: ubi cerati
crassitudinem habet, linteo, ante in aqua
frigida madefacto, inlinitur, & sic imponi-
tur, supraque farina ordeacea injicitur:
sed manere ibi non amplius sex horis debet,
ne lienem consumat: satiusque est id bis, aut
ter fieri.

5. *Malagma commune pluribus.*

Commune autem & jecinori, & lienem, &
abscessibus, & strumæ, parotidibus, articu-
lis, calcibus quoque suppurantibus, aut
aliter dolentibus, etiam concoctioni ven-
tris, Lyllias composuit ex his: opopanacis,
galbani, resinæ, singulorum p. ii. *. am-
monia-

moniaci, bdellii, ceræ, fevi taurini, iridis aridæ p. iiii. *. cachryos acetabulo, piperis granis † quadraginta. quæ contrita irino unguento temperantur.

6. *Malagma ad laterum dolorem.*

5

Ad laterum autem dolores compositio est a Apollophanis : in qua sunt resinæ terebinthinæ, thuris fuliginis, singulorum p. iv. *. bdellii, ammoniaci, iridis : fevi aut vitulini, aut caprini à renibus, visci, singulorum p. iv. *. Hæc autem omnem dolorem levat, dura emollit, mediocriter calefacit.

7. *Ad idem Andrea.*

Ad idem valet Andræ quoque malagma, 15 quod etiam resolvit, humorem educit, pus maturat, ubi id maturum est, cutem rumpit, & ad cicatricem perducit. Prodest impositum minutis majoribusque abscessibus : item articulis, & coxis, & pedibus 20 dolentibus : item, si quid in corpore collisum est, reficit : præcordia quoque dura & inflata emollit : ossa extrahit : ad omnia denique valet, quæ adjuvare calor potest. Id habet ceræ p. xi. *. visci, fycamini, quam 25 alias fycomorum vocant, lachrymæ, singulorum p. i. *. piperis & rotundi, & longi, ammoniaci thymiamatis, bdellii, iridis Illyricæ, cardamomi, xylobahami, thuris masculi, myrrhæ, resinæ aridæ, 30 gulorum p. x. *. pyrethri, cocci Gnidii, spumæ nitri, salis ammoniaci, radicis aristolochiæ Creticæ, cucumeris agrestis radicis, resinæ terebinthinæ liquidæ, singulorum

† Rhodius de Ponderib. p. 26. a Oribas. Synops. III. Cæl. Aurelian. Acut. M. II. 24. dicitur *Polyarchion* Marcell. de Medic. c. xx. Æginet. VII. 18.

Cap. 18. MEDICINA. 253
lorum p. xx. *. quibus adjicitur unguenti
irini, quantum fatis est ad ea mollienda,
atque cogenda.

5 8. *Malagmata ad resolvenda, quæ adstricta
sunt; & mollienda, quæ dura sunt;
& digerenda, quæ coeunt.*

Præcipuum vero est ad resolvenda, quæ
adstricta sunt, mollienda, quæ dura sunt,
digerenda, quæ coeunt, id, quod ad Poly-
10 archum authorem refertur. Habet junci
quadrati, cardamomi, thuris fuliginis,
amomi, ceræ, resinæ liquidæ, pares portio-
nes.

9. *Aliud malagma ad eadem.*

15 Aliud ad eadem Nilei: crocomagmatis,
quod quasi recrementum ejus est, p. iv. *.
ammoniacy thymiamatis, ceræ, singulo-
rum p. xxx. *. ex quibus duo priora ex ace-
to teruntur, cera cum rosa liquatur, & tum
20 omnia junguntur.

10. *Malagma Moschi ad molliendum.*

Proprie etiam dura mollit id, quod Mo-
schi esse dicitur. Habet galbani unciam,
thuris fuliginis p. iii. *. ceræ, ammoniaci
25 thymiamatis trientes†, picis aridæ p. ii, *.
aceti heminas tres

11. *Malagma Medi ad digerenda, quæ coeunt.*

Fertur etiam ad digerenda, quæ coeunt,
sub authore Medo: quod habet ceræ p. iii.
30 *. panacis p. *. semis, squamæ æris, alumi-
nis rotundi, item scissilis, singulorum p. i. *.
plumbi combusti p. i. *. & semis.

12. *Malagma Panthemi ad eadem.*

Ad eadem Panthemus utebatur, calcis.
p. *.

† Rhodius de Ponderib. p. 12.

P. *.femis, sinapis contriti, item fœni græci, aluminis, singulorum P. I. *.fevi bubuli P. II. *. & femis.

13. *Malagma ad strumas.*

Ad strumam multa malagmata invenio. 5
Credo autem, quo pejus id malum est, minusque facile discutitur, eo plura esse tentata; quæ in personis varie responderunt. Andreas author est, ut hæc misceantur: urticæ feminis P. I. *. piperis rotundi, 100
bdellii, galbani, ammoniaci thymiamatis, resinæ aridæ, singulorum P. IV. *. resinæ liquidæ, ceræ, pyrethri, piperis longi: lactucæ marinæ feminis, sulphuris ignem non experti, quod ἀπυρον vocatur, pares 15
portiones.

14. *Aliud Miconis ad idem.*

Hoc autem Miconis c est: fecis aridæ, acetii, spumæ nitri, falis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis cucumeris silvestris, re- 20
sinæ, singulorum P. IV. *. Quæ ex leni vino contunduntur.

15. *Aliud Malagma ad idem valens.*

Expeditius ad idem fit, quod habet visci, felini stercoreis, resinæ, sulphuris ignem 25
non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris P. I. *. lapidis, quem pyriten vocant, P. IV. *. cumini † acetabulum. Item in quo est lapidis ejusdem pars una, sulphuris duæ partes, resinæ terebinthinæ partes tres. 30

16. *Malagma ad strumam, & phymata.*

Arabis autem cujusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ φύμαλα vocantur, quod hæc digerit. Habet myrrhæ, falis am-
monia-

c Plin. H. N. XX, 23. *Mictionis*, ubi alii *Mycconis*, meminit. † I. Rhodius de Ponderib. p. 34.

moniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ,
crocomagmatis, ceræ, singulorum p. i. *.
lapidis ejus, quem *πυρίτω* vocant, p. iv. *.
quibus quidam adjiciunt sulphuris p. ii. *.

5 17. *Malagma ad strumam, & tubera, &*
καρκινώδη,

Est etiam proficiens in struma; & in his
tuberibus, quæ difficulter concoquuntur;
& in his, quæ *καρκινώδη* vocantur, quod ex
10 his constat: sulphuris p. ii. *. nitri p. iv.
*. myrrhæ p. vi. *. fuliginis thuris i. *. se-
mis, salis ammoniaci p. iii. *. ceræ p. i. *.

18. *Malagma Protarchi ad parotidas,*
& favum, & mala ulcera.

15 Protarchus autem ad *παρωτίδας* atque tu-
bercula, quæ *μελικηίδες*, id est favi, vel
φύμαλα nominantur, item mala ulcera, pu-
micis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuligi-
nis, spumæ nitri, iridis, singulorum p.
20 viii. *. cum ceræ p. ix. *. miscebat, hisque
olei cyathum & dimidium adjiciebat.

19. *Malagma adversus panum, &*
phymata.

At adversus panum, tum primum orien-
25 tem quod *φύγεθλον* Græci vocant, & omne
tuberculum, quod *φῦμα* nominatur, mis-
cetur ochra, quæ Attice nominatur, cum ^{247,}
duabus partibus similæ, hisque, dum con- ^{21.}
tunduntur, subinde mel instillatur, donec
30 malagmatis crassitudo sit.

20. *Malagma adversus phymata.*

Discutit etiam omne tuberculum, quod
φῦμα vocatur, id, quod habet calcis, spu-
mæ nitri, piperis rotundi, singulorum p.
1. *.

256 A. CORN. CELSI Lib. 5.
1. *. galbani P. II. *. falis P. IV. *. quæ exci-
piuntur cerato ex rosa facto.

21. *Malagma ad supprimendum omne, quod abscedit.*

Supprimit quoque omne, quod abscedit, id, in quo est galbani, fabæ fresiæ, singulorum P. I. *. myrrhæ, thuris, corticis ex radice capparis, singulorum P. IV. *. Satisque omnia abscedentia digerit murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adjecto. 100

22. *Malagma ad sanguinem supprimendum.*

At, si plus satis sanguis subit, recte imponitur, quod adversus phymata quoque potest. Constat ex his: bdellii, styracis, ammoniaci, galbani, resinæ & aridæ & liquida pineæ; item ex lentisuci, thuris, iridis, singulorum P. II. *. 150

23. *Malagma ad carcinomata & phymata lenienda.*

Carcinomata vero & phymata commode his leniuntur: galbani, visci, ammoniaci, resinæ terebinthinæ singulorum P. I. *. fevi taurini P. *. semis, fecis combustæ quam maxima portione, dum id siccius non faciat, quam esse malagma oportet. 20 25

24. *Malagma ad faciem contusam ejusque livorem.*

Quod si facie contusa livor subcruentus est, hæc compositio nocte & die imposita tollit. Aristolochiæ, thapsiæ, singulorum P. II. *. bdellii, styracis, ammoniaci thymiamatis, galbani, resinæ aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris masculi, iridis Illyricæ, ceræ, singulorum P. IV. *. Eidem faba quoque imposita proficit. 30

25. *Malagmata ἀνασρωμωτικά ad aperiendum.*

Sunt etiam quædam malagmata, quæ ἀνασρωμωτικά Græci vocant, quoniam aperiendi vim habent. Quale est, quod ex his
5 constat: piperis longi, spumæ nitri, singulorum P. II. *. erysimi P. IV. *. quæ cum melle miscentur. Idoneaque etiam strumæ aperiendæ sunt. Ejus generis, vehementiusque ex his est, quod habet calcis P. IV. *.
10 piperis grana sex, nitri, ceræ, singulorum 2826 P. X. *. mellis P. III. *. olei heminam.

26. *Miconis Malagma, ad resolvendum aperiendumque ac purgandum.*

Miconis quoque est, quod resolvit, aperit,
15 rit, purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum, pumicem, pari pondere; quibus tantum picis, & ceræ adjicitur, ut fiat cerati crassitudo.

27. *Malagma ad ossa & nervos.*

20 Ad ossa autem Aristogenis, fit ex his: sulphuris P. I. *. resinæ terebinthinæ, nitri spumæ, & ex scilla partis interioris, plumbi eloti, singulorum P. II. *. thuris fuliginis P. VIII. *. ficus aridæ quam pinguiissimæ,
25 sevi taurini, singulorum P. VIII. *. ceræ P. XII. *. iridis Macedonicæ P. VI. *. sesami fricti acetabulum. maximeque nervis & articulis malagma hoc convenit,

30 28. *Malagma Euthylei ad articulos, & ad omnem dolorem.*

Euthylei quod est, & ad articulos, & ad omnem dolorem, & ad vesicæ, & ad recenticicatrice contractos articulos, quas ἀγκύλας
Græci nominant, conveniens, habet tu-

liginis thuris acetabulum, resinæ tantundem, galbani sine furculis fescunciam, ammoniaci, bdellii, singulorum p. *. ceræ p. *. semis. Aliud item fit, quod habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum 5 p. xiv. *. resinæ liquidæ p. vi. *. ceræ p. xvi. *.

29. *Malagma Sofagoræ ad dolores articulorum.*

Ad dolores articulorum Sofagoræ: plumbi combusti, papaveris lachrymæ, corticis 100 hyoscyami, styracis, peucedani, sevi, resinæ, ceræ par pondus.

30 *Chryssippi Malagma, ad idem valens.*

Est & Chryssippi: resinæ liquidæ, sandarachæ, piperis, singulorum p. xii. *. quibus 15 ceræ paululum adjicitur.

31. *Ctesiphontis Malagma ad idem valens, & ad parotidas, & phymata, & strumam.*

Ctesiphontis: ceræ Creticæ, resinæ terebinthinæ, nitri quam ruberrimi, singulorum 20 p. *. semis, olei cyathi tres. Sed id nitrum ante per triduum, instillata aqua, teritur, & cum sextario ejus incoquitur, donec omnis humor consumatur. Prodest vero ea compositio etiam ad parotidas, phymata, 25 strumam, omnemque coitum humoris emolliendum.

32. *Malagma ad articulos.*

Ad articulos, fici quoque aridæ partem nepetæ mistam; vel uvam taminiam sine seminibus cum pulegio recte aliquis imponit. 30

33. *Malagma Aristonis, adversus podagras & recentia phymata, & omnes dolores.*

Eadem podagræ præsidio sunt. Sed ad
cam

cam fit Aristonis quoque, quod habet nardi, cinnamomi, cassiæ, chamæleontis, junci rotundi, singulorum p. viii. *. sevi caprini ex irino liquati p. xx. *. iridis p. i. *. quæ in aceto quam acerrimo jacere per xx. dies debet. Idem autem etiam recen- tia phymata doloresque omnes discutit.

34. *Theoxeni Malagma ad pedum dolores.*

At Theoxenus ad pedum dolores, sevi à renibus partem tertiam, salis partes duas miscebat, hisque membranulam illitam imponebat; tum superinjiebat ammoniacum thymiana in aceto liquatum.

35. *Numenii Malagma ad podagram, cæte- rosque articulos induratos.*

At Numenius podagram, cæterosque articulos induratos hoc mollebat: abrotoni, rosæ aridæ, papaveris lachrymæ, singulorum p. iii. *. resinæ terebinthinæ p. iv. *. thuris, spumæ nitri, singulorum p. viii. *. iridis, aristolochiæ, singulorum p. xii. *. ceræ p. iii. *. quibus adjicitur cedriæ cyathus unus, olei laurini cyathi tres, olei acerbi sextarius.

36. *Dexii Malagma, si quando callus in articulis increvit.*

Si quando autem in articulis callus increvit, Dexius docuit imponere, calcis p. iv. *. cerussæ p. viii. *. resinæ pineæ p. xx. *. piperis grana xxx. ceræ p. ii. *. Quibus, dum contunduntur, hemina vini lenis instillatur.

C A P. XIX.

De Emplastris. 2

EX emplastris autem nulla majorem
Eusum præstant, quam quæ cruentis
protinus vulneribus injiciuntur. *ἔναι-
μα* Græci vocant. Hæc enim reprimunt in-
flammationem, nisi magna vis eam cogit; at-
que tum illius quoque impetum minuunt,
& glutinant vulnera, quæ id non patiuntur,
& cicatricem iisdem inducunt. Constant
autem ex medicamentis non pinguibus,
ideoque *ἀλίπανα* à Græcis nominantur.

I. *Barbarum Emplastrum nigrum, quod cruentis protinus vulneribus injicitur.*

Optimum ex his est, quod Barbarum ^b no-
minatur. Habet enim æruginis rasæ p. xii.
*. spumæ argenti p. xx. *. aluminis, picis
aridæ, resinæ pineæ aridæ, singulorum p. i.
*. quibus adjiciuntur olei & aceti singulæ
heminae.

2. *Choacon Emplastrum nigrum, ad idem valens.*

Alterum ad idem, quod Choacon vocant, habet spumæ argenti p. x. *. resinæ aridæ tantundem. sed spuma prius ex tribus olei 24 heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est. qui fere talis fit, ex pice atque resina: ut ex bitumine nigerrimus; ex ærugine, aut æris squama, viridis; ex minio ruber; ex cerussa, albus. 300

3. *Basilicon Emplastrum nigrum ad idem.* c

Pauca admodum compositiones sunt,
 in quibus aliquid mixturæ varietas novat.
 Ergo id quoque nigrum est, quod βασιλι-
 κόν

a P. Ægineta VII, 17. b Scribon. Larg. c. LXXVII.
c. 207. c Oribas. Synopf. III.

κόν nominatur. Habet opopanax p. i. *. galbani p. ii. *. picis, & resinæ singulorum p. x. olei dimidium cyathum.

4. *Smaragdinum Emplastrum ad idem.*

At, quod perviride est, Smaragdinum appellatur. in quo sunt resinæ pineæ p. iii. *. ceræ p. i. *. æruginis, p. *. semis, thuris pollinis p. ii. *. olei tantundem, & aceti, quo pollen & ærugo in unum cogantur.

5. *Emplastrum rufum ad idem.* d

Est etiam coloris fere ruffi, quod celeriter ad cicatricem vulnera perducere videtur. Habet thuris p. i. *. resinæ p. ii. *. squamæ æris p. iii. *. spumæ argenti p. xx. *. ceræ p. c. *. olei heminam.

6. *Παρακολλητικὸν Emplastrum ad idem.*

Præterea est, quod παρακολλητικὸν à glutinando vocant. Constat ex his: bituminis, aluminis scissilis p. iv. *. spumæ argenti p. iv. *. & olei veteris hemina.

7. *Cephalicum Emplastrum Philotæ, capiti conveniens.*

Præterea sunt quædam generis ejusdem, quæ, quia capitibus fractis maxime conveniunt, κεφαλικά à Græcis nominantur. Philotæ compositio habet terræ Eretriæ, chalcitidis, singulorum p. iv. *. myrrhæ, æris combusti, singulorum p. x. *. ichthyocollæ p. vi. *. æruginis rasæ, aluminis rotundi, misyos crudi, aristolochiæ, singulorum p. viii. *. squamæ æris p. xx. thuris masculi p. ii. *. ceræ p. i. rosæ, & olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur.

R 3

8. *Em-*

8. *Emplastrum viride ad idem valens.*

Aliud ad idem viride. Habet æris combusti, squamæ æris, myrrhæ, ichthyocolle, singulorum p. vi. *. misyos crudi, æruginis rasæ, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulorum p. viii. *. ceræ p. vi. olei heminam, aceti quod satis sit.

9. *Tetrpharmacum Emplastrum, ad pus movendum. c*

Puri autem movendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est, & † *τετραφάρμακον* à Græcis nominatur. Habet parēs portiones ceræ, picis, resinæ, sevi taurini; si id non est, vitulini.

10. *Enneapharmacum Emplastrum ad pus movendum, & ad purgandum valens.*

Alterum ad idem, † *ἐννεαφάρμακον* nominatur; quod magis purgat. Constat ex novem rebus, cera, melle, sevo, resina, myrrha, rosa, medulla vel cervina vel vitulina vel bubula, œsypo, butyro. Quorum quoque pondera paria miscentur.

11. *Emplastra, quibus utriusque rei facultas est.*

Sunt autem quædam emplastra quibus utriusque rei facultas est. quæ, nisi singula habenda sit, meliora sunt; alias deteriora, nec, nisi cum utraque opus est, aut in singulis singulorum inopia, utenda veniunt: sed in copia rejicienda sunt; his potius adhibitis, quæ id proprie, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam.

Attalum Emplastrum ad vulnera.

Est igitur ad vulnera Attalum: quod habet

c Scribon. Larg. cap. LXXXI. c. 211. † Casaub. ad Spartiani Adrianum, c. 21. pag. 192 † Casaub. ad Spartian. Adrian. c. 21. pag. 192. 232.

bet squamæ æris p.vi.*. thuris fuliginis p.
xv.*. ammoniaci tantundem, resinæ tere-
binthinæ liquidæ p.xxv.*. sevi taurini tan-
tundem, aceti heminas tres, olei sextarium.

5 *Judæi Emplastrum, fracto capiti
accommodatum.*

At inter ea, quæ fracto capiti accom-
modantur, habent quidam id, quod ad au-
thorem Judæum refertur. Constat ex his:
10 salis p.iv.* squamæ æris rubri, æris com-
busti, singulorum p.xii.*. ammoniaci thy-
miamatis, thuris fuliginis, resinæ aridæ,
singulorum p.vi.*. resinæ Colophonix, ce-
ræ, sevi vitulini curati, singulorum p.xx.
15 *. additur aceti sesquicyathus. olei minus 271, 8.
cyatho †. Quæ *τελεγγεδωδία* Græci appel-
lant, nos curata vocamus; cum ex sevo pu-
ta omnes membranulæ diligenter exemptæ
sunt, aut ex alio medicamento.

20 12. *Emplastra ἐπισπαστικά. g*

Sunt etiam quædam emplastra nobilia ad
extrahendum. quæ ipsa quoque *ἐπισπαστικά*
nominantur. Quale est, quod, quia lauri
baccas habet, *Ἀλγὸς δαφνίδων* appellatur. In eo
25 est, resinæ terebinthinæ p.x.*. nitri, ceræ,
picis aridæ, baccarum lauri, singulorum
p.xx.*. olei paululum. Quoties autem bac-
cam, aut nucem, aut simile aliquid posue-
ro, scire oportebit, antequam expendatur,
30 ei summam pelliculam esse demendam.

13. *Aliud Ἀλγὸς δαφνίδων, ad extrahendum,
& pus movendum.*

Aliud eodem nomine, quod puri quo-
que movendo est. Sevi vitulini, ammo-

R 4

niaci

f Aëtius Tetrab. IV. Serm. III, 14. † Rhodius
de Ponderib. & Mensur. p. 35. g Scribon. Larg.
c. LXXXVI.

niaci trymiamatis, picis, ceræ, nitri, bac-
carum lauri, resinæ aridæ, aristolochiæ,
pyrethri, pares portiones.

14. *Philocratis Emplastrum, ad extrahendum,
& pus movendum.*

Præter hæc, est Philocratis: quod habet
salis ammoniaci p. vii. *. aristolochiæ p.
viii. *. ceræ, resinæ terebinthinæ, fuli-
ginis thuris, singulorum p. xv. *. spumæ
argenti p. xxxii. *. Quibus, ut pus quoque
moveant, iridis p. iii. *. galbani p. vi. *.
adjiciuntur.

15. *Πυτῶδες Emplastrum, ad extrahendum.*

Optimum tamen ad extrahendum est
id quod à similitudine fordium πυτῶδες 15
Græci appellant. Habet myrrhæ, croci,
iridis, propolis, bdellii, capitulorum pu-
nici mali, aluminis scissilis & rotundi, mi-
syos, chalcitidis, atramenti sutorii cocti,
opopanacis, salis ammoniaci, visci, singu- 20
lorum p. iv. *. aristolochiæ p. viii. *. squa-
mæ æris p. xvi. *. resinæ terebinthinæ p.
lxxv. *. ceræ, & sevi vel taurini vel hirci-
ni singulorum p. c. *.

16. *Emplastrum Hecatæi, ad extrahendum.* 25

Hecatæo quoque authore emplastrum
generis ejusdem fit ex his: galbani p. ii. *.
fuliginis thuris p. iv. *. picis p. vi. *. ceræ,
& resinæ terebinthinæ, singulorum p.
viii. *. quibus paulum irini unguenti 30
miscetur.

17. *Alexandrinum Emplastrum viride, ad
extrahendum.*

Valensque ad idem emplastrum viride
Ale-

Alexandrinum est. Habet aluminis scif-
 filis p. viii. *. salis ammoniaci, p. vii. *.
 squamæ æris p. xvi. *. myrrhæ, thuris sin-
 gulorum p. xviii. *. ceræ p. cl. *. resinæ
 5 Colophonix aut pineæ p. cxc. *, olei hemi-
 nam, aceti sextarium.

18. *De Emplastris exedentibus.*

Quædam autem sunt emplastra exeden-
 tia, quæ *σνττινα* Græci vocant, quale est id,
 10 quod habet resinæ terebinthinæ, fuliginis
 thuris, singulorum p. ii. *. squamæ æris
 p. i. *. ladani p. ii. *. aluminis tantundem,
 spumæ argenti p. iv. *.

19. *Emplastrum, quod exest corpus, ossa resolvit,*
 15 *& supercrescentem carnem coerces.*

Exest etiam vehementer corpus, atque
 ossa quoque resolvit, & supercrescentem
 carnem coerces id, quod habet spumæ ar-
 genti, squamæ æris, uncias singulas; nitri
 20 ignem non experti, lapidis Alii, aristolo-
 chix p. sextantes †, ceræ, resinæ terebinthi-
 næ, thuris, olei veteris, atramenti sutorii,
 salis ammoniaci p. semis, æruginis rasæ p.
 ‡ bessem, aceti scillitici heminam, vini ami-
 25 nxi tantundem.

20. *Emplastra adversus morsus, & alia*
recentiora vulnera.

Emplastrum Diogenis nigrum.

Sunt etiam adversus morsus quædam ac-
 commodata; quale est Diogenis nigrum:
 30 quod habet bituminis, ceræ, resinæ pineæ
 aridæ, singulorum p. xx. *. spumæ argenti
 p. c. *. olei § sextarium. Aut in quo sunt squa-
 mæ æris p. iv. *. cerussæ, & æruginis rasæ

R 5

fin-

† I. Rhodius de Ponderib. p. 13. ‡ I. Rhodius de
 Ponderib. p. 11, 12. § I. Rhodius de Ponderib. p. 27.

singulorum p. VIII. *. ammoniaci p. XII. *. ceræ, resinæ pineæ, singulorum p. XXV. *. spumæ argenti p. c. *. olei sextarium, Aut in quo sunt squamæ æris p. XIV. *. galbani p. VI. *. cerussæ, & æruginis rasæ, singulorum p. VIII. *. ammoniaci p. XII. ceræ, resinæ pineæ singulorum p. LV. *. ex quibus spuma argenti concoquitur.

21. *Ephesium Emplastrum rubrum, ad idem valens.*

Rubrum quoque emplastrum, quod Ephesium vocatur, huc aptum est. Habet resinæ terebinthinæ p. II. *. galbani p. IV. *. minii sinopici p. VI. *. thuris fuliginis p. VI. *. ceræ p. VIII. *. spumæ argenti p. LVI. *. olei veteris heminam.

22. *Aliud Emplastrum, ad idem valens.*

Item id, quod ex his constat; squamæ æris, thuris fuliginis, singulorum p. IV. *. galbani p. VI. *. salis ammoniaci p. XII. z. *. ceræ p. XXV. *. olei tribus heminis. Hæc autem aliis quoque recentioribus vulneribus recte imponuntur.

23. *Λευκά Emplastra non gravibus vulneribus accommodata, & maxime senilibus.*

Sunt etiam alba lenia, λευκά Græci vocant, fere non gravibus vulneribus accommodata, præcipueque senilibus. Quale est quod habet cerussæ p. LII. *. sevi vitulini curati, & ceræ, singulorum p. LVIII. *. olei heminas tres, ex quibus ea cerussa coquitur

24. *Elephantinum Emplastrum.*^a

Aliud, quod habet cerussæ p. XX. *. ceræ p. LV. *.

^a Oribas. Synops. l. III.

p. LV. *. olei heminam, aquæ sextarium.
 Quæ quoties adjiciuntur cerussæ vel spumæ
 argenti, scire licet, illa ex his coquenda
 esse. Est autem ea percandida compositio,
 5 quæ supra posita est, ideoque elephantina
 nominatur.

25. *Lenia Emplastrum.*

Lenia quoque quædam emplastra sunt,
 10 quæ βλιταρῶν fere Græci nominant; ut id
 quod habet minii p. IV. *. spumæ argenti
 p. XXV. *. ceræ, & adipis suillæ singulorum
 p. XXXV. *. vitellos ovorum quatuor.

26. *Emplastrum lene.*

Alia compositio generis ejusdem: ceræ,
 15 resinæ terebinthinæ, singulorum p. V. *. ce-
 russæ p. VII. *. spumæ argenti, plumbi re-
 trimenti, (σκαρίαν μολύβδου Græci vocant) 247, 34.
 singulorum p. X. *. cicini olei, & myrtei,
 singulorum heminæ tertia.

27. *Archagathi Emplastrum lene.*

Alia, quæ ad authorem Archagathum
 refertur: misyos cocti, æris combusti, sin-
 gulorum p. IV. *, cerussæ coctæ p. VIII. *.
 resinæ terebinthinæ p. X. *. spumæ argenti
 25 p. VI. *.

21. *Emplastra ejusdem generis, ad leniendum apta.*

Etiamnum generis ejusdem: spumæ ar-
 genti, ceræ, adipis suillæ, singulorum p.
 XXVII. *. vitelli cocti, rosæ hemina. Aut
 30 compositio hæc: cerati ex oleo myrteo facti
 partes tres, adipis suillæ pars quarta, pau-
 lulum ex plumbi retrimento. Aut hæc com-
 positio: spumæ argenti + selibra, ex olei
 hemina, & aquæ marinæ altera, cocta do-
 nec

nec bullire defierit, cui paulum ceræ sit adjectum. Aut hæc: pares portiones ceræ, fevi, stibii, spumæ argenti, cerussæ.

CAP. XX.

De Pastillis.

Et primo de his, qui ad recentia vulnera glutinanda, sanandaque apti sunt.

PASTILLI quoque facultates diversas habent. Sunt enim ad recentia vulnera glutinanda sanandaque apti. Qualis est, qui habet chalcitidis, misyos, spumæ nitri, floris æris, gallæ, aluminis scissilis modice cocti, singulorum p. i. *. æris combusti, capitulorum mali punici, singulorum p. iii. *. Hunc oportet diluere aceto, ac sic, ubi vulnus glutinandum est, illinere. At, si nervosus aut musculosus is locus est, commodius est cerato miscere, sic ut illius octo partes, nona hujus sit.

1. *Alius Pastillus ad glutinanda vulnera.*

Alius ad idem. Constat ex his: bituminis, aluminis scissilis, singulorum, p. i. *. æris combusti p. iv. *. spumæ argenti p. xi. *. olei sextario.

2. *De Sphragide Pastillo, quem Polyidas confecit ad glutinandum vulnus.*

Sed longe Polyidæ d celeberrimus est: σφραγίς autem nominatur. Qui habet aluminis scissilis p. iv. *. atramenti sutorii p. ii. *. myrrhæ p. v. *. aloes tantundem, capitulorum punici mali, fellis taurini, singulorum p. vi. *. quæ contrita vino austero excipiuntur.

3. *Pastil-*

3. *Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, & in obscœnis partibus, inflammationesque eorum.*

Ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, obscœnis partibus, inflammationesque eorum : chrysocollæ p. i. *. atramenti futorii, aluminis sciſſilis, singulorum p. ii. *. halicacabi corticis p. iv. *. minii p. vi. *. spumæ argenti p. xii. *. cerussæ p. xvi. *. quæ ex aceto coguntur, & ubi utendum est, diluuntur.

4. *Pastillus Andronis ad uvam inflamatam, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia.*

Andronis e vero est ad uvam inflamatam, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia : gallæ, atramenti futorii, myrrhæ, singulorum p. i. *. aristolochiæ, aluminis sciſſilis, singulorum p. ii. *. capitulorum punici mali p. xxv. *. ex passo coactorum & cum usus exigit, aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut levius vitium est, cui medendum est.

5. *Pastillus ad fissa ani, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancerum.*

Proprie autem ad ani fissa, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancerum valet : æruginis p. ii. *. myrrhæ p. iv. *. gummi p. vii. *. thuris p. xii. *. stibii, lacrymæ papaveris, acaciæ, singulorum p. xvi. quæ ex vino & teruntur, & in ipso usu deliquantur.

6. *Pastillus ad expellendum calculum ex vesica.*

Expellere autem ex vesica cum urina calculum videtur hæc compositio : cassiæ, croci,

croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis, balsami, hyperici pares portiones conteruntur; deinde vinum lene instillatur, & pastilli fiunt, qui singuli habeant p. i. *. hique singuli quotidie mane jejuno dantur.

C A P. XXI.

De Pessis.

HÆc tria compositionum genera, id est, quæ in malagmatis, emplastris pastillisque sunt, maximum præcipueque varium usum præstant. Sed alia quoque utilia sunt: ut ea quæ foeminis subjiciunt. *πισσα*, Græci vocant. Eorum hæc proprietas est: medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaque lana naturalibus conditur.

1. *Ad sanguinem evocandum.*

Ad sanguinem autem evocandum, caulis duabus adjicitur nitri p. i. *. aut allii semen conteritur, adjicitur myrrhæ paululum, & unguento fusino miscetur. Aut cucumeris sylvestris pars interior ex lacte muliebri diluitur.

2. *Ad vulvam molliendam.*

Ad vulvam molliendam, ovi vitellus, & foenum Græcum, & rosa, & crocum temperantur. Aut elaterii p. iiii. *. falis tantundem, uvæ taminiae p. vi. *. melle excipiuntur.

3. *Alia Pessi compositio, ad idem valens.*

Aliud Boetho a autore: quod habet croci, resinæ terebinthinæ, singulorum p. iv. *. myr-

myrrhæ p. iiii. *. rosæ p. i. *. sevi vitulini p. iiii. ceræ p. ii. *. miscentur.

4. *Ad inflammationes vulvæ Numenii Pessus.*

Optima autem adversus inflammationes vulvæ Numenii compositio est, quæ habet croci p. iiii. *. ceræ p. i. *. butyri p. viiii. *. adipis anserinæ p. xii. *. vitellos coctos duos, rosæ minus cyatho.

263, 15.

5. *Adejiciendum è vulva infantem mortuum.*

10 Si vero infans intus decessit, quo facilius ejiciatur, malicorium ex aqua terendum, eoque utendum est.

6. *Si mulier vitio locorum concidit, quæ curatione utendum sit.*

15 Si concidere vitio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis comburendæ, contendæque, deinde his mel adjiciendum.

7. *Si mulier non comprehendit.*

Si non comprehendit, adeps leonina ex
20 rosâ mollienda est.

C A P. XXII.

De Medicamentis, quibus aridis utimur,

1. *Ad carnem supercrescentem exedendam.*

25 **Q**UÆDAM misturæ medicamentorum sunt, quibus aridis neque coactis utimur sic, ut inspergamus; aut cum aliquo liquido mixta illinamus: quale est, ad carnem supercrescentem exedendam, quod habet squamæ æris, fuliginis thuris, fin-
30 gulorum p. i. *. æruginis p. ii. *. Hæc autem eadem cum melle purgant ulcera; & cum cera, implent. Misy quoque & galla, si paribus portionibus misceantur, corpus consumunt: eaque vel arida in-
sper-

spargere licet, vel excepta cadmia illinire.

2. *Ad putrem carnem continendam, ne ultra serpat, eamque leniter exedendam, plures compositiones.*

Putrem vero carnem continet, neque ultra serpere patitur, & leniter exest, mel vel cum lenticula, vel cum marrubio, vel cum oleæ foliis, ante ex vino decoctis. Item fertula campana in mulso cocta, deinde contrita. Aut calx cum cerato. Aut amaræ nuces cum allio, sic ut hujus pars tertia sit, paululumque his croci adjiciatur. Aut quod habet spumæ argenti p. vi. *. cornu bubuli combusti p. xii. *. olei myrtei, & vini cyathos ternos. Aut quod ex his constat : floris punici mali, atramenti futorii, aloes, singulorum p. ii. *. aluminis scissilis, thuris, singulorum p. iv. *. gallæ p. viii. *. aristolochiæ p. x. *. Vehementius idem facit, etiam adurendo, auripigmentum cum chalcitide, & aut nitro, aut calce, aut charta combusta. Item sal cum aceto. Vel ea compositio, quæ habet chalcitidis, capitulorum mali punici, aloes, singulorum p. ii. *. aluminis scissilis, thuris, singulorum p. iv. *. gallæ p. viii. *. aristolochiæ. p. x. *. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Vel cantharidum, sulphuris, singulorum p. i. *. lolii p. iii. *. quibus adjicitur picis liquidæ quantum satis est ad jungendum. Vel chalcitis quoque cum resina & ruta mixta : aut cum eadem resina diphryges : aut uva taminia cum pice liquida. Idem vero possunt & feces vini combustæ, & calcis & nitri pares

pares portiones. Vel aluminis scissilis p. i. thuris, sandarachæ, nitri, singulorum p. i. *. gallæ. p. viii. *. aristolochiæ p. x. *. mel-
lis quantum satis est.

5 3. *Hera compositio.* a

Est etiam Heræ compositio, quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorum, p. ii. *. aloes, thuris, aluminis scissilis, singulorum p. iv. *. aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum p. viii. *. malicorii contriti p. xx. *.

4. *Judæi compositio.*

Est & Judæi: in qua sunt calcis partes duæ, nitri quam ruberrimi pars tertia: quæ urina impuberis pueri coguntur, donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

5. *Jolla compositio.*

At Jollas, chartæ combustæ, sandarachæ, singulorum p. i. *. calcis p. ii. p. auripigmenti tantundem miscebat.

6. *Ad sanguinis profluvia vel ex membrana cerebri, vel aliis locis; & ad Cancrum, & ad inducendam cicatricem, & ad coercendam carnem increfcentem.*

Si vero ex membrana, quæ super cerebrum est, profluit sanguis, vitellus combustus & contritus inspergi debet. Si ex alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamæ æris, singulorum p. i. *. sandarachæ p. ii. *. marmoris cocti p. iv. *. inspergi debent. Eadem cancro quoque obfistunt. Ad inducendam cicatricem, squamæ æris, thuris fuliginis, singulorum
S p. ii. *.

p. II. *. calcis p. IV. p. Eadem incrementem quoque carnem coercent.

7. *Timæi compositio ad ignem sacrum vel cancrum.*

Timæus autem ad ignem sacrum, & ad cancrum his utebatur : myrrhæ p. II. *. thuris, atramenti futorii, singulorum p. III. *. sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, singulorum p. IV. *. gallæ p. VI. *. cerussæ combustæ p. VIII. *. Eadem vel arida inspersa, vel melle excepta idem præstant.

8. *Ad sternutamenta excitanda.*

Sternutamenta vero & albo veratro, vel struthio coniecto in nares excitantur. vel his mistis : piperis, veratri albi, singulorum p. *. III. castorei p. I. *. spumæ nitri p. II. *. struthii p. III. *.

9. *Gargarizationes quibus fieri debeant.*

Gargarizationes autem aut lævandi causa fiunt, aut reprimendi, aut evocandi. Lævant, lac, cremor vel ptisanæ, vel furfurum. Reprimit autem aqua, in qua vel lenticula, vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmulæ decoctæ sunt. Evocant, finapi, piper.

C A P. XXIII.

De Antidotis,

& quibus malis opitulentur.

ANTIDOTA raro, sed præcipue interdum necessaria sunt, quia gravissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum, late-

laterum, faucium, interiorumque partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt adversus venena, vel per morsus, vel per cibos, aut potiones nostris corporibus inserta.

5 I. *Compositio antidoti.*

Unum est, quod habet lacrymæ papaveris p. *. z. acori, malabathri p. v. *. iridis Illyricæ, gummi, singulorum p. ii. *. anisi p. iii. *. nardi Gallici, foliorum rosæ
 10 aridorum, cardamomi, singulorum p. iv. *. petroselini p. *. iii. z. trifolii p. v. *. cassiæ nigræ, filis, bdellii, carpobalsami, seminis papaveris albi, singulorum p. *. z. styra-
 15 Syri, thuris masculi, hypocistidis succi, singulorum p. vi. *. castorei p. vi. *. costi, piperis albi, galbani, resinæ terebinthinæ, croci, floris junci rotundi, singulorum p. vi. *. z. dulcis radicis p. viii. *. z. quæ
 20 melle vel passo excipiuntur.

2. *Aliud antidotum, a Ambrosia nominatum; quod Zopyrus Ptolemæo regi composuit.*

Alterum, quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse, atque Ambrosiam
 25 nominasse, ex his constat: costi, thuris masculi, singulorum p. v. *. piperis albi p. *. z. floris junci rotundi p. ii. *. cinamomi p. iii. *. cassiæ nigræ p. iv. *. croci Cilicii p. *. iv. z. myrrhæ, quam stacten nominant,
 30 p. v. *. nardi Indici p. *. v. z. quæ singula contrita melle cocto excipiuntur: deinde, ubi utendum est, id, quod b Ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione vini diluitur.

S 2

3. *An-*

a Ambrosiæ Junii Crispi meminit Marcellus de Medic. cap. XXIII. p. 345. b Rhodius de Ponderib. p. 25.

3. *Antidotum Mithridatis.* c

Nobilissimum autem est Mithridatis. quod quotidie sumendo rex ille dicitur adversus venenorum pericula tutum corpus suum reddidisse. In quo hæc sunt: costi p. *. z. acori p. v. *. hyperici, cumini, sagapeni, acaciæ succi, iridis Illyricæ, cardamomi, singulorum p. ii. *. anisi p. iii. *. nardi Gallici, gentianæ radices, aridorum rosæ foliorum, singulorum p. iv. *. papaveris lachrymæ, petroselini, singulorum p. *. iv. z. cassiæ, fileris, lolii, piperis longi, singulorum p. vi. *. styracis p. *. v. z. castorei, thuris, hypocistidis succi, myrrhæ, opopanax, singulorum p. vi. *. malabathri folii p. vi. *. floris junci rotundi, resinæ terebinthinæ, galbani, dauci Cretici seminis, singulorum p. *. v. z. nardi, opobalsami, singulorum p. *. vi. z. thlaspis p. *. vi. radices Ponticæ p. vii. *. croci, zinziberis, cinnamomi, singulorum p. *. viii. Hæc contrita melle excipiuntur, & adversus venenum, quod magnitudinem nucis Græcæ impleat, ex vino datur. In cæteris autem affectibus corporis pro modo eorum vel quod d. Ægyptiæ fabæ vel ervi magnitudinem impleat, satis est.

C A P. XXIV.

D *Acopis.* a.1. *Acopum nervis utile.*

A C O P A quoque utilia nervis sunt. Quale est, quod habet floris junci rotundi p. *. ii. zz. costi, junci quadrati,

c Plin. H. N. XXIII, 18. d I. Rhodius de Ponderib. p. 26. a Scribon. Larg. cap. CLIV. c. 26.

drati, lauri baccarum, ammoniaci, cardamomi, singulorum p. *. iv. z. myrrhæ, æris combusti, singulorum p. vii. *. iridis Illyricæ, ceræ, singulorum p. iv. *. Alexandrini calami, junci rotundi, aspalathi, xylobalsami, singulorum p. xviii. *. fevi. p. i. *. unguenti irini cyathum.

2. *Acopum Elodes nervis utile.*

Alterum, quod ἐλαιώδες vocant, hoc modo fit: ceræ p. *. z. olei tantundem, resinæ terebinthinæ ad nucis juglandis magnitudinem; simul incoquantur: deinde infusa in mortario teruntur, instillaturque subinde quam optimi mellis acetabulum, tum irini unguenti, & rosæ terni cyathi.

3. *Ε'γχεῖσα ad ulcera purganda & implenda.*

Ε'γχεῖσα autem Græci vocant liquida, quæ illinuntur. Quale est, quod fit ad ulcera purganda & implenda, maxime inter nervos, paribus portionibus inter se mixtis, butyri, medullæ vitulinæ, fevi vitulini, adipis anserinæ, ceræ, mellis, resinæ terebinthinæ, rosæ, olei cicini. Quæ separatim omnia liquantur, deinde liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis vero emollit, si pro rosa cyprus infunditur.

4. *Ad sacrum ignem.*

Ad sacrum ignem: spumæ argenti p. vi. *. cornu bubuli combusti p. ii. *. conteruntur, adjiciturque invicem vinum, & id, quod specialiter b sic vocatur, & myrteum, donec utriusque terni cyathi conficiantur.

b Omnes edit. Sil. cujus meminit Plin. H. N. XXXIII, 13. Plura loca congestit Rhodius ad Scribon. Larg. cap. XXX. c. 126. & in Lexico.

CAP. XXV.

De Catapotiiis.

1. *Catapotium ad somnum accersendum, & levationem doloris, & simul ad coquendum.* 5

CATAPOTIA quoque multa sunt, variisque de causis fiunt. *Αναδύνα* vocant, quæ somno dolorem levant. Quibus uti, nisi nimia necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis, & stomacho alienis. Prodest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaveris lachrymæ, galbani, singulorum p. i. *. myrrhæ, castorei, piperis, singulorum p. ii. Ex quibus, quod ervi magnitudinem habet, satis est devorasse. 10 15

2. *Catapotium valentius ad somnum.*

Alterum, stomacho pejus, ad somnum valentius, ex his fit: mandragoræ p. *. z. apii feminis, item hyoscyami feminis, singulorum p. iv. *. quæ ex vino teruntur. Unum autem ejusdem magnitudinis, quæ supra posita est, abunde est sumpsisse. 20

3. *Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.* 25

Sive autem capitis dolores, sive ulcera, sive lippitudo, sive dentes, sive spiritus difficultas, sive intestinorum tormenta, sive inflammatio vulvæ, sive coxæ est, sive jecur, aut lienis, aut latus torquet, sive vitio locorum aliqua prolabitur & obmutescit, occurrit dolori per quietem ejusmodi catapotium. Silis, acori, rutæ silvestris feminis, singulorum p. ii. *. castorei, cinamomi, 30
fin-

singulorum p. ii. *. papaveris lachrymæ, panacis radicis, mandragoræ malorum aridorum, junci rotundi floris, singulorum p. ii. *. piperis grana lvi. Hæc per se contrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut devoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

4. *Catapotium aliud ad multa valens.*

10 Quinetiam silvestris papaveris, cum jam ad excipiendam lachrymam maturum est, manipulus, qui manu comprehendi potest, in vas demittitur, & superinfunditur aqua, quæ id contegat, atque ita coquitur. Ubi
15 jam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus projiciatur; & cum eo humore passum pari mensura misceatur, inferveatque, donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapotia ex eo fiunt, ad nostræ
20 † fabæ magnitudinem, habentque usum multiplicem. Nam & somnum faciunt, vel per se assumpta, vel ex aqua data: & aurium dolores levant, adjectis exiguo modo rutæ succo, ac passo: & tormina supprimunt ex
25 vino liquata: & inflammationem vulvæ coercent, mista cerato ex rosâ facto, cum paululum his croci quoque accessit: & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

30 5. *Catapotium ad inducendum somnum, quem vulva dolens prohibuit.*

Item, si vulva dolens somnum prohibet, croci p. ii. *. anisi, myrrhæ, singulorum p. i. *. papaveris lacrymæ p. iv. *. cicutæ

feminis p. viii. *. miscentur, excipiunturque vino veteri & quod lupini magnitudinem habet, in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

6. *Ad jecur sanandum.*

Ad sanandum jecur, nitri p. *. z. croci, myrrhæ, nardi Gallici, singulorum p. i. *. melle excipiuntur, daturque, quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

7. *Ad finiendos dolores lateris.*

Ad lateris dolores finiendos piperis, aristolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

8. *Ad thoracis dolores finiendos.*

Ad thoracis, nardi p. i. *. thuris, cassiæ, singulorum p. iiii. *. myrrhæ, cinnamomi, singulorum p. vi. *. croci p. viii. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis hemina tres.

9. *Catapotium Athenionis ad tussim.*

Ad tussim, Athenionis: myrrhæ, piperis, singulorum p. i. *. castorei, papaveris lachrymæ, singulorum p. i. *. Quæ separatim contusa postea junguntur, & ad magnitudinem fabæ nostræ, bina catapotia mane, bina noctu dormituro dantur.

10. *Catapotium Heraclidis Tarentini*

ad tussim & somnum.

At, si tussis somnum prohibet, ad utrumque Heraclidis Tarentini: croci p. i. *. cinnamomi, castorei, papaveris lachrymæ, singulorum p. i. *. myrrhæ, piperis longi, costi, galbani, singulorum p. *. z.

11. *Catapotium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.*

Quod si purganda sunt ulcera in faucibus

bus tussientibus : panacis , myrrhæ , resinæ terebinthinæ , singulorum p. v. *. galbani p. *. z. hyssopi p. *. z. conterenda sunt , hisque hemina mellis adjicienda , & quod digito excipi potest , devorandum est.

12. *Colice Cassii medici.*

Colice vero Cassii ex his constat : a croci , 224. i. anisi , castorei , singulorum p. 111. *. petroselinii p. iv. *. piperis & longi , & rotundi , singulorum p. v. *. papaveris lacrymæ , junci rotundi , myrrhæ , nardi , singulorum p. vi. *. quæ melle excipiuntur. Id autem & devorari potest , & ex aqua calida sumi.

13. *Ad infantem mortuum aut secundas expellendas.*

Infantem vero mortuum , aut secundas expellit aquæ potio , cui salis ammoniaci p. i. *. aut cui dictami Cretici p. i. *. adjectum est.

14. *Laborantibus ex partu quid dari debeat.*

Ex partu laborantibus , erysimum ex vino tepido jejunis dari debet.

15. *Ad adjuvandum vocem.*

Vocem adjuvat , thuris p. i. *. in duobus cyathis vini datum.

16. *Adversus difficultatem urinæ.*

Adversus urinæ difficultatem : piperis longi , castorei , myrrhæ , galbani , papaveris lacrymæ , croci , costi , uncia singulæ , styracis , resinæ terebinthinæ pondo sextantes , mellis apsinthii cyathus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ Ægyptiæ mane & cœnato dari debet.

17. *Arteriaces compositio quomodo fiat.*

Arteriace vero hoc modo fit : cassiæ , iridis ,

S 5

dis ,

a Forte costi uti libro IV. c. 14. sed malim ibi legere croci , ita Scribon. Larg. cap. XXIX. cujus descriptio in aliis variat.

dis, cinnamomi, nardi, myrrhæ, thuris, singulorum p. i. *. croci p. i. *. piperis † grana xxx. ex passi tribus sextariis decoquuntur, donec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhæ, thuris singulorum p. i. *. conjiciuntur in passi eundem modum, eodemque modo decoquuntur. Aut ejusdem passi heminæ tres usque eo coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat, & adjicitur tritæ cassiæ p. i. *. 5

CAP. XXVI.

De quinque generibus nostrarum corporis.

CUM facultates medicamentorum proposuerim; genera, in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus læsit, ut in vulneribus. Cum quid intra seipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increvit, ut vena, quæ intumescens in varicem convertitur. Cum quid deest, aut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ego, dilatis his, quæ præcipue scalpellum ‡ in manum postulant, nunc de his dicam, quæ maxime medicamentis egent. Dividam autem hanc quoque curandi partem, sicut priorem; & ante dicam de his, quæ in quamlibet partem corporis incidunt: tum de his, quæ certas partes infestant. Incipiam à vulneribus. 15 20 25 30

1. *De vulneribus, quæ per tela inferuntur.*

In his autem ante omnia scire medicus debet,

† p. 252. 257. ‡ aut vel ac.

debet, quæ insanabilia sint, & quæ difficilem curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim prudentis hominis, primum eum, qui servari non potest, non attingere, nec subire speciem ejus, ut occisi, quem fors ipsius interemit. Deinde, ubi gravis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis, in difficilem rem esse: ne, si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse videatur. Sed ut hæc prudenti viro conveniunt: sic rursus histrionis est, parvam rem attollere, quo plus præstitisse videatur. Obligari æquum est confessione promptæ rei, quo curiosius etiam circumspectat, ne, quod per se exiguum est, majus curantis negligentia fiat.

2. *Quæ vulnera insanabilia sint.*

d Servari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui jecinoris portæ, cui in spina & medulla percussa est; cuique aut pulmo medius, aut jejunum, aut tenuius intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt; cuive circa fauces grandes venæ, vel arteriæ præcisæ sunt.

3. *Quæ vulnera difficilem curationem habeant.*

Vix autem ad sanitatem perveniunt, quibus ulla parte aut pulmo, aut jecinoris crassum, aut membrana, quæ continet cerebrum, aut lienis, aut vulva, aut vesica, aut ullum intestinum, aut septum transversum vulneratum est. Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus usque ad grandes intusque

b Hipp. de Arte T. IV, 6. XXIII, 5, 6. Apuleius de Doctr. Platon. L. II. Cicero ad Attic. L. XVI, Ep. 15. Rittershus. ad Isidor. Pelusiot. L. II. Epist. 16. c Æginet. VI, 88. d Aph. VI, 18. Coac. Not III, 387. II. Prædict. XIX, XXII. & Exemplum vide apud Tulpium Obs. L. III. c. 27. e Aph. VI, 24. Coac. Not. III, 379, 389.

conditas venas in alis vel poplitibus mucro
desedit. Periculosa etiam vulnera sunt, ubi-
cunque venæ majores sunt, quoniam exhau-
rire hominem profusione sanguinis possunt.
Idque evenit non in alis tantum, atque po-
plitibus; sed etiam in his venis, quæ ad
anum testiculosque perveniunt. Præter hæc
malum vulnus est, quodcunque in alis vel
feminibus, vel inanibus locis, vel inter digi-
tos est. Item quodcunque musculum, aut
nervum, aut arteriam, aut membranam,
aut os, aut cartilaginem læsit.

4. *Quæ vulnera tutiorem curationem habeant.*

Tutissimum omnium, quod in carne est.
Et hæc quidem loco vel pejora, vel meliora
sunt. Modo vero periculum facit, quod-
cunque magnum est.

5. *Observationes in vulneris genere & figura.*

Aliquid etiam in vulneris genere figuraque
est. Nam pejus est, quod etiam collisum, quam
quod tantum discissum est. adeo ut acuto quo-
que, quam retuso telo, vulnerari commodius
sit. Pejus etiam vulnus est, ex quo aliquid ex-
cisum est; ex quo ve caro alia parte abscissa,
alia dependet. Pessima quæque plaga curva
est: tutissima, quæ lineæ modo recta est.
Quodeinde propius huic illive figuræ vulnus
est, eo vel deterius vel tolerabilius est.

6. *Ætatis observatio, & corporis, &
vita, & temporis.*

Quinetiam confert aliquid & ætas, &
h corpus, & vitæ propositum, & anni tem-
pus quia facilius sanescit puer vel adole-
scens, quam senior: valens, quam infirmus:
neque

f Hippoc. Coac. Not. III, 390. & I. de Morb.
III, 5. g II. Præd. XXIV, 2. Coac. Præn. III, 389.
h II. Prædict. XIX, 7.

neque nimis tenuis, neque nimis plenus,
 quam si alterum ex his est: integri habitus,
 quam corrupti: exercitatus, quam iners:
 sobrius & temperans, quam vino veneri-
 5 que deditus. Opportunissimumque curatio-
 ni tempus i vernum est; aut certe neque fer- 42, 17.
 vens, neque frigidum. siquidem vulnera &
 nimius calor & nimium frigus infestant;
 maxime tamen horum varietas: ideoque
 10 perniciosissimus autumnus est. 33, 33.

7. *Signa eorum, quæ intus læsa sunt.*

Sed pleraque ex vulneribus oculis sub-
 jecta sunt: quorundam ipsæ sedes indices
 sunt, quas alio loco demonstravimus, cum
 15 positus interiorum partium ostendimus.
 Veruntamen, quia quædam vicina sunt,
 interestque, vulnus in summa parte sit, an
 penitus penetraverit, necessarium est notas
 subjicere, per quas quid intus ictum sit, sci-
 20 re possimus; & ex quibus vel spes, vel des-
 peratio oriatur.

8. *Signa percussæ cordis. k*

Igitur, corde percussio, sanguis multus
 fertur, venæ languescunt, color pallidissi-
 25 mus, sudores frigidi, malique odoris, tan-
 quam in ægroto corpore oriuntur: extre-
 misque partibus frigidis l matura mors se-
 quitur.

9. *Signa pulmonis icti. m*

30 Pulmone icto, spirandi difficultas est: san-
 guis ex ore spurnans, ex plaga rubens, si-
 mulque etiam spiritus cum sono fertur: in
 vulnus inclinari juvat: quidam sine ratio-
 ne consurgunt. Multi si in ipsum vulnus
 incli-

inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

10. *Signa jocinioris vulnerati.*

Jocinoris autem vulnerati notæ sunt: multus sub dextra parte præcordiorum profusus sanguis: ad spinam reducta præcordia; in ventrem cubandi dulcedo; punctiones, doloresque usque ad jugulum, junctumque ei latum scapularum os, intenti. quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit.

11. *Signa percussorum renum.*

Renibus vero percussis, dolor ad inguina testiculosque descendit: difficulter urina redditur; eaque aut est cruenta, aut cruor fertur.

12. *Signa vulnerati lienis.*

At, liene iccto, sanguis niger à sinistra parte prorumpit: præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt: fitis ingens oritur: dolor ad jugulum, sicut jocinore vulnerato, venit.

13. *Signa percussæ vulvæ.*

At, cum vulva percussa est, dolor in inguinibus, & coxis, & feminibus est: sanguinis pars per vulnus, pars per naturam descendit: vomitus bilis insequitur. Quædam obmutescunt; quædam mente labuntur; quædam, sui compotes, nervorum oculorumque dolore urgeri se confitentur; morientesque eadem, quæ corde vulnerato, patiuntur.

14. *Signa percussæ cerebri, vel membranae ejus.*

Si cerebrum membranave ejus vulnus accepit,

accepit, sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit; fereque bilis n vomitus insequitur: quorundam sensus obtunduntur, appellatique ignorant: quorundam 5 trux vultus est: quorundam oculi, quasi resoluti, huc illucque moventur: fereque tertio, vel quinto die delirium accedit. Multorum etiam nervi o distenduntur. Ante mortem autem plerique fascias, quibus 10 caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori objiciunt.

15. *Signa stomachi percussi.*

Ubi stomachus autem percussus est, singultus, & bilis vomitus insequitur: si quid 15 cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito: venarum motus elanguescent: sudores tenues oriuntur; per quos extremæ partes frigescent.

20 16. *Signa jejuni intestini, & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum.* P

Communes vero jejuni intestini & ventriculi vulnerati notæ sunt. Nam cibus & potio per vulnus exeunt: præcordia indurescent: nonnunquam bilis per os redditur. 25 Intestino tantum sedes inferior est. Cætera intestina icta vel stercus †, vel odorem ejus exhibent.

17. *Signa percussa medulla, quæ in spina est.*

Medulla vero, quæ in spina est, discissa, 30 nervi resolvuntur, aut distenduntur: sensus intercidit: interposito tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt.

18. *Si-*

n Aph. VI, 50. Æginet. VI, 88. Hippoc. Coac. Not. III, 383. 384. o Ægin. VI, 90. p Æginet. VI, 88. † Valleriola Obs. L. II. obs. 9.

18. *Signa septi transversî percussî.*

At, si septum transversum percussum est, præcordia sursum contrahuntur, spina dolet, spiritus rarus est, sanguis spumans fertur.

19. *Signa vesicæ vulneratæ.*

Vesica vero vulnerata, dolent inguina: quod super pubem est, intenditur: pro urina, sanguis; at ex ipso vulnere urina descendit: stomachus afficitur. itaque aut bilem vomunt, aut singultiunt: frigus, & ex eo mors sequitur.

20. *De sanguine, & sanie, & pus, & eorum speciebus: quandoque meliora, deteriorave sint.*

His cognitis, etiamnum quædam alia noscenda sunt, ad omnia vulnera ulceraque, de quibus dicturi sumus, pertinentia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est. Sanies est tenuior hoc, varie crassa, & glutinosa, & colorata. Pus crassissimum albidissimumque, glutinosius & sanguine & sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut jam sanescente. Sanies est inter utrumque tempus. Pus ex ulcere jam ad sanitatem spectante. Rursus & sanies & pus quasdam species Græcis nominibus distinctas habent. Est enim quædam sanies, quæ vel ἰχᾶρ, vel μελίκηρα nominatur. Est pus, quod ἐλαιῶδες appellatur. Ἰχᾶρ q̄ tenuis, subalbidus, ex malo ulcere exit, maximeque ubi, nervo læso, inflammatio secuta est. Μελίκηρα crassior est, glutinosior, & subalbida, mellique albo subsimilis. Fertur hæc quoque ex malis ulce-

ulceribus, ubi nervi circa articulos læsi sunt; & inter hæc loca, maxime ex genibus. Ἐλαιῶδες tenue, subalbidum, quasi unguinosum colore, atque pinguitudine oleo albo non dissimile adparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus est autem sanguis, nimium aut tenuis, aut crassus; 82, 8a colore vel lividus, vel niger; aut pituita mistus, aut varius. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaque protinus ejus vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itemque postea spes in his major est, ex quibus melioris generis quæque proveniunt.

15 Sanies igitur mala est, multa, nimis tenuis, livida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ ipsum ulcus, & junctam ei cutem erodit. Melior est non multa, modice crassa, subrubicunda, aut subalbida. Ἰχῶς autem pejor est multus, crassus, sublividus aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, quique cætera omnia contraria prioribus habet. Melicera

25 autem mala est, multa, & percassa: melior, quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter hæc optimum est. Sed id quoque pejus est, multum, tenue, dilutum; magisque, si ab initio tale est: itemque, si colore fero simile, si pallidum, si lividum, si foeculentum. Præter hæc, si male olet; nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albi-

30 dius: itemque, si læve est, si nihil olet, si 20.

æquale est. Modo tamen, convenire & magnitudini vulneris, & tempori debet. Nam plus ex majore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. Ελαϊώδες quoque pejus est multum, & parum pingue: quo minus autem, quoque idipsum pinguius, eo melius est.

21. *Curatio adversus profusionem sanguinis in vulneribus. 1*

Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est, qui servari potest, protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis profusio, neve inflammatione interimat. Si profusionem timeamus (quod ex sede vulneris, & ex magnitudine ejus, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest) ficcis linamentis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia ex aqua s frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, sæpius linamenta mutanda sunt. Et, si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem supprimendum est: ideoque quidam id vulnere infundunt. Sed alius rursus metus subest; ne, nimis valenter ibi retenta materia, magnam inflammationem postea moveat. Quæ res efficit, ut neque rodentibus medicamentis, neque adurentibus, & ob idipsum inducentibus crustam, (quamvis pleraque ex his sanguinem supprimunt) sit utendum: sed, si semel ad ea decurritur, his potius, quæ mitius idem efficiunt. Quod si illa quoque profluvio vincuntur, venæ, quæ sanguinem fundunt,

appre-

r Æginet. IV, 53. Aetius Tetrab. IV. Serm. II, 51.
S Frigidam potui exhibet Aëtius Tetr. I. Serm. III. 6.
145. Cels. p. 204, 31.

204,
15.
293,
18.

apprehendendæ, circaque id, quod ictum est, duobus locis deligendæ intercidendæque sunt, ut & in se ipsæ coeant, & nihilominus ora præclusa habeant. Ubi ne id quidem
 5 res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sic etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque nervus, neque musculus est, utputa in fronte, vel superiore capitis parte, commodissimum est, cucurbitulam
 10 admoveere adversa parte, ut illuc sanguinis cursus revocetur.

22. *Curaciones adversus vulnorum inflammationem.*

Et adversus profusionem quidem in his
 15 auxilium est: adversus inflammationem autem, in ipso sanguinis cursu. Ea timeri potest, ubi læsum est vel os, vel nervus, vel cartilago, vel musculus, aut ubi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo
 20 quoties quid tale erit, sanguinem mature suppressere non oportebit; sed pati fluere, dum tutum erit, adeo ut, si parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat; utique, si corpus juvenile, & robustum, &
 25 exercitatum est: multoque magis, si id vulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus læsus videbitur, præcidendus erit. nam percussus, mortiferus est: præcisus, sanitatem recipit.

30 23. *De glutinatione vulnorum.*

Sanguine autem vel suppresso, si nimis erumpit; vel exhausto, si per se parum fluxit; longe optimum est, vulnus glutinari. Potest autem id, quod vel in cute,

vel etiam in carne est; si nihil ei præterea mali accedit. Potest caro, alia parte dependens, alia inhærens; si tamen etiamnum integra est, & conjunctione corporis fovetur.

In his vero, quæ glutinantur, duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte est, sui debet: maximeque, si discissa auris ima est, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis, vel venter. Si vero in carne vulnus est, hiatque, neque in unum oræ facile attrahuntur, futura quidem aliena est: imponendæ vero fibulæ sunt (*ἀγκυρῆες* Græci nominarunt) quæ oras, paulatim tamen, contrahant; quo minus lata postea cicatrix sit.

Ex his autem colligi potest, utrum id quoque, quod alia parte dependens, alia inhærebit, si alienatum adhuc non est, futuram, an fibulam postulet. Ex quibus neutra ante debet imponi, quam intus vulnus purgatum est: ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim & in pus vertitur, & inflammationem movet, & glutinari vulnus prohibet. Ne linamentum quidem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est, inibi relinquendum est. nam id quoque inflammat.

Comprehendi vero futura, vel fibula, non cutem tantum, sed etiam aliquid ex carne, ubi suberit hæc, oportebit; quo valentius hæreat, neque cutem abrumpat. Utraque optima est ex t*acia molli, non nimis torta, quo mitius corpori infideat.

Utra-

t De ea librum scripsit Ioan. Rhodius. Turneb. Advers. XVII, 21. * H. F. ab Aquapendente, Oper. Chirurg. P. 1. c. 17. pag. 70. Salmasius Epist. 45. & 49.

Utraque neque nimis rara, neque nimis crebra injicienda est. Si nimis rara est, non continet: si nimis crebra est, vehementer afficit; quia, quo sæpius acus corpus transivit, quoque plura loca injectum vinculum mordet, eo majores inflammationes oriuntur; magisque æstate. Neutra etiam vim ullam desiderat: sed ea hætenus utilis est, qua cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Fere etiam fibulæ latius vulnus esse patiuntur: futura oras jungit, quæ ne ipsæ quidem inter se contingere ex toto debent; ut si quod intus humoris concreverit, sit qua emanet. Si quod vulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet.

Deinde omni vulneri primo imponenda est spongia ex * aceto expressa. Si sustinere aliquis aceti vim non potest, vino utendum^{290,} est. Levis plaga juvatur etiam, si ex aqua^{21.} frigida expressa spongia imponitur. Sed ea,^{204,} quocunque modo imposita est, dum ma-^{16.} det, prodest: itaque, ut inarescat, non est committendum. Licetque sine peregrinis,²⁵ & conquisitis, & compositis medicamentis vulnus curare. Sed si quis huic parum confidit, imponere medicamentum debet, quod sine sevo compositum sit ex his, quæ cruentis vulneribus apta esse proposui: ma-^{268.} ximeque si caro est, Barbarum: si nervi, vel^{269.} cartilago, vel aliquid ex eminentibus, qua-^{260.} les aures, vel labra sunt, Polybi sphragi-^{16.} dem. Alexandrinum quoque viride ner-^{268.} vis idoneum est: eminentibusque parti-^{264,} bus^{32.}

T 3

bus

* Maledictam methodum dicit Ettmuller in Comment. ad Schrod. & Morell. pag. 408.

bus ea, quam Græci *ῥύπτιστα* vocant.

Solet etiam, colliso corpore, exigua parte findi cutis. Quod ubi incidit, non alienum est, scapello latius aperire; nisi musculi, nervique juxta sunt, quos incidi non expedit. ubi satis diductum est, medicamentum imponendum est. At, si id, quod collisum est, quamvis parum diductum est, latius tamen aperiri propter nervos aut musculos non licet; adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extrahant; præcipueque ex his, id, quod *ῥυπτιστικὸς* vocari proposui. Non alienum est etiam, ubicunque vulnus est grave, impositum, quo id juvetur, insuper circumdare lanam succidam ex aceto & oleo: vel cataplasma, si mollis is locus est, quod leniter reprimat; si nervosus, aut musculosus, quod emolliat.

24. *Quomodo vulnus ligari conveniat.*

Fascia vero ad vulnus deligandum lineae aptissima est: eaque lata esse debet, ut semel injecta non vulnus tantum, sed paululum utrinque ejus comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur: si æque ab utraque, transverse comprehendere oras debet; aut si id vulneris ratio non patitur, media primum injicienda est, ut tum in utranque partem ducatur. Sic autem deliganda est, ut & contineat, nec adstringat. quod non continetur; elabitur: quod nimis adstrictum est, cancro periclitatur. Hieme sæpius fascia circuire debet: æstate, quoties necesse est. Tum extrema pars ejus inferioribus ac-

affluen-

assuenda est. nam nodus vulnus lædit. nisi tamen longe est.

Porro neminem decipi decet, ut propriam viscera curationem requirant, de quibus supra posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus, vel futura, vel alio medicinæ genere est. In visceribus nihil movendum est; nisi, si quid aut ex jecinore, aut liene, aut pulmone duntaxat extremo dependeat, id præcidatur. Alioquin vulnus interiorius ea victus ratio eaque medicamenta sanabunt, quæ cuique visceri convenire superiore libro proposui.

25. *Quomodo vulnerato agendum sit.*

His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est: isque si grave vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem, cibo debet: bibere, donec sitim finiat, aquam calidam; vel, si æstas est, ac neque febris, neque dolor est, etiam frigidam. Adeo tamen nihil perpetuum est, sed semper pro vi corporis æstima-^{120,7.} mandum, ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit; tenuem scilicet, & exiguum, qui tantum sustineat. Multique etiam ex profluvio sanguinis intermorientes ante ullam curationem vino^{299,} * reficiendi sunt; quod alioqui inimicissimum^{21.} vulneri est.

30 26. *De notis vulnerum.*

Nimis vero vintumescere vulnus, periculosum: nihil x intumescere, periculosissimum est. illud indicium magnæ inflammationis: hoc, emortui corporis est. Pro-

T 4

tinus-

* Athen. Deipnos. L. I. C. 8. p. 10.

v Aph. V, 66.

x II. Epidem. III, 128,

tinusque, si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, mature vulnus sanum fore. At ne febris quidem terrere debet, si in magno vulnere, dum inflammatio est, permanet. Illa perniciosa est, quæ vel levi vulnere supervenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium movet: vel si nervorum y rigorem aut distentionem, quæ ex vulnere orta est, ea non finit. Vomitus quoque biliosus non 1 voluntarius, vel protinus, ut percussus est aliquis, vel dum inflammatio manet, malum signum est in his duntaxat, quorum vel nervi, vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere, non alienum 15 est; præcipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neque protinus post cibum, neque jam inflammatione orta, neque cum in superioribus partibus plaga est.

27. *De curationibus vulnorum.*

20

z Biduo sic vulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendaque sanies ex aqua frigida est, eademque rursus injicienda sunt. Quinto jam die, quinta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus de- 25 tecto vulnere, considerandus color est. Quod si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger est; scire licet, malum vulnus esse. idque, quandocumque animadversum est, terrere nos potest. Album, aut rubicun- 30 dum esse vulnus, commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit. Bona signa sunt, ubi hæc sine dolore, tenuis, & mollis est. Sed si glutinatur vulnus,

vulnus, aut leviter intumuit, eadem sunt imponenda, quæ primo fuerunt.

Si gravis inflammatio est, neque glutinandi spes est, neque movetur, aquæ quæ a calidæ necessarius usus est, ut materiam digerat; & duritiam emolliat, & pus citet. Ea sic temperanda est, ut manu contingenti jocunda sit; & usque eo adhibenda, donec aliquid minuisse ex tumore caloremque ulceri magis naturalem reddidisse videatur. Post id fomentum, si late plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet, maximeque, si grande vulnus est, tetrapharmacum: si in articulis, digitis, locis cartilaginosis, *ῥυπαῖδες*. At si latius ^{294,} hiat, idem illud emplastrum liquari ex iri- ^{12.} no unguento oportet, eoque inlita linamenta disponi per plagam: deinde emplastrum supra dari, & super id lanam succidam; minusque etiam, quam primo, fasciæ adstringendæ sunt.

28. *Curationes propriae articulorum.*

Sed propria quædam in articulis visenda sunt. In quibus si præcisi nervi sunt, qui ²⁵ continebant, debilitas bejus partis sequitur. Si id dubium est, & ex acuto telo plaga est, & ea transversa, commodior est: & si ex retuso & gravi est, nullum in figura discrimen est: ad videndum est, pus supra articulum, ³⁰ an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albumque & crassum diu fertur, nervum præcisum esse credibile est: magisque, quo majores dolores inflammationesque, & quo maturius excitatæ sunt. Quamvis autem

T 5 non

non abscissus nervus est; tamen, si circa durus tumor diu permanet, necesse est, & diuturnum ulcus esse, & sanato quoque eo, tumorem permanere: futurumque est, ut tarde membrum id vel extendatur, vel 5 contrahatur. Major tamen in extendendo mora est, ubi recurvato articulo curatio adhibita est; quam in recurvando eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoque membrum, quod ictum est, ratione certa debet. Si glutinandum est, ut superius sit: si in inflammatione est, ut in neutram partem inclinatum sit: si jam pus profluit, ut devexum sit.

257,
33.

348,
21.

Optimum etiam medicamentum, b quies 155 est. Moveri, & ambulare, nisi sanis, alienum est. Minus tamen periculosum his est, qui in capite vel brachiis, quam qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Minimeque ambulatio convenit, femine, aut 200 crure, aut pede laborante. Locus, in quo cubat, tepidus esse debet. Balneum quoque, dum parum vulnus purum est, inter res infestissimas est. Nam id & tumidum & sordidum reddit. Ex quibus ad cancerum 250 transitus esse consuevit. Lenis fricatio recte adhibetur; sed his partibus, quæ longe absunt à vulnere.

29. *Vulnus quomodo purgandum est.*

Inflammatione finita, vulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta: supraque id emplastrum vel 300 τετραφάρμακον vel εννεαφάρμακον dandum est. Tum demum vero purum ulcus est, cum

262.

cum rubet, ac nimium neque siccum, neque humidum est. At, quodcumque sensu caret, quod non naturaliter sentit; quod nimium aut aridum aut humidum est; quod aut albidum, aut lividum, aut nigrum est; id purum non est.

30. *Quomodo vulnus implendum est.*

Purgato vulnere, sequitur ut impleatur; jamque calida aqua eatenus necessaria est, ut sanies removeatur. Lanæ succidæ supervacuus usus est: lota melius circumdatur. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiā medicamenta aliqua: itaque ea adhiberi non alienum est; ut butyrum cum rosa, & exigua mellis parte; aut cum eadem parte mellis aut cum eadem rosa, τετραφάρμακον; aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum. Cibi boni succi; vitatis omnibus acribus. Sed jam plenioribus, avis, & venatio, & suilla elixa dari potest. Vinum omnibus, ^{295.} ^{28.} dum febris, dum inflammatio est, alienum est: itemque usque ad cicatricem, si nervi, musculive vulnerati sunt; etiam, si alte caro. At, si plaga in summa cute generis tutioris est, potest non pervetus, modice tamen datum, ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est, quod in nervosis locis, musculosisque necessarium est, cerato quoque super vulnus utendum est. At, si caro supercrevit, modice reprimit siccum linamentum; vehementius, squama æris. Si plus est, quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum vehementiora, quæ corpus exedant.

300 A. CORN. CELSI Lib. 5.
exedant. Cicatricem, post omnia hæc, com-
mode inducit lycium ex passio aut lacte
dilutum; vel etiam per se impositum sic-
cum linamentum vehementius.

31. De ulceribus, quæ extrinsecus per vulnera 5
incidunt, curationibusque eorum.

Hic ordo felicitis curationis est. Sed quæ-
dam tamen periculosa incidere consue-
runt. Interdum enim vetustas ulcus occu-
pat, induciturque ei callus, & circum oræ 100
crassæ livent. Post quæ, quicquid medi-
camentorum ingeritur, parum proficit;
quod fere negligenter curato ulceri super-
venit.

331.
411.

294.
31.
533.
23.

Interdum vel ex nimia inflammatione, 155
vel ob æstus immodicos, vel ob nimia fri-
gora, vel quia nimis vulnus adstrictum est,
vel quia corpus senile, aut mali habitus
est, cancer occupat. Id genus à Græcis di-
ductum in species est; nostris vocabulis 200
non est. Omnis autem cancer non solum id
corrumpit, quod occupavit; sed etiam ser-
pit: deinde aliis aliisque signis * discernitur:
Nam modo super inflammationem rubor
ulcus ambit, isque cum dolore procedit; 25
ἔρυσίπελας Græci nominant: modo ulcus
nigrum est, quia caro ejus corrupta est, id-
que vehementius; etiam in putrescendo in-
tenditur, ubi vulnus humidum est, & ex
nigro ulcere humor pallidus fertur, mali- 300
que odoris est, & caro intus corrupta: in-
terdum etiam nervi ac membranæ resol-
vuntur, specillumque demissum descen-
dit aut in latus, aut deorsum, eoque vitio
non-

* In principio difficillimè cognoscitur teste Galeno
M. M. XIV, Vide Hildan, Observ, Chirurg. Cent. 1.
Obs. 1.

nonnunquam os afficitur : modo oritur ea, quam Græci γάγγραινα appellant.

303

Priora in qualibet parte corporis fiunt : hæc in prominentibus membris, id est inter ungues, & alas, vel inguina; fereque in senibus, vel in his, quorum corpus mali habitus est. Caro illi ulceri vel nigra, vel livida est, sed sicca & arida; proximaque cutis, plerunque subnigris pustulis impletur; deinde ei proxima, vel pallida, vel livida fereque æruginosa & sine sensu est. Deterior in inflammatione est, omniaque ea simul serpunt: ulcus, in locum pustulosum: Pustulæ, in eum, qui pallet aut livet: pallor aut livor, in id quod inflammatum est: inflammatio, in id quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta oritur, ingensque sitis: quibusdam etiam delirium accedit: alii, quamvis mentis suæ compotes sunt, balbutiendo vix sensus suos explicant: incipit affici stomachus: fit foedi spiritus ipse odoris. Atque initium ejus quidem mali recipit curationem: ubi vero penitus insedit, insanabile est. plurimique sub frigido sudore moriuntur.

51, 30.

32. Curatio veteris ulceris.

Ac pericula quidem vulnerum hæc sunt. Vetus autem ulcus scalpello circumcidendum est, excidendæque ejus oræ, &, quicquid super eas livet, æque incidendum. Si varicula intus est, quæ id sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde, ubi sanguis emissus, novatumque vulnus est, eadem curatio adhibenda, quæ in recentibus vulneri-

neri-

neribus exposita est. Si scalpello aliquis uti non vult, potest sanare id emplastrum, quod ex ladano fit: &, cum ulcus sub eo exesum est, id, quo cicatrix inducitur.

33. *Curatio Erysipelatum.*

Id autem, quod *ἰρυσίπελας* vocari dixi, non solum vulnere inspervenire, sed sine hoc quoque oriri consuevit: atque interdum periculum magnum adfert; utique, si circa cervicem aut c caput constitit.

Oportet, si vires patiuntur, sanguinem mittere: deinde imponere simul reprimentia & d refrigerantia; maximeque cerussam solani succo, aut cimoliam cretam aqua pluviali exceptam; aut ex eadem aqua subactam farinam cupresso adjecta, aut, si tenerius corpus est, lenticula. Quicquid impositum est, betæ folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo: sulphuris p. i. *. cerussæ, croci, singulorum p. x. *. eaque cum vino contenda sunt, & id his illinendum: aut, si durior locus est, solani folia contrita suillæ adipi miscenda sunt, & illinita linteolo superinjicienda.

At, si nigrities est, quæ nequedum serpit, imponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exedunt; repurgatumque ulcus sic, ut cætera, nutriendum est. Si magis eputre est, jamque procedit ac serpit, opus est vehementius erodentibus. Si ne hæc quidem evincunt, aduri locus debet, donec nul-

nullus ex eo humor feratur. nam quod sanum est, siccum est, cum adurit. Post unctionem putris ulceris, superponenda sunt, quæ crustas à vivo resolvant; ἀπὸ ξα-
 5 πόνων Græci nominant. Ubi exciderunt, purgandum ulcus, maxime melle & resina est. Sed iis quoque purgari potest, quibus purulenta curantur, eodemque modo ad sanitatem perducendum est,

34. Curatio Gangræna. f

Gangrænam vero, si nondum plane tenet, sed adhuc incipit, curare non difficilimum est; utique in corpore juvenili: & magis etiam, si muscoli integri sunt; si nervi
 5 vi vel læsi non sunt, vel leviter affecti sunt; neque ullus magnus articulus nudatus est; aut carnis in eo loco paululum est, ideoque non multum quod putresceret, fuit; consistitque uno loco vitium; quod maxime
 0 fieri in digito potest. In ejusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde, quicquid aridum est, & intentione quadam proximum quoque locum male habet, usque ad sanum corpus
 5 concidere.

Medicamenta vero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt, quæ pus movere consuerunt; ideoque ne aqua quidem calida. Gravia quoque, quamvis reprimantia,
 0 aliena sunt: sed his quam levissimis opus est. superque ea, quæ inflammata sunt, utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, uri id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet.

Præ-

Præcipueque in hoc casu petendum, non à medicamentis solum, sed etiam à vitæ ratione præsidium est. Neque enim id malum, nisi corrupti vitiosique corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia utendum. Deinde danda, quæ per cibum potionemque alvum, ideoque etiam corpus adstringant; sed ea levia. Postea, si vitium constitit, imponi super vulnus eadem debent, quæ in putri ulcere præscripta sunt. Ac tum quoque plenioribus cibis uti licebit ex media materia; sed tamen non nisi alvum, corpusque siccantibus: aqua verò pluviatili frigida. Balneum, nisi jam certa fiducia redditæ sanitatis est, alienum est; siquidem emollitum in eo ulcus cito rursus eodem malo afficitur. Solent vero nonnunquam nihil omnia auxilia proficere, ac nihilominus serpere sub his cancer. Inter quæ miserum, sed unicum, auxilium est, ut cætera pars corporis tuta sit, membrum, quod paulatim emoritur, abscindere.

35. *Curatio vulnerum, ubi quid collisum est, aut detritum, aut infixum.*

Hæ gravissimorum vulnerum curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda, ubi interior pars collisa; aut ubi derasum, detritumve aliquid est; aut ubi furculus corpori infixus est; aut ubi tenue, sed altum vulnus insedit.

In primo casu commodissimum est mallicorium ex vino coquere, interioremque ejus partem continere, & cerato miscere

ex rosa factō, idque superponere : deinde, ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum, qualis λιπαρὴ est. 267, 9

Deraſo vero, detritoque, imponendum eſt emplaſtrum τριτρυφάρμακον, minuendusque cibus & vinum ſubſtrahendum. Neque id, quia non habebit altiores ictus, contemnendum erit : ſiquidem ex ejuſmodi caſibus ſæpe cancri fiunt. Quod ſi levius id erit, & in parte exigua, contenti eſſe poterimus eodem leni medicamento.

Surculum vero, ſi fieri poteſt, oportet vel manu, vel etiam ferramento educere. Si vel præfractus eſt, vel altius deſcendit, 15 quam ut ita fieri poſſit, medicamento evocandus eſt. Optime autem educit ſuperimpoſita arundinis radix; ſi tenera eſt, protinus contrita; ſi jam durior, ante in mulſo decocta. cui ſemper mel adjiciendum eſt 20 aut ariſtolochia cum eodem melle. Peſſima ex ſurculis, arundo eſt; quia aſpera eſt. Eademque offenſa etiam in filice eſt. Sed uſu cognitum eſt, utranque adverſus alteram medicamentum eſſe, ſi contrita ac ſuperimpoſita eſt. 25 Facit autem idem in omnibus ſurculis, quodcunque medicamentum extrahendi vim habet. Idem altis tenuibuſque vulneribus aptiſſimum eſt. Priori rei Philocratis; huic Hecatæi empla- 264. 30 ſtrum maxime convenit.

36. *Quomodo cicatrix vulnere inducenda, purgandaque ſit. g*

Ubi vero in quolibet vulnere ventum ad inducendum cicatricem eſt (quod per-

V

pur-

purgatis jam, repletisque ulceribus necessarium est) primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur: deinde cum jam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur: tum deligari super album plumbum oportet; quo & reprimatur cicatrix, & colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix filvestris cucumeris præstat. Idem compositio, quæ habet elaterii P. I. *. spumæ argenti P. II. *. glandis unguentariæ pondo 17. *. quæ excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. At nigras quoque cicatrices leniter purgant, paribus portionibus mixta, ærugo & plumbum elotum, eademque resina cocta; sive eo ungitur cicatrix, quod in facie fieri potest; sive id ut emplastrum imponitur, quod in aliis partibus commodius est.

At, si vel excrevit cicatrix, vel concava est; stultum est, decoris causa, rursum & dolorem & medicinam sustinere: alioquin res utrique succurri patitur. Siquidem utraque cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mavult, idem efficiunt compositiones hæ, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta conjicienda sunt: super concavam, implentia; donec utrumque ulcus sanæ cuti æquetur, & tum cicatrix inducatur.

CAP. XXVII.

*De vulneribus, quæ per morsus inferuntur,
eorumque curationibus.*

5 **D**IXI de his vulneribus, quæ maxime
per tela inferuntur. Sequitur, ut de
his dicam, quæ morfu fiunt, inter-
dum* hominis, h interdum simiæ, sæpe canis,
nonnumquam ferarum, aut aliorum ani-
10 malium, aut serpentium. Omnis autem
feræ morsus habent quoddam virus.

Itaque, si vehemens vulnus est, i cucur-
bitula admovenda est: si levius, protinus
emplastrum injiciendum, præcipueque
15 Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, 265.
quæ adversus morsus proposui. si ea non
sunt, viride Alexandrinum: si ne id qui- 264.
dem est, quodlibet non pingue ex his, quæ
recentibus vulneribus accommodantur.
20 Sal quoque his præcipueque ei, quod ca-
nis fecit, medicamentum est, si aridus vul-
neri imponitur, superque id duobus digi-
tis verberatur. exsaniat enim. Ac falsamen-
tum quoque recte super id vulnus deliga-
25 tur.

2. Curatio adversus rabiosi canis morsum. k

Utique autem, si rabiosus canis fuit,
cucurbitula virus ejus extrahendum est.
Deinde, si locus neque nervosus, neque
30 musculosus est, vulnus id adurendum est.
Si uri non potest, sanguinem homini mit-
ti non alienum est. Tum usto quidem vul-
neri superimponenda, quæ cæteris ustis
sunt. Ei vero, quod expertum ignem non
est,

V 2

* Dom. Panarolus Pentec. 11. Obs. 32. h Seren.
Samm. XLV. i Æginet. V, 2. k Æginet. V, 3.
Aëtuar. M. M. VI, 11.

est, ea medicamenta, que vehementer exedunt. Post quæ nullo novo magisterio, sed jam supraposito vulnus erit implendum, & ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum mittunt; cumque ibi patiuntur desudare, dum vires corporis finunt, vulnere aperto; quo magis ex eo quoque virus distillet: deinde multo meracoque vino excipiunt. quod omnibus venenis contrarium est. Idque cum ita per triduum factum est, tutus esse homo à periculo putatur.

Solet autem ex eo vulnere, ubi parum occursum est, aquæ timor nasci. ὑδραφοβία Græci adpellant. Miserrimum genus morbi: in quo simul æger & sitis & aquæ metu cruciatur. quo oppressis in angusto spes est. Sed unicum tamen remedium est, nec opinantem in piscinam non ante ei provisam projicere, & si natandi scientiam non habet, modo mersum bibere pati, modo attollere; si habet, interdum deprimere, ut invitus quoque aqua satietur. sic enim simul & sitis, & aquæ metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida vexatum, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, à piscina protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum^m autem (præcipue id, quod primo loco posui; ubi id non est, aliud) si nondum æger aquam horret, potui ex aqua dandum est: & si amaritudine offenditur, mel adjiciendum est: at, si jam is morbus occupavit, per catapotia sumi potest.

3. Cura-

3. *Curationes communes adversus omnes
morsus serpentium.* n

Serpentium quoque morsus non nimium distantem curationem desiderant: 5
quamvis in ea multum antiqui variarunt; adeo ut in singula anguium genera singula medendi præciperent; aliique alia. sed in omnibus eadem maxime proficiunt. Igitur in primis supra vulnus id membrum 10
deligandum est: non tamen nimium vehementer, ne torpeat. Dein venenum extrahendum est. Id cucurbitula optime facit. Neque alienum est, ante scalpello circa vulnus incidere, quo plus vitii jam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est, 15
(quod tamen vix incidere potest) tum quodlibet simile vas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo o adhibendus est, qui vulnus exfugat.

20 Neque hercule scientiam præcipuam habent hi, qui *Pfylli nominantur; sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam venenum serpentis, ut quædam etiam venatoria venena, quibus Galli præcipue utuntur, 25
non gustu, sed in vulnere nocent. Ideoque colubra ipsa tuto estur: ictus ejus occidit. & si stupente ea (quod per quædam medicamenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit, neque percussus est, nulla in 30
ejus saliva noxa est. Ergo quisquis, exemplum Pfylli secutus, id vulnus exuxerit, & ipse tutus erit, & tutum hominem præstabit. Illud interea ante debet attendere, ne quod in gingivis, palatove, aliave par-

V 3

te

n Aëtii Tetrab. IV. Serm. I. c. I. 2. & seqq. o Æginet. V. 2. Actuar. M. M. VI, II. *Vocantur alio nomine *Marfi*, Vide Reinel. Variar. Lect. I. c. 8. p. 26.

te oris ulcus habeat. Post hæc is homo loco calido collocandus est, sic, ut id, quod percussus erit, in inferiorem partem inclinetur.

Si neque qui exfugat, neque cucurbitula est, sorbere oportet jus anserinum, vel vitulinum, & vomere. Vivum autem galinaceum pullum per medium dividere, & protinus calidum super vulnus imponere sic, ut pars interior corpori jungatur. Facit id etiam hoedus agnusve discissus, & calida ejus caro statim super vulnus imposita. 265. Emplastra quoque, quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumque est, vel 266. Ephesium, vel id quod ei subjectum est. Præsensque in aliquo antidoto prælidium est. Sin id non est, necessarium est exorbere portionem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud, quod calori movendo est, nec humorem intus coire patitur. nam maxima pars venenorum frigore interimit. 20. Omnia etiam urinam moventia, quia materiam extenuant, utilia sunt.

4. *Speciales curationes adversus ictus serpentium:*

& primò adversus ictum Aspidis. p

Hæc adversus omnes ictus utilia sunt, 25. communiaque: usus tamen ipse docuit, eum, quem * Aspis percussit, acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cujusdam pueri, qui cum ab hac ictus esset, & partim ob ipsum vulnus, partim ob 30. immodicos æstus siti premeretur, ac locis siccis alium humorem non reperiret, acetum, quod forte secum habebat, ebibit, & libera-

p Æginet. V, 18. Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 20.

* De Aspide videatur Ammian. Marcellin. L. XXII. Cap. 15. pag. 338. Ejus morsum sanari posse negat Elian. de Animal. 1. Cap. 54.

liberatus est. Credo quoniam id, quamvis refrigerandi vim habet, habet tamen & dissipandi. Quo fit, ut terra respersa eo spumet. Eadem ergo vi verisimile est spissescere centem quoque intus humorem hominis ab eo discuti, & sic dari sanitatem.

5. *Adversus ictum Scorpionis.* 9

In quibusdam etiam aliis serpentibus certa quædam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio ipse sibi pulcherrimum medicamentum est. Quidam contritum cum vino bibunt. Quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt. Quidam super prunas eo imposito, vulnus suffumigant, undique veste circumdata, ne is fumus dilabatur; tum carbonem ejus super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbæ solaris (quam ἡλιοτρίπιον Græci vocant) semen, vel certe folia ex vino. Super vulnus vero etiam furfures ex aceto, vel ruta silvatica recte imponitur, vel cum melle sal tostus. Cognovi tamen medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

6. *Adversus Aranei & Scorpionis ictum.*

Ad scorpionis etiam, & ad aranei ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoque contritum superimponitur.

7. *Adversus* Ceraſtis, & Dipsadis, & Hæmorrhoidis ictum.* s

At, si cerasites, aut dipsas, aut hæmorrhoids percussit, asphodeli, quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem æquet, arefactum, in

V 4

duas

q Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 19. r Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 16. Ex eo mors, Dom. Panarolus Pentec. 1. Obs. 45. * Describitur ab Ælian. de Animal. 1. c. 57. s Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 22, 23.

duas potiones dividendum est sic, ut ei rutæ paululum adjiciatur. Trifolium quoque & mentastrum, & cum aceto panaces æque proficiunt. Costumque, & cassia, & cinnamomum recte per potionem assumentur. 5

8. *Adversus Chersydri t ictum, & Ceraſtis.*

Adversus Chersydri vero ictum, panaces, aut laser, quod sit scrupulorum p. ii. *. vel porri succus cum hemina vini sumendus est, & edenda multa satureia. Imponendum autem super vulnus sterco caprinum ex aceto coctum; aut ex eodem hordeacea farina; aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita, melle adjecto. Quod in eo quoque vulnere, quod ceraſtes fecit, æque valet. 10 15

9. *Adversus Phalangii ictum.* u

Ubi vero phalangium * nocuit, præter eam curationem, quæ manu editur, sæpe homo demittendus in folium est, dandusque ei myrrhæ & uvæ taminix par modus 20 ex passi hemina; vel radiculæ semen, aut lolii radix ex vino; & super vulnus furfures ex aceto cocti, imperandumque, ut is conquiescat.

10. *Adversus ictus Italarum anguium, qui minus terribiles peregrinis sunt.* 25

Verum hæc genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt; maxime, quæ æstuosis gignuntur locis. Italia frigidioresque regiones hac quoque parte 30 salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Adversus quos satis proficit herba betonica, vel cantabrica, vel centaurion, vel agrimonia, vel trixago, vel

t Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 35. u Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 18. * Salmasius in Notis ad Spartiani Hadrian. C. 20. pag. 190. Ed. Hackian.

vel personata, vel marinæ pastinacæ; si vel singulæ binæve tritæ, & sic potui datæ sunt cum vino, & super vulnus impositæ. Illud ignorare non oportet, omnis serpentis ictum & jejuni & jejuno magis nocere. ideoque perniciosissimi sunt, cum incubant: utilissimumque est, ubi ex anguibus metus est, non ante progredi, quam quis aliquid assumpsit.

10 11. *Remedium generale adversus omnia venena, vel in cibo, vel in potione assumpta.*

Non tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in cibo, vel in potione sumpserunt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti: ideo ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde quia noxa non à cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi primum sensit aliquis, protinus oleo 20 multo epoto vomere. Deinde, ubi præcordia exhaustit, bibere antidotum: si id non est, vel merum vinum.

12. *Specialia remedia adversus quædam venena: & primo adversus Cantharidas. a*

5 Sunt tamen quædam remedia propria adversus quædam venena, maximeque leviora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panaces cum lacte contusa, vel galbanum vino adjecto dari, vel lac per se debet.

0 13. *Adversus Cicutam. b*

Si cicutam, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est; deinde is vomere cogendus: posteaque laser ex vino dandum. Iique, si febre vacat, in

V 5 cali-

a Æginet. V, 30. Scribon. Larg. LVII. A&tuar. M. M. V, 12. b Æginet. V, 41. Scribon. Larg. XLVII. A&tuar. M, M. V, 12.

calidum balneum mittendus: si non vacat, ungendus ex calefacientibus est. Post quæ quies ei necessaria est.

14. *Adversus Hyoscyamum.* z

Si hyoscyamum, fervens mulsum bibendum est, aut quodlibet lac, maxime tamen asininum.

15. *Adversus Cerussam.* a

Si cerussam, jus malvæ, vel juglandis ex vino contritiæ, maxime profunt.

16. *Adversus Sanguisugam, si epota est, & lac, quod intus coit.* b

Si sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coit, aut passum, aut cum aceto laser.

17. *Adversus Fungos inutiles.* c

Si fungos inutiles quis assumpsit, radícula aut è posca, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi vero hi & specie quidem discerni possunt ab utilibus, & cocturæ genere idonei * fieri. Nam sive ex oleo inferbuerunt, sive piri furculus cum his inferbuit, omni noxa vacant.

18. *De adustis corporis locis, & quomodo curare debeant.* d

Aduſtis quoque locis extrinsecus vis infertur; itaque sequi videtur, ut de his dicam. Hæc autem optime curantur foliis aut lilii, aut linguæ caninæ, aut betæ in vino oleoque decoctis. Quorum quodlibet protinus impositum ad sanitatem perducit.

Sed dividi quoque curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimentia-
que,

z. Æginet. V, 28. a Scribon. Larg. XLVII. b Æginet. V, 36. Plin. H. N. XXII, 23. c Æginet. V, 54. Scrib. Larg. LXVI. d Ægin. IV, 11. Seren. Samm. LX. Aëtius Tetrab. IV. Serm. II, 64. * Alii sunt.

que, primo & pustulas prohibeant, & summam pelliculam exasperent: deinde ea, quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticulæ cum melle farina: vel myrrha cum vino; vel creta cimolia cum thuris cortice contrita, & aqua coacta, atque, ubi usus necessitas incidit, aceto diluta. Ex insequentibus, quælibet *λιπαρά*.^{267.} Sed idonea maxime est, quæ vel plumbi retrimentum, vel vitellos habet.

Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum melle lenticulam: ubi ea declinavit, farinam cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crustæ cadant: tum ervum cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit: novissime siccum linamentum.

CAP. XXVIII.

De interioribus ulceribus, quæ, aliqua corporum parte corrupta, nascuntur.

1. De carbunculo. c

AB his, quæ extrinsecus incidunt, ad ea veniendum est, quæ interius, corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo pejus. Ejus hæ notæ sunt. Rubor est, superque eum non nimium pustulæ eminent, maxime nigræ, interdum sublividæ, aut pallidæ. In iis sanies esse videtur; infra color niger est. Ipsum corpus aridum, & durius, quam naturaliter oportet. Circaque quasi crusta est; eaque inflammatione cingitur.

gitur. Neque in eo loco levare cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget. Nonnunquam horror, aut febris oritur, aut utrumque. Idque vitium subteractis quasi quibusdam radicibus serpit; interdum celerius, interdum tardius. Supra quoque, procedens inalbescit; dein lividum fit; circumque exiguae pustulae oriuntur. Et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum saepe elidit.

Nihil melius est, quam protinus adurere. Neque id grave est. nam non sentit; quoniam ea caro mortua est. Finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde ulcus, sicut cetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta: quae undique à viva carne diducta, trahit secum, quicquid corruptum erat; purusque jam finis curari potest implentibus. At, si in summa cute vitium est, possunt succurrere quaedam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine abhibenda est. Quodcunque vero medicamentum impositum est, si satis proficiet, protinus à viva corruptam partem resolvat.

Certaque esse fiducia potest fere, si undique vitiosa caro excidat, qua hujuscemodi medicamen exest; si id non fit, medicamentumque malo vincitur, utique ad unctionem properandum est. Sed in ejusmodi casu abstinendum à cibo, à vino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magisque ea servanda sunt, si febricula quoque accessit.

2. De Carcinomate.

Non idem periculum καρκίνωμα affert, nisi imprudentia curantis agitatum est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, circa f faciem, nares, aures, labra, g mammæ foeminarum. Et ex jecore, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur: isque immobilis, inæqualiter tumet: interdum etiam torpet. Circa eum inflatæ venæ quasi recurvantur: hæque pallent, aut livent: nonnunquam etiam in quibusdam delitescunt. Tactusque is locus, aliis dolorem affert, in aliis eum non habet. Et nonnunquam sine ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet: nonnunquam iisdem omnibus ulcus accedit. Interdumque nullam habet proprietatem: interdum simile his est, quæ vocant Græci κονδυλώματα, aspredine quadam & magnitudine sua. Colorque ejus ruber est, aut lenticulæ similis. Neque tuto secatur. nam protinus aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur. Sæpe homo ictus obmutescit, atque ejus anima deficit. Quibusdam etiam, si id ipsum pressum est, quæ circa sunt, intenduntur & intumescunt. Namque pessimum id genus est, fereque primum id fit; quod κακὴθεις à Græcis nominatur. Deinde ex eo id καρκίνωμα, quod sine ulcere est. Deinde ulcus; & ex eo, thymium.

Tolli nihil, nisi κακὴθεις, potest: reliqua curationibus irritantur. Et quo major vis adhibita est, eo magis quidam usi sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro ad-

adufferunt : quidam scalpello exciderunt : neque ulli unquam medicina * profuit : sed adusta, protinus concitata sunt, & increverunt, donec occiderent. Excisa etiam, post inductam cicatricem, tamen reverterunt, & causam mortis attulerunt. Cum interim plerique nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent; sed imponendo tantum lenia medicamenta, quæ quasi blandiantur, quo minus ad ultimam senectutem perveniant, non prohibeantur. Discernere autem cacoethes, quod curationem recipit, à carcinomate, quod non recipit, nemo scire potest, nisi tempore & experimento.

Ergo, ubi primum id vitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. Si levatur malum, minuunturque ejus indicia, procedere curatio potest & ad scalpellum, & ad ustionem. Si protinus irritatum est, scire licet, jam carcinoma esse; removendaque sunt omnia acria, omnia vehementia. Sed, si sine ulcere is locus durus est, imponi ficum quam pinguiissimam, aut *ῥυπαρὴς* emplastrum satis est. Si ulcus æquale est, ceratum ex rosâ injiciendum est, adjiciendusque ei pulvis ex contrita testa, ex aqua, qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Si id nimium supercrevit, tentanda squama æris est (quæ lenissima ex adurentibus est) eatenus, ne quid eminere patiatur : sed ita, si nihil exacerbavit : sin minus, eodem cerato contenti esse debemus.

264,
14.

3. De

3. De Theriomate:

Est etiam ulcus, quod *θηρίωμα* Græci vocant. Id & per se nascitur, & interdum ulceri ex alia causa facto supervenit. Color est vel lividus, vel niger: odor foedus: multus, & muco similis humor. Idipsum ulcus neque tactum, neque medicamentum sentit: prurigine tantum movetur. circa dolor est, & inflammatio. Interdum etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit. Atque id quoque malum serpit. quo omnia sæpe intenduntur. Fitque ex his ulcus, quod *ἑρπηδὰς ἐσθρὸς* Græci vocant; quia celeriter serpendo, penetrandoque usque ad ossa, corpus vorat. Id ulcus inæquale est, cœno simile; inestque multus humor glutinosus; odor intolerabilis; majorque, quam pro modo ulceris, inflammatio. Utrumque, sicut omnis cancer, fit maxime in senibus; vel his, quorum corpora mali habitus sunt.

167, 18.

Curatio utriusque eadem est: sed in majore malo major vis necessaria. Ac primum, à victus ratione ordinandum est: ut quiescat in lectulo: ut primis diebus à cibo abstineat: aquam quamplurimam assumat. Alvus quoque ei ducatur. Dein, post inflammationem, cibum boni succi capiat; vitatis omnibus acribus: potionis quantum volet, sic, ut interdiu quidem aqua contentus sit: in cœna vero etiam vini austeri aliquid bibat. Non æque tamen fame in his, quos *ἑρπης* urget, atque in his, qui *θηρίωμα* adhuc habebunt, utendum erit.

84, 9.

Et

Et victus quidem talis necessarius est.

Super ulcus vero inspergenda est arida aloe contrita, &, si parum proficiet, chalcitis. At, si quis nervus, exesa carne, nudatus est, contegendus ante linteolo est, ne sub eo medicamento aduratur. Si validioribus etiam remediis opus est, ad eas compositiones veniendum est, quæ vehementius adurant. Quicquid autem inspergitur, averso specillo infundi debet. Superdanda cum melle sunt vel linamenta, vel oleæ folia ex vino decocta, vel marrubium: eaque linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso. Circaque, quæ tumor ex inflammatione est, imponenda, quæ reprimant, cataplasmata. Si sub his nihil proficitur, ferro locus aduri debet; diligenter nervis, qui apparent, ante contactis. Adustum vel medicamentis vel ferro corpus, primum purgandum, deinde implendum esse, apparere cuilibet ex prioribus potest.

4. De Sacro igne. i

Sacer quoque ignis malis ulceribus annumerari debet. Ejus duæ species sunt. Alterum est subrubicundum, aut mistum rubore atque pallore; exasperatumque per pustulas continuas, quarum nulla altera major est, sed plurimæ perexiguæ. In his semper fere pus, & sæpe rubor cum calore est: serpitque id nonnunquam sanescente eo, quod primum vitiatum est: nonnunquam etiam exulcerato, ubi, ruptis pustulis, ulcus continuatur, humorque exit, qui esse inter

ter saniem & pus videri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueque in plantis. Alterum autem est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, sublividum, inæqualiter tamen; mediumque sanescit, extremis procedentibus: ac sæpe id, quod jam sanum videbatur, iterum exulceratur. At circa, proxima cutis, quæ vitium receptura est, tumidior & durior est, coloremque habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo fere corpora seniores tentantur, aut quæ mali habitus sunt; sed in cruribus maxime.

15 Omnis autem sacer ignis, ut minimum periculum habet ex his, quæ serpunt; sic prope difficillime tollitur. Medicamentum ejus *fortissimum est, uno die febris, quæ humorem noxium absumat. Pus, quo cras- 289, 290
fius & albidius est, eo periculi minus est. 33.
Prodest etiam infra ulcera locum cædi, quo plus puris exeat; & id, quo ibi corruptum corpus est, extrahatur. Sed tamen, si febricula accessit, abstinencia, lectulo, alvi du- 295
ctione opus est. In omni vero sacro igni; neque lenibus & glutinosis cibus, neque falsis & acribus utendum est; sed his, quæ inter utrumque sunt: qualis est panis sine fermento, piscis, hœdus, aves, exceptoque apro, omnis fere venatio. Si non est febricula, & gestatio utilis est, & ambulatio, & vinum austerum, & balneum. Atque in hoc quoque genere potio magis liberalis esse, quam cibus, debet.

X

Ipsa

* Edit. Aldi, Steph. *aliæque fortuitæ.*

. Ipsa autem ulcera, si mediocriter ser-
punt, aqua calida: si vehementius, vino
calido fovenda sunt. Deinde acu pustulæ,
quæcumque sunt, aperiendæ. Tum impo-
nenda ea, quæ putrem carnem exedant. 5
Ubi inflammatio sublata, ulcusque purga-
tum est, imponi lene medicamentum de-
bet. In altero autem genere, possunt pro-
ficere mala cotonea in vino cocta, atque
273. contrita: potest emplastrum vel Heræ, vel 10
262. τετραφάρμακον; cui quinta pars thuris
adjecta sit; potest nigra hedera ex vino au-
stero cocta, ac, si celeriter malum serpit,
non aliud magis proficit. Purgato ulcere,
quod in summa cute esse proposui, satis ad 15
sanitatem eadem lenia medicamenta pro-
ficiunt.

5. De Chironio ulcere. k

Chironium autem ulcus appellatur,
quod & magnum est, & habet* oras duras, 20
callosas, tumentes. Exit sanies non multa,
sed tenuis: odor malus. neque in ulcere,
neque in ejus tumore ulla est inflammatio:
dolor modicus est. Nihil serpit, ideoque
nullum periculum adfert; sed non facile 25
sanescit. Interdum tenuis cicatrix induci-
tur, deinde iterum rumpitur, ulcusque
renovatur. Fit maxime in pedibus & cru-
ribus.

Super id imponi debet, quod & lene ali- 30
quid, & vehemens, & reprimens habeat.
Quale ejus rei causa fit ex his: squamæ
æris, plumbi eloti combusti, singulorum
P. VI. *. cadmiæ, ceræ, singulorum P. VIII.

*. rosæ

*. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

6. De Ulceribus, quæ ex frigore in pedibus
& manibus oriuntur.

5 Fiunt etiam ex frigore hiberno 1 ulcera, maxime in pueris, & præcipue pedibus, digitisque eorum, nonnunquam etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulæ oriuntur, de-
10 inde exulceratio. Dolor autem modicus: prurigo major est. Nonnunquam humor exit, sed non multus; qui referre vel pus, vel saniem videtur.

In primis multa calida aqua fovendum
15 est, in qua rapa decocta; aut si ea non sunt, aliquæ verbenæ ex reprimentibus. Si nondum adaperitum ulcus est, æs, quam maxime calidum quis pati potest, admovendum est. Si jam exulceratio est, imponi debet alu-
20 men, æqua portione cum thure contritum, tum vino adjecto; aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est, hic quoque melius lenia medicamenta proficiunt.

25 7. De Struma. m

Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine quasi glandulæ oriuntur. Quæ vel præcipue fa-
30 tigare medicos solent, quoniam & febres movent, nec unquam facile maturescunt; &, sive ferro, sive medicamentis curantur, plerunque iterum juxta cicatrices ipsas resurgunt; multoque post medicamenta sæpius. quibus id quoque accedit, quod
X 2 longo

1 Æginet. III, 79. m Aëtius Tetrab. IV. Serm. III. c. 5. Actuar. Meth. Med. II. 12. Ægin. IV, 33. Oribas. Synopsis. VII, 29.

longo spatio detinent. Nascuntur maxime in cervice; sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque foeminarum se reperisse, chirurgus Meges auctor est.

Propter hæc & album veratrum recte datur, atque etiam sæpius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur, quæ humorem vel educant, vel dissipent; quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoque quidam utuntur, quæ exedunt, crustaque eum locum adstringunt: tum vero ut ulcus curant. Quæcunque autem ratio curandi est, corpus, puro ulcere, exercendum atque alendum est, donec ad cicatricem perveniat. Quæ cum medici doceant, ab iis requirenda. Quorundam rusticorum experimento cognitum, quem struma male habet, eum, si anguem edit, liberari.

383,
11.

8. De Furunculo. n

Furunculus vero, est tuberculum acutum cum inflammatione, & dolore; maximeque ubi jam in pus vergit. Qui ubi ad apertus est, & exiit pus, subter apparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra; quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur: maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quæ maturius liberet.

Proprium ejus medicamentum galbanum est. sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cætera defunt, imponi debet,

pri-

primum, non pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde, si non repressit, quodlibet puri movendo accommodatum. si ne id quidem est, vel resina, vel fermentum.

5 Expressio pure, nulla ultra curatio necessaria est.

9. De Phymate.

396,

20.

Phyma vero nominatur tuberculum fur-

runculo simile, sed rotundius & planius,

10 sæpe etiam majus. Nam furunculus ovi dimidii magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phyma etiam latius patere consuevit: sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Ubi divulsum est, pus eodem

15 modo apparet: ventriculus qui in furunculo, non invenitur: verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris

& sæpius nascitur, & facilius tollitur: in juvenibus rarius oritur, & difficilius cura-

20 tur. Ubi ætas induravit, ne nascitur quidem. Quibus vero medicamentis discuteretur, supra propositum est.

258,

19.

10. De Phygethlo. k

φύγεθλον autem est tumor, non altus, sed

25 latus, in quo quiddam pustulæ simile est. Dolor distentioque vehemens est, & major quam pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricula. idque tarde maturescit, neque magnopere in pus convertitur. Fit

30 maxime aut in cervice, aut in alis, aut in inguinibus. Panum, ad similitudinem figuræ, nostri vocant. Atque idipsum quo medicamento tolleretur, supra demon-

stravi. 255.

II. *De Abscessibus.* 1

Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium, totum ad suppurationem spectans. Idque fere fit aut post febres, aut post dolores partis alicujus, maximeque eos, qui ventrem infestarunt. Sæpiusque oculis expositum est, siquidem latius aliquando intumescit ad similitudinem ejus, quod *φύμα* vocari proposui, rubetque cum calore, & paulo post etiam cum duritia, magisque nocenter adolescit, & sitim vigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum incute deprehendi potest; maximeque, ubi altius pus movetur: sed cum siti vigiliaque sentiuntur intus aliquæ punctiones. Et, quod de subito durius non est, melius est: & quod, quamvis rubet, coloris tamen in album mutati est. quæ signa jam pure oriente nascuntur: tumor enim ruborque multo ante incipiunt.

Sed, si locus nobilis est, avertendus materiæ aditus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant: qualia & alias & paulo ante in erysipelate proposui. Si jam durior est, ad ea veniendum est, quæ digerant, & resolvant: qualis est ficus arida contusa: aut fex mista cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit; aut cucumeris silvestris radix, cui ex farina duæ partes adjectæ sint, ante ex mulso decoctæ. Licet etiam miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum, pondusque adjicere myrrhæ dimidio minus,

nus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque & malagmata idem efficiunt, quæ supra explicui.

Quod per hæc discussum non est, necesse est, maturescat. Idque quo celerius fiat, imponenda est farina ordeacea, ex aqua cocta, cui & olerum aliquid recte miscetur. Eadem aut hæc in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina proprietatesque supra edidi, recte fiunt. Eademque omnium curatio: tantummodo distat. Crudum est autem, in quo major quasi venarum motus est, & gravitas, & ardor, & distentio, & dolor, & rubor, & durities; & si major abscessus est, horror, atque etiam febricula permanet: penitiusque condita suppuratione pro his, quæ alioqui cutis ostendit, punctiones sunt. Ubi ista remiserunt, jamque is locus prurit, & aut sublividus, aut subalbidus est, matura suppuratio est. Ex qua, ubi vel per se, vel per medicamenta, vel etiam ferro aperta est, pus debet emitte. Tum, si qua in alis, vel inguinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoque partibus, si ima plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si valet corpus, æque linamenta supervacua sunt. In reliquis, parce tamen, nec, nisi magna plaga est, imponi debent. Commode vero mel super linamenta, vel sine his imponitur lenticula ex melle, aut mallicorium ex vino coctum. quæ & per se & mista idonea sunt.

Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, vel malva contrita, vel fœni Græci linive semen ex passo coctum superdandum est. Quicquid deinde impositum est, non adstringi, sed modice deligari debet. Illo neminem decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera, quæ pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, conveniuntque vulneribus, exposita sunt.

412.

12. De Fistulis. m

413.

Nonnunquam autem ex ejusmodi abcessibus, & ex aliis ulcerum generibus, fistulæ oriuntur. Id nomen est ulceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis: habetque quædam in singulis locis propria. Prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. siquidem aliæ breves sunt, aliæ altius penetrant: aliæ rectæ intus feruntur, aliæ multoque plures transversæ: aliæ simplices sunt, aliæ duplices triplicesve; quæ ab uno ore orfæ intus tres fiunt, aut etiam in plures sinus dividuntur: aliæ rectæ, aliæ flexæ, & tortuosæ sunt: aliæ intra carnem desinunt, aliæ ad ossa aut cartilagineam penetrant; aut, ubi neutrum horum subest, ad interiora perveniunt: aliæ deinde facile, aliæ cum difficultate curantur, atque etiam quædam insanabiles reperiuntur.

Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra * carnem. Adjuvatque ipsam corpus, si juvenile, si firmum est. Inimica contraria his sunt: itemque, si fistula os, vel

vel cartilaginem, vel nervum, vel musculos læsit; si articulum occupavit; si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vulvam, vel ad grandes venas arteriasve, vel ad
5 maxillas, guttur, stomachum, thoracem penetravit. Ad intestina quoque eam tendere, semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est.

Ante omnia autem demitti specillum in fistulam convenit; ut, quo tendat, & quam alte perveniat, scire possimus. Simul etiam, prorsus humida, an ficcior sit: quod extra-
5 cto specillo patet. Id quoque dici potest, in osse vitium sit, necne: &, si jam eo fistula penetravit, quatenus nocuerit. Nam, si molle est, quod ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est: si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi de-
inde si dilabitur specillum, nondum caries est: si non dilabitur sede, qua innititur, caries quidem, verum adhuc levis est: si inæ-
quale quoque & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago ubi sub-
5 sit, ipsa sedes docet: perventumque esse ad eam, ex renisu patet.

Ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxæ. Simples vero hæ
0 sint, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris. Cujus si plus fertur, quam quod simplici spacio convenit, plures sinus esse manifestum est. Cumque fere juxta sint caro, & nervus, & ali-

qua nervosa, quales fere tunicae membranæque sunt, genus quoque puris docebit, num plures sinus intus diversa corporis genera perferant. Siquidem ex carne pus læve, album copiosius fertur: at ex nervoso loco, coloris quidem ejusdem, sed tenuius & minus: ex nervo, pingue & oleo non dissimile. Denique etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae penetrarint, quia sæpe, cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocavit, pus ferri, quod jam defierat, iterum incipit; testaturque, non solum alium sinum esse, ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere.

Si in carne & recens & simplex est; ac neque sinuosa neque cava sede; neque in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore movetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem vel alumen, vel squamam æris, vel æruginem, vel ex metallicis aliquid. Exque eo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Idque ea parte, qua tenuius est, antecedente demitti oportet in fistulam, donec purus sanguis se ostendat. quæ in omnibus fistularum collyriis perpetua sunt. Idem, deinde emplastrum in linteolo superimponendum; supraque injicienda spongia est, in acetum ante demissa: solvique quinto die satis est. Genus victus adhibendum est, quo carnem ali docui.

At,

At, si longius à præcordiis fistula est, ex intervallo jejunum radículas esse, deinde vomere, necessarium est.

Quum vetustate callosa fit fistula (callus 300, 9.
5 autem neminem fallit, quia durus est, & aut albus, aut pallidus) tum validioribus medicamentis opus est. Quale est, quod habet papaveris lachrymæ P. I. *. gummi P. III. *. cadmiæ P. IIII. *. atramenti sutorii P. VIII. *. ex quibus aqua coactis collyrium fit. Aut in quo sunt gallæ P. I. *. æruginis, sandarachæ, aluminis Ægyptii singulorum P. I. *. atramenti sutorii combusti P. II. *. Aut quod constat ex chalcitide, & è saxo calce; quibus adjicitur auripigmenti dimidio minus, quàm in singulis prioribus est; eaque melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, n æruginis rasæ P. II. *. conterere, deinde ammoniaci thymiamatis P. II. *. aceto liquare, eoque infuso æruginem cogere. Idque ex primis medicamentis est. Sed, ut hæc maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est callum quibuslibet adurentibus medicamentis erodere: satisque est vel papyrus intortum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrii adstrictum eo illinere. Scilla quoque cocta & mixta cum calce, callum exest.

30 Si quando vero longior & transversa fistula est, demisso specillo, contra principium hujus incidi commodissimum est, & collyrium, * quod volueris demitti.

At si duplicem esse fistulam vel multiplicem

n Oribas. Synopf. VII, 30. * Edit. Aldi, Steph. utramque, alii legunt utrinque.

cem existimamus, sic tamen ut brevis, intraque carnem sit, collyrio uti non debemus; quod unam partem curet, reliquas omittat: sed eadem medicamenta arida in calamum scriptorium conjicienda sunt,isque ori fistulæ aptandus, inspirandumque, ut ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex vino liquanda sunt; vel, si sordidior fistula est, ex mulso; si callosior, ex aceto; atque intus infundendum, quicquid inditum est. Superponenda sunt, quæ refrigerent & reprimant. nam fere, quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque alienum est, ubi quis resolverit, antequam rursus alia medicamenta injiciat, per oricularium clysterem fistulam eluere; si plus puris fertur, vino; si callus durior est, aceto; si jam purgatur, mulso, vel aqua, in qua ervum coctum sit, sic ut huic quoque mellis paululum adjiciatur.

Fere vero fit, ut ea tunica, quæ inter foramen & integram carnem est, victa tot medicamentis exeat, infraque ulcus purum sit. Quod ubi contingit, imponenda glutinantia sunt; præcipueque spongia melle cocto illita. Neque ignoro, multis placuisse linamentum in modum collyrii compositum & tinctum melle, implendi causa demitti. sed celerius sic glutinantur, quam impletur. Neque verendum est, ne purum corpus puro corpori junctum non coeat, adjectis quoque medicamentis ad id efficacibus; cum sæpe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo in unum eos jungat.

13. De Ulceris genere, quod *κηρίον* nominatur.

Est etiam ulceris genus, quod à favi similitudine *κηρίον* o Græcis nominatur. Idque duas species habet. Alterum est subalbidum, & furunculo simile; sed majus, & cum magno dolore. Quod, ubi maturescit, habet foramina; per quæ fertur humor glutinosus, & purulentus; nec tamen ad justam maturitatem pervenit. Si divisum est, multo plus intus corrupti, quam in furunculo, apparet, altiusque descendit. Raro fit nisi in capillis.

Alterum est minus, & super caput emittens, durum, latum, subviride, subpallidum, magis exulceratum: siquidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quæ fertur humor glutinosus, subpallidus, crassitudinem mellis, aut visci referens, interdum olei: &, si inciditur, viridis intra caro apparet. Dolor autem, & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoque febrem movere consuerint.

Super id, quod minus crebris foraminibus exasperatum est, recte imponitur & ficus arida, & lini semen* in mulso coctum, & emplastra ac malagmata materiam educentia, aut quæ proprie hac pertinentia supra posui.

Super alterum, & eadem medicamenta, & farina ex mulso cocta, sic ut ei dimidium resinæ terebinthinæ misceatur; & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adjectum; & uvæ taminix pars quarta fico adjecta. Quod si parum in utrolibet genere

*o Actuar. M. M. II, 12. & IV, 16. Aeginet. III, 3.
Trallian, I, 9. * Al. quod in vino.

genere medicamenta proficiunt; totum ulcus usque ad sanam carnem excidi oportet. Ulcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt; primum, quæ pus ci- tent; deinde, quæ purgent, tum, quæ im- pleant.

14. De *Acrochordone*, & *Thymio*,
& *Myrmeciis*, & *Clavo*.

Sunt vero quædam verrucis p similia; quorum diversa nomina, ut vitia sunt. *Ἀκροχόρδονα* Græci vocant, ubi sub cu- te coit aliquid durius, & interdum paulo asperius, coloris ejusdem; infra ad cutem tenue, supra latius. Idque modicum est, quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur; sed fere plura, maximeque pueris: eaque non- nunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. sunt, quæ etiam in pus convertuntur.

Ἀκροθύμιον q nominatur, quod super cor- pus quali verrucula eminet, ad cutem la- tius, supra tenue, subdurem, & in summo perasperum. Id, qua summum, colorem flo- ris thymi repræsentat; unde ei nomen est; ibique facile finditur, & cruentatur; non- nunquam aliquantum sanguinis fundit: fe- reque circa magnitudinem fabæ Ægyptiæ est, raro majus, interdum perexiguum. Modo autem unum, modo plura nascun- tur, vel in palmis, vel in inferioribus pe- dum partibus: pessima tamen in obscœnis sunt; maximeque ibi sanguinem fundunt.

Μυρμήκια r autem vocantur humiliora
thymio

p Æginet. IV, 15. VI, 87. q Aëtius Tetrab. IV. Serm. II, 3. Oribas. Synopf. VII, 39. r Actuarius, M, M. II, 11. Oribas. Synopf. VII, 43.

thymio durioraque. quæ radices altius exigunt, majoremque dolorem movent, infra lata, supra autem tenuia, minus sanguinis mittunt: magnitudine vix unquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoque aut in palmis aut in inferioribus partibus pedum.

Clavus s. autem nonnunquam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, præcipue autem ex contuso, quamvis interdum aliter: doloremque, etiamsi non alias, tamen ingredienti movet.

Ex his Acrochordon & acrothymium sæpe etiam per se finiuntur, &, quo minora sunt, eo magis. Myrmecia & clavi sine curatione vix unquam desinunt. Acrochordon, si excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. Acrothymio clavoque excisis, subrotunda radícula nascitur, quæ penitus descendit ad carnem: eaque relicta, idem rursus exit. Myrmecia latissimis radicibus inhærent: ideoque ne excidi quidem sine magna exulceratione possunt. Clavum subinde raderé, commodissimum est. nam sine ulla vi sic mollescit. at, si sanguinis quoque aliquid emissum est, sæpe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulveris paululum, quem ex lapide molari contrito fecit. Cætera vero genera medicamentis adurenda sunt. Aliisque id, quod ex fece vini: myrmeciis id, quod ex alumine & sandaracha fit, aptissimum

simum est. Sed ea, quæ circa sunt, foliis contegi debent, ne ipsa quoque exulcerentur: deinde postea lenticula imponi. Tolle acrothymium etiam ficus in aqua decocta.

15. De Pustularum generibus.

t At pustulæ maxime vernis temporibus oriuntur. Earum plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus partemve aspreudo quædam fit, similis his pustulis, quæ ex urtica, vel ex sudore nascuntur: *ὑἕλαι θήματα* Græci vocant. eæque modo rubent, modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures, similes varis oriuntur, nonnunquam majores. Pustulæ, lividæ, sunt, aut pallidæ, aut nigræ, aut aliter naturali colore mutato: subestque illis humor. Ubi hæ ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet. *φλύκταινα* x *ἐλκιδίς* Græce nominantur. Fiunt vel ex frigore, vel ex igni, vel ex medicamentis.

Φλυζάκιον autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta. ex qua ipsa quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis vero nonnunquam etiam ulcuscula fiunt, aut aridiora, aut humidiora: & modo tantum cum prurigine, modo etiam cum inflammatione ac dolore, exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id evenit in ætate puerili: raro, in medio corpore: sæpe, in eminentibus partibus.

Pessima pustula est, quæ *ὑἑνωκτίς* vocatur. Ea colore vel sublivida, vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem

vehe-

t Aphor. III, 20. v Actuar. M.M. II, 11. Trall. I, 5.
x Actuar. M.M. VI, 8. y Actuar. M. M. II, 11. Oribas. Synopf. VII, 37. 42.

vehemens inflammatio est; & cum aperta est, reperitur intus exulceratio mucosa, colore humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem ejus est: neque enim ea faba major est. Atq; hæc quoq; oritur in eminentibus partibus, & fere noctu. unde nomen quoque à Græcis ei *ἐπιρυκτις* est impositum.

In omni vero pustularum curatione primum est, multum ambulare, atque exerceri: si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuere: abstinere ab omnibus acribus & extenuantibus. eademque nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Præter hæc, is, qui tam robustus est, si pustulæ minutæ sunt, desudare in balneo debet; simulque super eas nitrum inspergere; oleoque vinum miscere, & sic ungi; tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si majus pustularum genus occupavit, imponenda lenticula est; detractaque summa pellicula, ad medicamenta lenia transeundum. *Ἐπιρυκτις* post lenticulam, recte herba quoque sanguinali, vel viridi coriandro curatur.

Ulcera vero ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fœni Græci mixta sic, ut his invicem rosa atque intubi succus adjiciatur, donec mellis crassitudo ei fiat. Proprie ad eas pustulas, quæ infantes male habent, lapidis, quem *πυρίτλω* Græci vocant, p. VIII. *. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adjiciunturque olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustulæ debent, & tum hoc illini.

Y

16. De

Scabies vero est durities cutis rubicundior. ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciore. Exit ex quibusdam sanies; fitque ex his continuata 5 exulceratio pruriens; serpitque in quibusdam cito. Atque in aliis quidem ex toto definit, in aliis vero certo tempore anni revertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur. Itaque 100 eam, quæ talis est, *αἰσχρά* Græci appellant, id est feram.

340.
14.

In hac quoque victus ratio eadem, quæ supra, necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est; 150 quod fit ex spodii, croci, æruginis, singulorum P. I. *. piperis albi, omphacii, singulorum P. I. *. cadmiæ P. VIII. *. At, ubi jam exulceratio est, id, quod fit ex sulphuris P. I. *. ceræ P. IV. *. picis liquidæ hemina, olei sextariis duobus. quæ simul usque 200 ad crassitudinem mellis incoquantur. Est etiam, quod ad Protarchum authorem refertur. Habet hoc farinæ lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidæ heminam, resinæ humidæ selibram, 250 aceti cyathos tres. Crocum quoque, lyrium, ærugo, myrrha, cinis, æquis portionibus recte miscentur, & ex passio coquantur. Idque omnem utique scabiem 300 sanat. Ac, si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, vel sulphur pici liquidæ mistum, sicut de pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulantur 17. De

255,
16.

17. *De Impetiginis speciebus.* b

Impetiginis vero species sunt quatuor. Minime mala est, quæ similitudine scabiem repræsentat. nam & rubet, & durior est, & exulcerata, & rodit. Distat autem ab ea, quæ magis exulcerata est, & varis similes pustulas habet; videnturque esse in ea quasi bullulæ quædam, ex quibus interposito tempore quasi squamulæ solvuntur, certioribusque hæc temporibus revertitur.

Alterum genus est pejus & simile papulæ fere, sed asperius rubicundiusque, figuras varias habens: squamulæ ex summa cute decidunt, rosio major est, celerius & latius procedit, certioribusque etiam, quam prior, temporibus & fit, & desinit. Rubra cognominatur.

Tertia etiamnum deterior est, nam & crassior est, & durior, & magis tumet; in summa cute finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra est: proceditque & latet, nec tardat: minus vero errat in temporibus, quibus aut oritur, aut desinit; neque ex toto tollitur. Nigræ cognomen est.

Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore. nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile; squamulasque habet pallidas, quasdam subalidas, quasdam lenticulæ similes: quibus demptis, profluit sanguis nonnunquam. Alioqui vero humor ejus albidus est, cutis dura atque fissæ est, proceditque latius.

Hæc vero omnia genera maxime oriuntur in pedibus, & manibus; atque un-

Y 2

gues

338.
23.

gues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quam quod ad scabiem quoque pertinere sub authore Protarcho retuli. Serapion autem, nitri p. ii. * sulphuris p. iv. * excipiebat resina 5 copiosa, eoque utebatur.

18. De papulis.

338.
11.

Papularum vero duo genera sunt. Alterum est, in quo per minimas pustulas cutis exasperatur, & rubet, leviterque roditur, medium habet pauxillo levius: tarde serpit. idque vitium maxime rotundum incipit, eademque ratione in orbem procedit. Alterum est, quam *αγρία* Græci appellant. In qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturque, ac vehementius & roditur, & rubet, & interdum etiam pilos remittit.

Quæ minus rotunda est, difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginem vertitur. Sed levis papula etiam, si jejuna saliva quotidie defricetur, sanescit. Major, commodissime murali herba tollitur, si super eadem trita est. Ut vero ad composita medicamenta veniamus, idem illud Protarchi tanto valentius in his est, quanto minus in his vitii est. Alterum ad idem, Miconis: nitri rubri, thuris, singulorum p. i. *. cantharidum purgatarum p. ii. *. sulphuris ignem non experti tantundem, resinae terebinthinæ liquidæ p. xx. *. farinæ lolii sext. iii. git cyathi tres, picis crudæ sext. unum.

19. De Vitiliginis speciebus, id est, de Alphi,
& Melane, & Leuce. c

Vitiligo quoque, quamvis per se nullum
periculum adfert: tamen & foeda est, & ex
5 malo corporis habitu fit. Ejus tres species
sunt. Α'λφ^o vocatur, ubi color albus est,
fere subasper & non continuus, ut quaedam
quasi guttæ dispersæ esse videantur. Inter-
10 dum etiam latius, & cum quibusdam in-
termiſſionibus serpit. Μέλας colore ab hoc
differt, quia niger est, & umbræ similis.
cætera eadem sunt. Λεύκη habet quiddam
simile alphi, sed magis albida est, & altius
descendit; in eaque albi pili sunt, & lanu-
15 gini similes. Omnia hæc serpunt: sed in
aliis celerius, in aliis tardius. Alphas &
Melas in quibusdam variis temporibus
oriuntur & desinunt. Leuce, quem occu-
pavit, non facile dimittit.

20 Priora curationem non difficillimam re-
cipiunt: ultimum vix unquam sanescit; ac,
si quid ei vitio demptum est, tamen non
ex toto sanus color redditur. Utrum autem
aliquod horum sanabile sit, an non; experi-
25 mento facile colligitur. Incidi enim cutis
debet, aut acu pungi. si sanguis exit, quod
fere fit in duobus prioribus, remedio locus
est: si humor albidus, sanari non potest.
Itaque ab hoc quidem abstinendum est.

30 Super id vero, quod curationem recipit,
imponenda lenticula mixta cum sulphure
& thure, sic, ut ea contrita ex aceto sit.
Aliud ad idem, quod ad Irenæum autho-
rem refertur. Alcyonium, nitrum, cumi-
Y 3 num,

num, fici folia arida paribus portionibus contunduntur, adjecto aceto. His in sole vitiligo perungitur: deinde non ita multo post, ne nimis erodatur, eluitur. Proprie quidem, Micone authore, eos, quos Alphos 5 vocari dixi, hoc medicamento perungunt: sulphuris p. II. *. nitri p. IV. *. myrrhæ aridæ contritæ acetabulum miscent, deinde in balneo super vitiliginem inspergunt farinam ex faba, tum hæc inducunt. Hi vero, quos Melanas vocari dixi, curantur, cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba, eaque sine oleo in balneo ante sudorem insperguntur, ac tum genus id vitiliginis defricatur. 15

LIBER SEXTUS.

C A P. I.

De Vitiis singularum corporis partium.

DIXI de his vitiis, quæ per totum corpus orientia, medicamentorum auxilia desiderant. nunc ad ea veniam, quæ non nisi in singulis partibus incidere 25 consueverunt, orsus à capite.

1. De Capillis fluentibus. a.

In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem sæpe radendo succurritur. Adjicit etiam vim quandam ad continendum, la- 30 danum cum oleo * mistum. Nunc de his capillis loquor, qui post morbum fere fluunt. Nam, quo minus caput quibusdam ætate

343.
27.

nu-
a Trallian. I. 2. Actuarius. M. M. II, 5. IV, 9. Oribasius. de Loc. Affect. Cur. IV, 5. * Scilicet myrteo. Theophrastus. Priscianus. I. 2.

C A P. II.

5 De Porrigine. 2

PORRIGO autem est, ubi inter pilos
quædam quasi squamulæ surgunt, eæque
à cute resolvuntur; & interdum ma-
10 dent, multo sæpius siccæ sunt. Idque evenit,
modo sine ulcere, modo exulcerato loco.
Huic quoque modo malo odore, modo nullo
accedente. Fereque id in capillo fit,
rarius in barba, aliquando etiam in super-
15 cilio. Ac neque sine aliquo corporis vitio
nascitur, neque ex toto inutile est. Nam
bene integro capite, non exit: ubi aliquod
in eo vitium est, non incommodum est,
summam cutem potius subinde corrumpi,
20 quam id, quod nocet, in aliam partem magis
necessariam verti.

Commodius est ergo subinde peccando
repurgare, quam id ex toto prohibere. Si
tamen ea res magis offendit (quod nimium
25 humore sequente fieri potest; magisque, si
is etiam mali odoris est) caput sæpe radendum
est; dein id super adjuvandum aliquibus
ex leviter reprimantibus. quale est
nitrum cum aceto, vel ladanum cum myr-
30 teo & vino, vel myrobalanum cum vino.
Si parum per hæc proficitur, vehementioribus
uti licet; cum eo, ut sciamus, utique
in recenti vitio id inutile esse.

C A P. III.

De Sycoſi. a

EST etiam ulcus, quod à fici ſimilitudine *σύκωσις* à Græcis nominatur, quia caro in eo excreſcit: & id quidem generale eſt. Sub eo vero duæ ſpecies ſunt. Altera, ulcus durum & rotundum eſt: altera, humidum & inæquale. Ex duro exiguum quiddam & glutinoſum exit: ex humido plus, & mali odoris. Fit utrumque in iis partibus, quæ pilis conteguntur: ſed, id quod calloſum & rotundum eſt, maxime in ^b barba; id vero, quod humidum, præcipue in capillo.

Super utrumque oportet imponere elaterium, aut lini ſemen contritum & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplaſtrum tetrapharmacum ex aceto ſubactum. Terra quoque Eretria ex aceto liquata recte illinitur.

C A P. IV.

De Areis.

AREARUM quoque duo genera ſunt. ²⁵ Commune utrique eſt, quod, emortua ſumma pellicula, pili primum extenuantur; deinde excidunt: ac, ſi ictus iſto locus eſt, ſanguis exit liquidus, & mali odoris: increſcitque utrumque in aliis celeriter, in ³⁰ aliis tarde. Pejus eſt, quod denſam cutem, & ſubpinguem, & ex toto glabram fecit. Sed ea, quæ *αλωπεκία* ^b nominatur, ſub qualibet figura dilatatur. Fit & in capillo, & in ^{barba.}

a Æginet. III, 3. Actuar. M. M. II, 5. Oribas. de Loc. Affect. Cur. IV, 52. Trall. I, 5. b Trallian. I. 1. Priscian. L. I. c. 6.

barba. Id vero, quod à serpentis similitudine *ὀφίαισις* c appellatur, incipit ab occipitio: duorum digitorum latitudinem non excedit: ad aures duobus capitibus serpit; quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet ætate est: hoc fere in infantibus. Illud vix unquam sine curatione: hoc per se sæpe finitur.

Quidam hæc genera arearum scalpello exasperant. quidam illinunt adurentia ex oleo; maximeque chartam combustam. quidam resinam terebinthinam cum thapsia inducunt. Sed nihil melius est, quam novacula quotidie radere: quia, cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radiculæ. Neque ante oportet desistere, quam frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur, illini atramento futorio satis est.

C A P. V.

*De Varis, & Lenticulis,
& Ephelide,^a*

PENE ineptiæ sunt, curare varos, & lenticulas, & ephelidas: sed eripi tamen foeminis cura cultus sui non potest. Ex iis autem, quæ supra proposui, vari lenticulæque vulgo notæ sunt; quamvis rarior ea species est, quam *φακίαν* Græci vocant, cum sit ea lenticula rubicundior, & inæqualior. *Ἐφελίς* vero à plerisque ignoratur: quæ nihil est, nisi asperitas quædam & durities mali coloris. Cætera non nisi in facie:

Y 5

cie;

c Oribas. deloc. Affect. Cur. IV, 42. Aëtuar. M. M. V, 13. a Æginet. III, 1.

cie: lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. de qua per se scribere alio loco, visum operæ pretium non est.

Sed vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quam ipsa est, aluminis scissilis, & paulum mellis adjectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum pares portiones habent, contritæque ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum est, &, interpositis pluribus horis, mane eluendum, oleoque leviter unguendum.

Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis & paulum mellis adjectum est. Ad omnia vero ista atque etiam ad colorandas cicatrices, prodest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem authorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, crocomagmatis, cretæ cimoliæ subceruleæ, nucum amararum, farinæ hordei atque ervi, struthii albi, fertulæ campanæ seminis. quæ omnia contrita, melle quam amarissimo coguntur, illitumque à vespere usque mane eluitur.

C A P. V I.

*De oculorum morbis : & primo de his,
qui lenibus medicamentis
curantur. a*

SEd hæc quidem mediocria sunt. b Ingen-
tibus vero & variis casibus oculi no-
stri patent. Qui cum magnam partem
ad vitæ simul & usum & dulcedinem con-
ferant, summa cura tuendi sunt.

Pro-

a Aëtuar. M. M. IV, II. VI, 5. III, 22.

b Trallian. II, I.

Protinus autem orta lippitudine, quædam notæ sunt, ex quibus, quid eventurum sit, colligere possimus. Nam, si simul & lacryma & tumor & crassa puituita cœperint; si ea pituita lachrymæ mista est; neque lachryma calida est, pituita vero alba & mollis, tumor non durus, longæ valetudinis metus non est. At si lachryma multa & calida, pituitæ paulum, tumor modicus, idque in uno oculo est; longum id sed sine ^{331.}periculo, futurum est. Idque lippitudinis ^{411.}genus minime cum dolore est; sed vix ante vigesimum diem tollitur; nonnunquam per duos menses durat, quandoque brevius finitur.

Si pituita alba & mollis esse incipit; lachrymæque miscetur, aut, si simul hæ utrumque oculum invaserunt, potest esse brevior, sed periculum ulcerum est. Pituita autem sicca & arida dolorem quidem movet, sed maturius desinit; nisi quid exulceravit.

Tumor magnus si sine dolore est, & siccus, sine ullo periculo est: si siccus quidem, sed cum dolore est, fere exulcerat; & nonnunquam ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris pupillisve est; ubi, super magnum dolorem, lachrymæ falsæ calidæque eunt; aut etiam si, tumore jam finito, diu lachryma cum pituita profluit.

Pejus etiamnum est, ubi pituita pallida aut livida est, lachryma calida aut multa profluit, caput calet, à temporibus ad oculos

los dolor pervenit, nocturna vigilia urget. siquidem sub his oculus plerumque rumpitur, votumque est, ut tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula juvat. Si foras jam ruptus procedit, sine auxilio est. Si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. At, si asperum, & crassum est, etiam post curationem vestigium aliquod relinquit.

Curari vero oculos sanguinis detractio-
ne, medicamento, balneo, fotu, vino, vetu-
stissimus author Hippocrates a memoriae
prodidit. Sed eorum tempora & causas pa-
rum explicuit: in quibus Medicinæ sum-
ma est. Neque minus in * abstinencia & alvi
ductione sæpe auxilii est. Hos igitur inter-
dum inflammatio occupat: ubi cum tumore
in his dolor est; sequiturque pituitæ cur-
sus, nonnunquam copiosior vel acrior, non-
nunquam utraque parte moderatior. In
ejusmodi casu prima omnium sunt quies
& abstinencia. Ergo primo die, loco ob-
scuro cubare debet sic, ut à sermone quo-
que abstineat: nullum cibum assumere; si
fieri potest, ne aquam quidem; sin minus,
certe quam minimum ejus.

Quod si graves dolores sunt, commo-
dius secundo die; si tamen res urget, etiam
primo † sanguis mittendus est; utique si in
fronte venæ tument, si firmo corpore ma-
teria superest: Si vero minor impetus, mi-
nus acrem curationem requirit. Alvum
non nisi secundo tertiove die duci oportet.
At modica inflammatio neutrum ex his
auxi-

a Aphor. VI, 31. * Marcell, de Medic. c. 8.

† Idem ibid.

auxilium desiderat: satisque est, uti quiete
& abstinentia.

Neque tamen in lippientibus longum je-
junium necessarium est, ne pituita tenuior
atque acrior fiat: sed secundo die dari de-
bet id, quod levissimum videri potest ex
iis, quæ pituitam faciunt crassiores; qua-
lia sunt ova sorbilia: si minor vis urget,
pulticula quoque, aut panis ex lacte. In se-
quentibus diebus, quantum inflammationi
detrahatur, tantum adjici cibus poterit; sed
generis ejusdem: utique ut nihil falsum,
nihil acre, nihil ex his, quæ extenuant, su-
matur; nihil potui præter aquam. Et vi-
ctus quidem ratio talis maxime necessaria
est.

Protinus autem primo die, † croci p. i. *.
& farinæ candidæ quam tenuissimæ p. ii. *.
excipere oportet ovi albo, donec mellis
crassitudinem habeat: idque in linteolum
illinere, & fronti agglutinare, ut, compres-
sis venis, pituitæ impetum cohibeat. Si cro-
cum non est, thus idem facit. Linteolo an
lana excipiat, nihil interest. Superinun-
gi vero oculi debent sic, ut croci quantum
tribus digitis comprehendi potest, sumat-
ur, myrrhæ ad fabæ, papaveris lachrymæ
ad lentis magnitudinem, eaque cum passo
conterantur, & specillo super oculos indu-
cantur. Aliud ad idem: mirrhæ p. i. *.
§ madragoræ succi p. ii. *. papaveris la-
chrymæ p. ii. *, foliorum rosæ, cicutæ se-
minis, singulorum p. i i i. *. acaciæ p. iv.
*. gummi p. vi i i. *. Et hæc quidem inter-
diu

† Marcell. de Medic. c. 8.

§ Idem ibid.

diu: noctu vero, quo commodior quies veniat, non alienum est, superimponere candidi panis interiorem partem ex vino subactam. nam & pituitam reprimit, &, si quid lachrymæ processit, absorbet, & oculum glutinari non patitur.

Si grave id & durum, propter magnum oculorum dolorem, videtur, ovi & album & vitellus in vas defundendum est; adiciendumque eo mulsi paulum, idque digito permiscendum; ubi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quæ id excipiat, superque oculos imponi. Ea res & levis est, & refrigerando pituitam coercet, & non exarescit, & glutinari oculum non patitur. Farina quoque hordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta, commode imponitur. Neque ab ratione abhorret, etiam penicillo potissimum uti expresso, si levior impetus est, ex aqua; si major, ex posca. Priora fascia deliganda sunt, ne per somnum cadant: at hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso ægro commode potest: & quia, cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum aliquid dandum est, quæ *ἀνὰδονα* Græci appellant: satisque est puero, quod ervi; viro, quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum vero oculum primo die, nisi immodica inflammatio est, nihil recte conicitur: sæpe enim potius concitatur eo pituita, quam minuitur. At secundo die, gravi quoque lippitudine per indita medica-

men-

Cap. 6. *MEDICINA.* 351
menta recte succurritur, ubi vel jam sanguis missus, vel alvus ducta est; aut, neutrum necessarium esse, manifestum est.

2. *De diversis oculorum collyriis.*

5 Multa autem multorumque collyria ad id apta sunt; novisque etiamnum misturis temperari possunt; cum lenia medicamenta, & modice reprimentia, facile & varie misceantur. Ego autem nobilissima exequar.

3. *Philonis collyrium.*

Est igitur Philonis, quod habet cerussæ elotæ, spodii, gummi, singulorum p. i. *. papaveris lachrymæ combustæ p. i. *. Illud scire oportet, hæc quoque omnia medicamenta, singula primum per se teri, deinde mista iterum, adjecta paulatim vel aqua, vel alio humore. Gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime præstat, ut, ubi collyria diu facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur.

4. *Dionysii collyrium.*

Dionysii collyrium est: papaveris lachrymæ combustæ, donec tenerescat p. i. *. thuris combusti, gummi, singulorum p. ii. *. spodii p. iiii. *.

5. *Cleonis collyrium.* d

Cleonis nobile admodum: papaveris lachrymæ frictæ p. i. *. croci p. i. *. gummi p. *. v. quibus, cum teruntur, adjicitur rosæ succus. Aliud ejusdem valentius: squamæ ferri, quod *σέμαμα* † adpellant, p. i. *. croci p. ii. *. spodii p. iv. *. plumbi & eloti, & combusti p. i. *. gummi tantum-

d Oribas. Synops. LIII, de Collyriis. Æginet. VII, 16.

† Vide Sarracenum in Dioscorid. L. V. c. 90.

tundem. Ejus aliud quoque ad idem est, maxime ubi multa pituita profluit: castorei P. *. I. aloes P. *. I. myrrhæ P. *. II. cadmiæ curatæ P. VIII. *. stibii tantundem, acaciæ succi P. XII. *. quod, cum miscueris, in pixidicula servetur. Theodotus vero huic compositioni adjecit papaveris lachrymæ combustæ P. *. I. æris combusti & eloti P. II. *. nucleorum palmarum combustorum P. X. *. gummi P. XII. *.

e 6. *Theodoti collyrium, Acharistum appellatum.* 1

At ipsius Theodoti, quod à quibusdam ἀχάριστον nominatur, ejusmodi est: castorei, nardi Indici, singulorum P. I. *. lycii P. *. papaveris lachrymæ tantundem; myrrhæ P. II. *. croci, cerussæ elotæ, aloes, singulorum P. III. *. cadmiæ botryitidis elotæ, æris combusti, singulorum P. VIII. *. gummi P. XVIII. *. acaciæ succi P. XX. *. stibii tantundem; quibus aqua pluvialis adjicitur.

7. *Cythion vel Tephrrion collyrium.* 2

Præter hæc, ex frequentissimis collyriis est id, quod quidam Cythion, quidam à cinereo colore Tephrrion appellant. Habet amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum P. I. *. papaveris lachrymæ P. II. *. cerussæ elotæ P. IV. *. spumæ argenti elotæ P. VIII. quæ æque ex aqua pluviali conteruntur.

8. *Euelpidis collyrium, Trygodes nominatum.*

Euelpides autem, qui ætate nostra maximus fuit *ocularius medicus, utebatur eo, quod ipse composuerat, & τρυγώδες nominabat, 3

e Æginet. VII, 16. Paulo aliter exstat apud Marcellum de Medic. c. VIII, pag. 267. Ed. Steph. Est & aliud Theodotion Dionysianum pag. 274. eodem capite descriptum, nisi malis hoc referre ad mox antecedens Dionysii. Aliud exstat etiam pag. 281. * Marcell. de Medic. c. 8. p. 267. 274.

nabat. Habet autem hoc, castorei P. II. *.
lycii, nardi, papaveris lachrymæ, singulo-
rum P. I. *. croci, myrrhæ, aloes, singu-
lorum P. IV. *. æris combusti P. VIII. *.
5 cadmiæ, & stibii, singulorum P. XII. *.
acaciæ succi P. XXVI. *. gummi tantundem.

Quo gravior vero quæque inflammatio
est, eo magis leniri medicamento debet,
adjecto vel albo ovi, vel muliebri lacte. At,
10 si neque medicus, neque medicamentum
præsto est, sæpius utrumlibet horum in
oculos penicillo ad idipsum facto infusum,
id malum lenit. Ubi vero aliquis relevatus
est, jamque cursus pituitæ constitit, reli-
15 quias fortasse leviores futuras discutiant
balneum & vinum. Igitur lavari debet le-
viter, ante ex oleo perfricatus, diutiusque
in cruribus & feminibus; multaque calida
aqua fovere oculos; deinde per caput
20 prius calida, tum egelida perfundi: à bal-
neo cavere ne quo frigore afflatus læda-
tur: posthæc cibo paulo pleniore, quam
ex operum consuetudine, uti; vitatis ta-
men omnibus pituitam extenuantibus: vi-
5 num bibere lene; subausterum, modice
vetus; neque effuse, neque timide; ut ne-
que cruditas ex eo, & tamen somnus fiat,
lenianturque intus latentia acria. Sed, si
quis in balneo sensit majorem oculorum
0 perturbationem, quam attulerat (quod inci-
dere his solet, qui, manente adhuc pituitæ
cursu, festinarunt) quamprimum discedere
debet: nihil eo die vini assumere; cibi mi-
nus etiam, quam pridie. deinde cumpri-
Z mum

num satis pituita substitit, iterum ad usum balnei redire.

Solet tamen evenire nonnunquam, five tempestatum vitio, five corporis, ut pluribus diebus neque dolor, neque inflammatio, & minime pituitæ cursus finiatur. Quod ubi incidit, jamque ipsa vetustate res matura est, ab his eisdem auxilium petendum est, id est balneo ac vino. Hæc enim ut in recentibus malis aliena sunt; quia concitare ea possunt, & accendere: sic in veteribus, quæ nullis aliis auxiliis cessarunt, admodum efficacia esse consuerunt. videlicet hic quoque, ut alibi*, cum secunda vana fuerint, contrariis adjuvantibus. Sed ante tonderi ad cutem convenit: deinde in balneo aqua calida quamplurima caput atque oculos fovere: tum utrumque penicillo detergere, & ungere caput irino unguento: continereque in lectulo se; donec omnis calor, qui conceptus est, finiatur; desinatque sudor, qui necessario in capite collectus est. Tum ad idem cibi vinique genus veniendum est sic, uti potiones meracæ sint; obtegendumque caput, & quiescendum. Sæpe enim posthæc gravis somnus, sæpe sudor, sæpe alvi dejectio pituitæ cursum finit. Si levatum est malum (quod aliquando ferius fit) per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas restituatur. Si diebus eisdem alvus nihil reddit, ducenda est; quo magis superiores partes leventur.

Nonnunquam autem ingens inflammatio

* Lib. II. c. 9.

tio tanto impetu erumpit, ut oculos è sua sede propellat. *περόπλωσις* id, quoniam oculi procidunt, Græci appellant. His utique, si vires patiuntur, sanguinem mitti: si id fieri non potest, alvum duci, longioremque inediam induci, necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoque Cleonis collyrio quidam, quod ex duobus ante positum est, utuntur. Sed optimum est Nilei: neque de ullo magis inter omnes authores convenit.

9. Nilei collyrium, omnium optimum.

Id habet nardi Indici, papaveris lachrymæ, singulorum P. *. gummi P. I. *. croci P. II. *. foliorum rosæ recentium P. IV. *. quæ vel aqua pluviatili, vel vino levi subaustero coguntur. Neque alienum est, malicorium, vel fertulam campanam ex vino coquere, deinde conterere: aut myrrham nigram cum rosæ foliis miscere: aut hyoscyami folia cum ovi vitello cocta: aut farinam cum acaciæ succo, vel passio, aut mulso. Quibus si folia quoque papaveris adjiciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo præparato, penicillo fovere oculos oportet, ex aqua calida expresso, in qua ante vel myrti vel rosæ folia decocta sint: deinde, ex illis aliquid imponi. Præter hæc, ab occipitio incisa cute, cucurbitula adhibenda est.

Quod si per hæc restitutus oculus in sedem suam non est, eodemque modo prolapsus permanet, scire oportet, lumen esse amissum: deinde futurum, ut indurescat

is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo, qui tempori propior est, incidi oculus debet; ut, effuso pure, inflammatio ac dolor finiatur, & intus tunicæ residant, quo minus foeda postea facies sit. Utendum deinde vel iisdem collyriis ex lacte aut ovo; vel croco, cui album ovi misceatur. At, si induruit, & sic emortuus est, ut ne in pus verteretur; quatenus foede prominebit, excidendum erit sic, ut hamo summa tunica apprehendatur, atque infra id scalpellus incidat: tum eadem medicamenta erunt injicienda, donec omnis dolor finiatur. Iisdem medicamentis in eo quoque oculo utendum est, qui primum procidit, deinde per plura loca fissus est.

10. De Carbunculis oculorum. f

Solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquam in palpebris: & in his ipsis, modo ab interiore, modo ab exteriori parte. In hoc casu alvus ducenda est: cibis minuendus: lac potui dandum; ut acria, quæ læserunt, leniantur. Quod ad cataplasmata & medicamenta pertinet, his utendum, quæ adversus inflammationes proposita sunt. Atque hic quoque Nilei Collyrium optimum est. Si tamen carbunculus in exteriori palpebræ parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen ex mulso coctum; aut, si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

11. De

f Scribon. Larg. III, c. 25. Marcell. de Medic. C. VIII. Trallian. II, 7.

II. De Pustulis oculorum.

Pustulæ quoque ex inflammationibus interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit, magis etiam servanda sunt, quæ de sanguine & quiete supra proposui; sin serius, quam ut sanguis mitti possit, alvus tamen ducenda est. Si id quoque aliqua res inhibet, utique victus ratio servanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est; quale Nilei, quale Cleonis est.

12. Philetis collyrium, ad pustulas oculorum.

Id quoque, quod Philetis vocatur, huic aptum est. Habet enim myrrhæ, papaveris lachrymæ, singulorum p. i. *. plumbi eloti, terræ samiæ, quæ αἰς vocatur, tragacanthæ, singulorum p. iv. *. stibii cocti †, amyli, singulorum p. vi. *. spodii eloti, cerussæ elotæ, singulorum p. viii. *. quæ aqua pluviali excipiuntur. Usus collyrii, vel ex ovo, vel ex lacte est.

13. De Ulceribus oculorum, & de

Αἰς λιβαίνε collyrio. *

Ex pustulis ulcera interdum fiunt; eaque recentia æque lenibus medicamentis nutrienda sunt, & iisdem fere, quæ supræ in pustulis proposui. Fit quoque proprie ad hæc, quod Αἰς λιβαίνε vocatur. Habet æris combusti, & eloti, papaveris lachrymæ frictæ singulorum p. i. *. spodii eloti, thuris, stibii combusti & eloti, myrrhæ, gummi, singulorum p. ii. *.

14. De Imminutione oculorum.

Evenit etiam, ut oculi, vel ambo, vel

Z 3 fin.

† Scribon. Largus Comp. XXIII. Rhodius in notis pag. 63. * Trallian. II, 5. Longè aliter describitur à Marcello de Medic. Cap. VIII. pag. 280. Eâdem paginâ paulo inferius aliud ejusdem nominis depromitur.

linguli, minores fiant, quam esse naturaliter debeant. Idque & acer pituitæ cursus in lippitudine efficit, & continuati fletus, & ictus parum bene curati. In his quoque iisdem lenibus medicamentis ex muliebri lacte utendum est: cibus vero his, qui maxime corpus alere, & implere consueverunt: vitandaque omni modo causa, quæ lachrymas excitet, & cura domesticorum. quorum etiam, si quid forte incidit, ejus * notitiæ subtrahendum: atque acria quoque medicamenta, & acres cibi non alio magis nomine his nocent, quam quod lachrymas movent.

127, 25.

100

15. De Pediculis palpebrarum. g

15

Genus quoque vitii est, qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. id *φθειρία* Græci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat, raro non ultra procedit: sed fere, tempore interposito, pituitæ cursus acerrimus sequitur; exulceratisque vehementer oculis, aciem quoque ipsam corrumpit.

26

His alvus ducenda est: caput ad cutem tondendum, diuque quotidie jejunis perfricandum. His, ambulationibus aliisque exercitationibus diligenter utendum: gargarizandum ex mulso, in quo nepeta & pinguis ficus decocta sit: sæpe in balneo multa calida aqua fovendum caput: vitandi acres cibi; lacte pingui vinoque utendum: bibendumque liberalius, quam edendum est. Medicamenta vero intus quidem lenia danda sunt; ne quid acrioris

30

pitu-

* Hippocr. de Dec. Orn. XI. 15. g Aëtuar. M. M. II, 7, & IV, 11. Aëtius Tetr. II. Serm. III, 65. Oribas. de Loc. Aff. IV, 32.

pituîtæ concitent: super ipsos vero pediculos alia, quæ necare eos, & prohibere, ne similes nascantur, possint. Ad idipsum spumæ nitri P. I. *. sandarachæ P. I. *. uvæ taminæ, P. *. I. simul teruntur, adjiciturque vetus oleum pari portione, atque acetum, donec eis mellis crassitudo sit.

16. *De Oculorum gravioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & validioribus medicamentis curantur, & de Andrea collyrio, & de Ἀλξ κέφαλῳ.*

Hactenus oculorum morbi, qui lenibus medicamentis nutriuntur. Genera deinde alia sunt, quæ diversam curationem desiderant; fere ex inflammationibus nata, sed finitis quoque his manentia. atque inprimis in quibusdam perseverat tenuis pituîtæ cursus. Quibus alvus ab inferiore parte evocanda est, demendumque aliquid ex cibo. Neque alienum est, illini frontem ex compositione Andreae. Quæ habet gummi P. I. *. cerussæ, stibii, singulorum P. II. *. spumæ argenti coctæ & clotæ P. IV. *. sed ea spuma ex aqua pluviali coquitur; & arida hæc medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, cataplasma quoque superinjiciendum ex farina, quæ frigida aqua coacta sit, cuique aut acaciæ succus, aut cupressus adjecta sit. Cucurbitula quoque, inciso vertice, recte accommodatur: aut ex temporibus sanguis emititur. Inungi vero eo debet, quod habet squamæ æris, papaveris lachrymæ, singulorum P. *. cervini cornu combusti & clo-

ti, plumbi eloti, gummi, singulorum P. IV. * . thuris P. XII. Hoc vero collyrium quia cornu habet, *ἀπὸ κέρατος* nominant. Quotiescunque non adjicio, quod genus humoris adjiciendum sit, aquam intelligi volo.

17. *Μεμυγμένον, Euelpidis collyrium.*

Ad idem Euelpidis, quod *μεμυγμένον* nominabat. in eo papaveris lachrymæ, & albi piperis, singulæ uncia sunt, gummi libra, æris combusti P. I. *. Inter has autem curationes, post intermissionem aliquam, profunt balneum & vinum. Cumque omnibus lippientibus vitandi cibi sint, qui extenuant; tum præcipue, quibus tenuis humor diu fertur. Quod si jam fastidium est eorum, quæ pituitam crassiorē reddunt, sicut in hoc genere materiæ maxime promptum est; confugiendum est ad ea, quæ, quia ventrem, corpus quoque adstringunt.

18. *De Oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cavis, veteribus.*

At ulcera, si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut certe vetera esse consuerunt. Ex his supercrescentia collyrio, quod *μεμυγμένον* vocatur, optime reprimuntur. Sordida purgantur & eodem, & eo, quod Smilion nominatur.

19. *Smilion collyrium.*

Habet æruginis P. VI. *. gummi tantundem, ammoniaci, minii sinopici, singu-

lorum p. xvi. *. quæ quidam ex aqua; quidam, quo vehementiora sint, ex aceto terunt.

20. *Phynon collyrium Euelpidis.*

5 Id quoque Euelpidis, quod Phynona appellabat, hic utile est: croci p. i. *. papaveris lachrymæ, gummi, singulorum p. ii. *. æris combusti & eloti, myrrhæ, singulorum p. iv. piperis albi p. vi. *. Sed ante li-
10 tum, hoc ungendum est.

21. *Sphæron collyrium Euelpidis.*

Id quoque ejusdem, quod Sphæron nominabat, eodem valet. Lapidis hæmatitis eloti p. ii. *. piperis grana sex, cadmiæ
15 elotæ, myrrhæ, papaveris lachrymæ, singulorum p. iii. *. croci p. iv. *. gummi p. viii. *. quæ cum vino aminæo conteruntur.

22. *Liquidum Euelpidis collyrium.*

20 Liquidum quoque medicamentum ad idem componebat. in quo erant hæc: æruginis p. *. minii combusti, atramenti fustorii, cinnamomi, singulorum p. iii. *. croci, nardi, papaveris lachrymæ, singulorum
25 p. i. *. myrrhæ p. ii. *. æris combusti p. iii. *. cineris ex odoribus p. iv. *. piperis grana xv. Hæc ex vino austero teruntur: deinde cum passis tribus heminis decoquuntur, donec corpus unum sit. Idque medi-
30 dicamentum vetustate efficacius fit.

23. *De cavis oculorum ulceribus.*

Cava vero ulcera commodissime implent ex his, quæ supra posita sunt, Sphæron, & id quod Philetis vocatur. Idem

Sphæriorion vetustis ulceribus & vix ad cicatricem venientibus optime succurrit.

24. *Hermonis collyrium.*

Est etiam collyrium, quod cum ad plura valeat, plurimum tamen proficere in his ulceribus videtur. Refertur ad Hermonem authorem. Habet piperis longi p. i. z. *. albi p. *. cinnamomi, costi, singulorum p. i. *. atramenti futorii, nardi, casiae, castorei, singulorum p. ii. *. gallæ p. v. *. myrrhæ, croci, thuris, lycii, cerussæ, singulorum p. viii. *. papaveris lachrymæ p. xii. *. aloes, æris combusti, cadmiæ, singulorum p. xvi. *. acaciæ, stibii, gummi, singulorum p. xxv. *.

25. *De cicatricibus oculorum, quæ ex ulceribus factæ sunt, & de Asclepia, & Canopite, & Pyxino, collyriis.*

Factæ vero ex ulceribus cicatrices duobus vitiis periclitantur; ne aut cavæ, aut crassæ sint. Si cavæ sunt, potest eas implere id, quod Sphæriorion vocari dixi; vel id, quod † Asclepias nominatur. Habet hoc papaveris lachrymæ p. ii. *. sagapeni, opopanax, singulorum p. iii. *. æruginis p. iv. *. gummi p. viii. *. piperis p. xii. *. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum p. xvi. *. At, si crassæ cicatrices sunt, extenuat vel Smilion, vel Canopite collyrium, quod habet cinnamomi, acaciæ, singulorum p. i. *. cadmiæ elotæ, croci, myrrhæ, papaveris lachrymæ, gummi, singulorum p. ii. *. piperis albi, thuris, singulorum p. iii. *. æris combusti p. ix. *. cum aqua pluviali

tili. Vel Euelpidis Pyxinum, quod ex his
constat: salis fossilis p. iv. *. ammoniaci
thymiamatis p. viii. *. papaveris lachry-
mæ p. xii. *. cerussæ p. xv. *. piperis albi,
5 croci cilicii, singulorum p. l. ii. *. gum-
mi p. xiii. *. cadmiæ elotæ p. ix. *. Ma-
xime tamen tollere cicatricem videtur id,
quod habet gummi p. iii. *. æruginis p.
i. *. crocomagmatis p. iv.

10 26. *De alio genere Inflammationis oculorum.*

Est etiam genus inflammationis, in qua, si
cui tument ac distenduntur cum dolore
oculi, sanguinem ex fronte mitti necessa-
rium est: multaue aqua calida caput atque
15 oculos fovere: gargarizare ex lenticula, vel
ex fici cremore: inungi acribus medica-
mentis, quæ supra comprehensa sunt; ma-
ximeque eo, quod Sphæriorion nominatur, 361.
quodque lapidem hæmatiten habet. Atque
0 alia quoque utilia sunt, quæ ad extenuan-
dam aspritudinem fiunt; de qua protinus
dicam.

Hæc autem inflammationem oculorum
fere sequitur; interdum major, interdum
5 levior. Nonnunquam etiam ex aspritu-
dine lippitudo fit, atque ipsam deinde aspri-
tudinem auget, fitque ea in aliis bre-
vis, in aliis longa, & quæ vix unquam fi-
niatur.

0 In hoc genere valetudinis quidam cras-
sas, durasque palpebras, & ficulneo folio,
& asperato specillo, & interdum scalpello
eradunt; versasque quotidie medicamen-
tis suffricant. Quæ neque nisi in magna
vetu-

vetustaque aspritudine, neque sæpe facienda sunt. Nam melius eodem ratione victus & idoneis medicamentis pervenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore; multaque oculorum palpebras aqua calida fovebimus: cibi autem sumendi sunt acres & extenuantes.

27. † *Cæsarianum collyrium*

At medicamentum id, quod Cæsarianum vocatur, habet atramenti sutorii p. i. *. misyos p. *. piperis albi p. v. *. papaveris lachrymæ, gummi, singulorum p. ii. *. cadmiæ lotæ p. iii. *. stibii p. vi. *. Satisque constat, hoc collyrium adversus omne genus oculorum valetudinis idoneum esse; exceptis his, quæ lenibus nutriuntur.

28. *Hieracis collyrium.*

Id quoque, quod Hieracis nominatur, ad aspritudinem potest. Habet myrrhæ p. i. *. ammoniaci thymiamatis p. ii. *. æruginis rasæ p. iv. *. cum aqua pluviali. Ad idem idoneum est etiam id, quod Canopite, & id quod Smilion vocatur, & id quod Pyxinum, & id quod Sphærimon. Si autem composita medicamenta non adsunt, felle caprino, vel quam optimo melle fatis commodo aspritudo curatur.

29. *De arida lippitudine.*

Est etiam genus aridæ lippitudinis, quod *Ξηροφθαλμίαν* h. Græci appellant. Sub hoc neque tument, neque fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam ferè levi ac prurigine graves sunt, & palpebræ

citra

† Fortè à Cæsare Augusto ita dictum, si illud inde dictum, quod refert Marcell. de Med. c. 8. p. 266. h. Actuar. M. M. II, 7. Æginet. III, 22. Aëtius Tetr. II. Sermon. III. c. 75, 77.

citra duritiem ullam noctu prægravi pituita inhærescunt: quantoque minor generi huic impetus, tanto finis minus expeditior est.

5 In hoc vitio multum ambulare, multum exerceri, lavari sæpe, ibique desudare, multaque fricatione uti necessarium est. Cibi neque qui implent, neque nimium acres, apti sunt, sed inter hos medii. Mane, ubi
10 concoxisse manifestum est, non est alienum ex sinapi gargarizare, tum deinde caput atque os diutius perfricare.

30. *Rhinion collyrium.*

Collyrium vero hoc aptissimum est,
15 quod Rhinion vocatur. Habet myrrhæ p. i. *. papaveris lachrymæ, acaciæ succi, piperis, gummi, singulorum p. i. *. lapidis hæmatitis, lapidis phrygii, lycii, lapidis scissilis, singulorum p. ii. *. æris combusti p. iv. *. Ac Pyxinum quoque eidem
20 accommodatum est.

31. *De Scabris oculis: i*

Si vero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse
25 Rhinion, id quod supra positum est. Potest similiter prodesse id, quod habet æruginis rasæ, piperis longi, papaveris lachrymæ, singulorum p. ii. *. piperis albi, gummi, singulorum p. iv. *. cadmiæ lotæ, cerussæ, singulorum p. vi. *. Nullum tamen
30 melius est, quam Euelpidis, quod βασιλικὸν nominabat. Habet papaveris lachrymæ, cerussæ, lapidis Afii, singulorum p. ii. *. gummi p. xiii. *. piperis albi p. iv. *.
croci

croci p. vi. *. pſorici p. xiii. *. Nulla autem per ſe materia eſt, quæ Pſoricum nominetur; ſed chalcitidis aliquid, & cadmiæ dimidio plus ex aceto ſimul conteruntur, idque in vas fictile inditum, & conſectum ficulneis foliis ſub terra reponitur diebus viginti, & rurfus ſublatur teritur, & ſic appellatur pſoricum. Verum de baſilico quoque collyrio convenit, ad omnes affectus oculorum id eſſe idoneum, qui non lenibus medicamentis curantur.

At, ubi non ſunt medicamenta compoſita, ſcabros angulos lævant & mel & vinum. Succurritque & his & aridæ lippitudini, ſi quis panem ex vino ſubactum ſuper oculum imponit. Nam, cum fere ſit humor aliquis, qui modo ipſum oculum, modo angulos, aut palpebras exaſperat, ſic &, ſi quid prodit humoris, extrahitur; &, ſi quid juxta eſt, repellitur.

32. De Caligine oculorum.

Caligare vero oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam ſine hac, propter ſenectutem, imbecillitatemve aliam, conſueverunt. Si ex reliquiis lippitudinis id vitium eſt, adjuvat collyrium, quod Aſclepias nominatur. Adjuvat & id, quod ex crocomagmate fit.

362,
23.

33. Δια κρόκου collyrium. k

Proprie etiam ad id componitur, quod Δια κρόκου vocant. Habet piperis p. i. *. croci cilicii, papaveris lachrymæ, ceruſſæ, ſingulorum p. ii. *. pſorici, gummi, ſingulorum p. iv. *.

34. De

34. De Caligine propter senectutem, aut aliam imbecillitatem. 1

At, si ex senectute aliave imbecillitate id est, recte inungi potest, & melle quam optimo, & cyprino, & oleo vetere. Commoddissimum tamen est, balsami partem unam, & olei veteris, aut ciprini partes duas, mellis quam acerrimi partes tres miscere. Utilia quoque huic medicamenta sunt, quæ ad caliginem proxime, quæque ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt. 362.

Cuicunque vero oculi caligabant, huic opus erit multa ambulatione, atque exercitatione, frequenti balneo, ubi totum quidem corpus perfricandum est, præcipue tamen caput ex irino, donec insudet; velandumque postea, nec detegendum, antequam sudor & calor domi conquierint. Tum cibus utendum acribus, & extenuantibus: interpositisque aliquibus diebus, ex sinapi gargarizandum.

35. De Suffusione eculorum. m

Suffusio quoque, quam Græci ὑπόχυσσις nominant, interdum oculi pupillæ, quæ cernit, se opponit. Quod si inveteraverit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam certis observationibus discutitur. Sanguinem ex fronte vel naribus mittere; 348, 294 in temporibus venas adurere; gargarizando pituitam evocare; suffumigare; oculos acribus medicamentis inungere, expedit. Victus optimus est, qui pituitam extenuat.

36. De resolutione oculorum.

At ne resolutio quidem oculorum (quam

1 Oribas. de Loc. Affect. IV, 16. m Actuarius. M. M. II, 7. IV, 11. Aëtius Tetr. II, Serm. III, 49. Æginet. III, 22.

(quam παράλυσιν Græci nominant) alio vitio modo, vel aliis medicamentis curanda est. Exposuisse tantum genus vitii satis est. Igitur interdum evenit, modo in uno oculo, modo in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitali, aut ex distentione nervorum, qua vehementer ipse oculus convulsus est, ut is neque quoquam intendi possit, neque omnino consistat; sed huc illucve sine ratione moveatur, ideoque ne conspectum quidem rerum præstet.

37. De Mydriasi oculorum. n

Non multum ab hoc malo distat id, quod μυδρίασιν Græci vocant. Pupilla diffunditur & dilatatur, aciesque ejus hebescit, ac pene caligat. Difficillime genus id imbecillitatis eliditur. In utraque vero, id est paralyfi & mydriasi, pugnandum est per eadem omnia, quæ in caligine oculorum præcepta sunt paucis tantum mutatis: siquidem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum adjiciendum est; oculos vero melle inungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis usi relevatique: quidam sine ulla manifesta causa subito obcæcati sunt. Ex quibus nonnulli, cum aliquandiu nihil vidissent, repentina * profusione alvi, lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, & recenti re & interposito tempore, medicamentis quoque moliri dejectiones, quæ omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

38. De imbecillitate oculorum.

Præter hæc imbecillitas oculorum est,
ex

n Coel. Aurel. II, 1. p. 344. A&uar. M. M. II, 7. & IV, 11. Æginet. III, 22. * Aph. VI, 17.

ex qua quidem interdiu fatis, o noctu nihil cernunt. quod in foeminam bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet sanguine jacinoris
 5 (maxime hircini; sin minus, caprini) ubi id assum coquitur, excepto: atque edi quoque ipsum jecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ vel cicatrices, vel aspritudinem exte-
 10 nuant. Quidam contrito semine portulacæ mel adjiciunt eatenus, ne id ex specillo distillet, eoque inungunt. Utendum vero est exercitationibus, balneo, & fricationibus.

15 39. *Ad Oculos, qui extrinsecus offenduntur, & sanguine suffusi sunt.*

Et hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus vero interdum sic ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffundatur. Huic nihil commodius est, quam
 20 sanguine vel columbæ, p vel palumbæ, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit; cum harum acies extrinsecus læsa, interposito tempore in antiquum statum redeat, celerrimeque hirundinis. Unde etiam
 25 locus fabulæ factus est, per parentes id herba restitui, quod per se sanescit. Eorum ergo sanguis nostros quoque oculos ab externo casu commodissime tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbæ, minimum efficax columbæ, & sibi ipsi, & nobis.

Supra percussum vero oculum, ad inflammationem leniendam, non est alienum

Aa

impo-

o *νυκτάλωπας* vocant Æginet. III, 21. Actuar. M. M. II, 7. IV, 11. Trallian. II, 6. Aëtius Tetr. II. Sermon. III, 46. p Æginet. III, 22,

imponere etiam cataplasmata. Sed sal armeniacus, vel quilibet alius quam optime teri debet, sic, ut ei paulatim oleum adjiciatur, donec crassitudo strigmenti fiat. Id deinde miscendum est cum hordeacea farina, quæ ex mulso decocta sit. Facile autem, recognitis omnibus, quæ medici quoque prodiderunt, apparere cuilibet potest, vix ullum ex iis, quæ supra comprehensa sunt, oculi vitium esse, quod non simplicibus quoque, & promptis remediis subinde removeri possit.

C A P. VII.

De aurium morbis. 9

HACTENUS in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimum possunt: ideoque ad aures transeundum est; quarum usum proximum à luminibus natura nobis dedit. Sed in his aliquanto majus periculum est. nam vitia oculorum intra ipsos nocent: aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad demerentiam mortemque præcipitant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est, ne majori periculo locus sit.

Ergo, ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere & continere se debet. Postero die, si vehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere, & operire. At magnus cum febre vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. Si id aliquæ causæ prohibent, alvus solvenda est. Cataplasmata quoque calida,

q Seren. Sammon. XII. Æginet. III, 23. Trallian. III, 1. Actuarius. M. M. II, 6. IV, 10. Coel. Aurelian. Tardar. Pass. L. II. c. 3.

calida, subinde mutata, proficiunt; sive foeni græci, sive lini, sive alia farina ex mulso decocta. Recte etiam subinde admoventur spongiæ, ex aqua calida expressæ.

5 Tum, levato dolore, ceratum circumdari debet ex irino, aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa est, proficit. Si vehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adjici cataplasmati debent pa-
 10 paveris cortices fricti atque contriti sic, ut ex his pars dimidia sit; eaque tum simul ex passo vel mulso decoquuntur. In aurem vero infundere aliquod medicamentum oportet: quod semper ante * tepefieri convenit,
 15 commodissimeque per † strigilem instillatur, ubi auris repleta est, super lana mollis addenda est, quæ humorem intus contineat. Et hæc quidem communia sunt.

Medicamentum vero est & rosæ, & radicū arundinum succus, & oleum, in quo lumbrici cocti sunt, & humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali persici expressus. Composita vero ad inflammationem doloremque leniendum hæc fere sunt: castorei, papaveris lachrymæ, pares portiones conteruntur, deinde adjicitur his passum. Vel papaveris lachrymæ, croci, myrrhæ par modus sic teritur, ut invicem modo rosa, modo passum instilletur. Vel id, quod
 30 amarum in ‡ Ægyptia faba est, conteritur, rosa adjecta. Quibus myrrhæ quoque paululum à quibusdam miscetur, vel papaveris lachrymæ, aut thus cum muliebri lacte, vel amararum nucum cum rosa succus. Vel ca-

Aa 2 storei,

* Plin. de Re Med. L. 1. c. 9. † Formam exhibet Mercurialis. in Art. Gymnast. ‡ Marcell. p. 284.

storei, myrrhæ, papaveris lachrymæ partes portiones cum passo. Vel croci p. i. *. myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. iii. *. quibus, cum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, mellis minus cyatho. Idque ex primis medicamentis est. Vel papaveris lachryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis; quæ habet castorei, opopanax, papaveris lachrymæ ex aceto, singulorum p. ii. *. spumæ nitri p. iv. *. quæ contrita passo excipiuntur, donec cerati crassitudinem habeant; atque ita reponuntur. Ubi usus requirit, rursus id medicamentum, adjecto passo, pistillo teritur. Illud perpetuum est, quotiescunque crassius medicamentum est, quam ut in aurem instillari possit, adiciendum cum esse humorem, ex quo id componi debet, donec satis liquidum sit.

2. De Pure & malo odore aurium ^r.

Si vero pus quoque aures habent, recte lycium per se infunditur; aut irinum unguentum; aut porri succus cum melle; aut centaureæ succus cum passo; aut succus mali punici in ipsius cortice tepesfactus, adjecta myrrhæ exigua parte. Recte etiam miscentur myrrhæ, quam *σατρω* cognominant, p. i. *. croci tantundem, nuces amaræ xxv. mellis sesquicyathus. quæ contrita, cum utendum est, in cortice mali punici tepesiant. Ea quoque medicamenta, quæ oris exulcerati causa componuntur, æque ulcera aurium sanant. Quæ si vetustiora sunt, & multa sanies fluit, apta

pta compositio est, quæ ad authorem Erasistratum refertur. habet piperis, croci, singulorum, p. i. *. myrrhæ, misy cocti, singulorum p. ii. *. æris combusti p. ii. *. hæc ex vino teruntur : deinde ubi inaruerunt, adjiciuntur passi heminæ tres, & simul incoquuntur. Cum vero utendum est, adjicitur his mel & vinum. Est etiam Ptolemæi chirurgi medicamentum, quod habet lentisci, gallæ, singulorum p. i. *. omphacii p. i. *. succum punici mali. Est & Menophili validum admodum, quod ex his constat : piperis longi p. i. *. castorei p. ii. *. myrrhæ, croci, papaveris lachrymæ, nardi Syriaci, thuris, malicorii, ex Ægyptia faba partis interioris, nucum amararum, mellis quam optimi, singulorum p. iv. *. Quibus, dum conteruntur, adjicitur acetum quam acerrimum, donec crassitudo in his passi fiat. Est & Cratonis : cinnamomi, cassiæ, singulorum p. i. *. nardi, lycii myrrhæ, singulorum p. i. *. aloes p. ii. *. mellis cyathi tres, vini sextarius. Ex quibus lycium cum vino decoquitur; deinde his alia miscentur. At si multum puris, malusque odor est, æruginis rasæ, thuris, singulorum p. ii. *. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquuntur. ubi utendum est, dulce vinum miscetur. Aut aluminis scissilis, papaveris lachrymæ, acaciæ succi par pondus miscetur, hisque adjicitur hyoscyami succi dimidio minor, quam unius ex superioribus, portio; eaque trita ex vino diluuntur. Per se quo-

que hyoscyami succus satis proficit.

3. ^s *Compositiones ad omnia aurium vitia.*

Commune vero auxilium adversus omnes aurium casus, jamque usu comprobatum Asclepiades composuit. In eo sunt cinnamoni, casia, singulorum p. i. *. floris junci rotundi, castorei, piperis albi & longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thuris masculi, nardi Syriaci, myrrhæ pinguis, croci, spumæ nitri, singulorum p. ii. *. Quæ separatim contrita, rursus mixta, ex aceto conteruntur; atque ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. Eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est Polybi sphragis ex dulci vino liquata. Quæ compositio priori 268, 28. libro continetur.

Quod si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est, mixto vino per oricarium clysterem eluere; & tum infundere vinum austerum cum rosa mixtum, cui spodii paululum sit adjectum, aut lycium cum lacte, aut herbæ sanguinalis succum cum rosa, aut mali punici succum cum exigua parte myrrhæ.

4. *De Ulcere sordido aurium.*

Si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur; & tum aliquod ex his, quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur. Si magis pus profluit, & caput utique tondendum, & multa calida aqua perfundendum, & gargarizandum; & usque ad lassitudinem ambulandum, & cibo modico utendum est. Si cruor quoque ex ulceribus

ceribus apparet, lycium cum lacte debet infundi; vel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbæ sanguinalis, aut acaciæ adjecto.

5 Quod si super ulcera caro t increvit, ea-
que mali odoris, & sanguinem fundit, aqua
tepida elui debet; tum infundi id, quod
ex thure & æruginē, & aceto, & melle fit,
aut mel cum æruginē incoctum. Squama
10 quoque æris cum sandaracha contrita per
fistulam recte instillatur.

5. *De Vermibus aurium.* u

Ubi vero vermes orti sunt, si juxta sunt,
protrahendi oriculario specillo sunt: si
15 longius, medicamentis enecandi; caven-
dumque, ne postea nascantur. Ad utrun-
que proficit album veratrum cum aceto
contritum. Elui quoque aurem oportet vi-
no, in quo marrubium decoctum sit. Sic
20 emortui vermes in primam auris partem
prolabuntur, unde facillime educi possunt.

6. *Ad Compressa aurium foramina.*

Si foramen auris compressum est, & in-
tus crassa sanies subest, mel quam optimum
25 indendum est. Si id parum proficit, mellis
cyatho & dimidio, æruginis rasæ p. ii. *.
adjiciendum est, incoquendumque, & co-
utendum. Iris quoque cum inelle ad idem
proficit. Item mellis & rosæ scrupuli duo.
30 Item galbani p. ii. *. myrrhæ cum melle,
& fellis taurini, singulorum p. ii. *. vini
quantum satis est ad myrrham diluendam.

7. *Ad Gravem auditum.* x

Ubi vero gravius aliquis audire cœpit

A a 4

(quod

t Aëtius Tetr. II. Sermon. II. c. 84. u Aëtius Tetr. II.
Sermon. II. c. 85. de Locis Affect. IV, 40. x Aëtius Tetr.
II, Sermon. II. c. 79. Plin. de Re Medic. L. I. c. 12.

(quod maxime post longos capitis dolores evenire consuevit) in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta, qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, vel porri succus, aut cum mulso nitri paulum. Atque, ubi crusta ex auricula procidit, eluenda est aqua tepida; quo facilius ea per se diducta oriculario specillo protrahat. Si fordes exque molles sunt, eodem specillo eximendæ sunt. At, si duræ sunt, acetum & cum eo nitri paululum injiciendum est; cumque emollitæ sunt, eodem modo elui aurem, purgarique oportet. Quod si capitis gravitas manet, attondendum idem; & leniter, sed diu perfri-candum est, adjecto vel irino vel laureo oleo, sic ut utrilibet paululum aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterque post unctionem aqua calida caput foven-dum: cibisque utendum ex imbecillissima & media materia; magisque assumendæ dilutæ potiones: nonnunquam gargari-zandum est *. Infundendum autem in au-rem castoreum cum aceto & laureo oleo & succo radiculæ corticis: aut cucumeris agrestis succus, adjectis rosæ foliis contri-tis. Immaturæ quoque uvæ succus cum rosa instillatus, adversus sorditatem satis proficit.

8. De Sonitu aurium. y

Aliud vitii genus est, ubi aures intra se ipsæ sonant. Atque hoc quoque fit, ne ex-ter-

* Aceto scil. Marcellus de Medic. p. 287. y Actuarius M. M. II, 6. IV, 10. Aëtius Tetr. II, Serm. II, c. 77. Trall. III, 3.

ternum sonum accipiant. Levissimum est, ubi id ex gravedine est: pejus, ubi ex morbo, capitivæ longis doloribus incidit: pessimum, ubi, magnis morbis venientibus, maximeque comitiali, provenit. Si ex gravedine est, purgare aurem oportet, & spiritum continere, donec inde humor aliquis exspumet. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad exercitationem, fricationem, perfusionem, gargarizationemque pertinet, eadem facienda sunt: cibis non utendum nisi extenuantibus: in aurem dandus radiculae succus cum rosa, vel cum succo radicis ex cucumere agresti, vel castoreum ex aceto, & laureo oleo. Veratrum quoque cum aceto conteritur, deinde melle cocto excipitur, & deinde collyrium factum in aurem demittitur. Si sine his coepit, ideoque novo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto, vel irino, vel laureo oleo; aut huic mistum castoreum cum succo nucum amararum; aut myrrha & nitrum cum rosa & aceto. Plus tamen in hoc quoque proficit victus ratio: eademque facienda sunt, quæ supra comprehendendi, cum majore quoque diligentia: & præterea, donec is sonus finiatur, à vino abstinendum.

Quod si simul & sonus est, & inflammatio, laureum oleum conjecisse abunde est, aut id, quod ex amaris nucibus exprimitur; quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

9. *Ad ea, quæ in aurem inciderunt, extrahenda.* z

Solet etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus, aliquodve animal. Si pulex intus est, compellendum eo lanæ paululum est; quo ipse si subit, & simul extrahitur. Si non est secutus, aliudve animal est, specillum lana involutum in resinam quam glutinosissimam, maximeque terebinthinam demittendum, idque in aurem injiciendum, ibique vertendum est. utique enim comprehendet & eximet. Sin aliquid exanime est, specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso paululum recurvato. Si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoque admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoque collocatur media, inhærens capitibus utrinque pendentibus, superque eam homo deligatur in id latus versus, cujus auris eo modo laborat, sic ut extra tabulam non emineat: tum malleo caput tabulæ, quod à pedibus est, feritur; atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

C A P. VIII.

De Narium morbis. a

NARES vero exulceratas fovere oportet vapore aquæ calidæ Id & 3
* spongia expressa atque admota fit, & subjecto vase oris angusti, calida aqua repleto. Post id fomentum, illinenda ulcera sunt, aut plumbi recremento, aut cerussa,

z Aëtius Tetr. II, Sermon. II, c. 87. a Trallian. III, 8. Aëtuar. M. M. VI, 12. Aëtius Tetr. II, Sermon. II, c. 90.
* Marcell. de Medic. C. x, pag. 288.

russa, aut argenti spuma. cum quodlibet horum aliquis conterit, ei, dum teritur, invicem vinum & oleum myrteum adjiciat donec mellis crassitudinem fecerit. Sin autem ea
5 ulcera circa os sunt, pluresque crustas & odorem foedum habent, quod genus Græci βούζουρον⁴⁴² appellant; sciri quidem debet, vix ei¹⁶ malo posse succurri. Nihilominus tamen hæc tentari possunt; ut caput ad cutem tondeatur,
10 tur, assidueque vehementer perfricetur, multaque calida aqua perfundatur: multa eidem ambulatio sit; cibus modicus, neque acer, neque valentissimus. Tum in narem ipsam mel cum exiguo modo resinæ terebinthinæ
15 conjiciatur (quod specillo quoque involuto lana fit) attrahaturque spiritu is succus, donec in ore gustus ejus sentiatur. Sub his enim crustæ resolvuntur, quæ tum per sternutamenta elidi debent. Puris ulceribus vapor aquæ calidæ subjiciendus est: de
20 inde adhibendum aut lycium ex vino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut menthæ, aut marrubii succus; aut atramentum futorium, quod candefactum,
25 deinde contritum sit; aut interior scillæ pars contrita; sic ut horum cuilibet mel adjiciatur. Cujus in cæteris admodum exigua pars esse debet; in atramento futorio tanta, ut ea mistura liquida sit; cum scilla
30 utique pars major; involvendumque lana specillum est, & in eo medicamentum tingendum; eoque ulcera implenda sunt. Rursusque linamentum involutum & oblon-

^b Oribas. de Loc. affect. IV, 45. Aëtius Tetrab. II, Serm. II, 91. Marcellus de Medic. Cap. x. *Odorem gravem* vertit. Vide H, F, ab Aquapendente Oper. Chir. P. I, c. 26.

longum eodem medicamento illinendum, demittendumque in narem, & ab inferiore parte leniter deligandum. Idque per hiemem & ver bis die; per æstatem & autumnum, ter fieri debet.

2. *De Carnosis carunculis narium.*

Interdum vero in naribus carunculæ quædam similes muliebribus mammis nascuntur, hæque imis partibus, quæ cartilaginossæ sunt, inhærent. Has curare oportet medicamentis adurentibus; sub quibus ex toto consumuntur. Πολύπυς, c vero est caruncula, modo alba, modo subrubra, quæ narium ossibus inhæret; & modo ad labra tendens narem implet, modo retro per id foramen, quo spiritus à naribus ad fauces descendit, adeo increscit, ut post uvam conspici possit; strangulatque hominem, maxime austro aut euro flante; fereque mollis est, raro dura; eaque magis spiritum impedit, & nares dilatat; fereque καρκινώδης est, itaque attingi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur; interdum tamen inarescit, si addita in narem per linamentum aut penicillum ea compositio est, quæ habet. minii sinopici, chalcitidis, calcis, sandarachæ, singulorum P. I. *. atramenti futorii P. II. *.

C A P I X.

d *De Dentium dolore.*

IN dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, vinum ex toto circumcidendum est;

c Æginet. III, 24. VI, 25. Actuar. M. M. II, 8. Aëtius Tetrab. II. Serm. II. c. 92. d Trallian, III, 10. Coel. Aurelian. Morb. Chron. II, 4.

est: cibo quoque primo abstinendum, deinde eo modico mollique utendum, ne mandentis dentes irriter; tum extrinsecus admoventus per spongiam vapor aquæ calidæ; imponendumque ceratum ex cypri-
no aut irino factum, lanaque id comprehendendum, caputque velandum est. Quod si gravior dolor est, utiliter & alvus ducitur, & calida cataplasmata super maxillam
inijciuntur, & ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, sæpiusque mutatur. Cujus rei causa & *quinque-
folii radix in vino mixto coquitur; & hyoscyami radix vel in posca, vel in vino mixto coquitur sic, ut paululum his salis adjiciatur; & papaveris non nimium aridi cortices, & mandragoræ radix, eodem modo.
Sed in his tribus utique vitandum est, ne, quod haustum erit, devoretur. Ex populo quoque alba cortex radicis in hunc usum in vino mixto recte coquitur, aut in aceto cornu cervini ramentum & nepeta cum tēda ac ficu pingui: item ficus pinguis vel in mulso, vel in aceto & melle; ex quibus cum ficus discocta est, is humor percolatur. † Specillum quoque lana involutum in calidum oleum demittitur, eoque ipse dens fovetur. Quinetiam quædam quasi cataplasmata in dentem ipsum induntur.
in quem usum ex malo punico acido atque arido malicorii pars interior cum pari portione & gallæ & pinei cortices conteritur, misceturque his minium; eaque contrita aqua pluviali coguntur: aut panacis, papaveris

* Marcell. de Medic. C. XII. p. 293. 297.

† Auriscalpium dicit Marcell. de Medic. Cap. XII. p. 293.

paveris lachrymæ, peucedani, uvæ taminæ
 sine feminibus pares portiones conterun-
 tur: aut galbani partes tres, papaveris la-
 chrymæ pars quarta. Quicquid dentibus
 admotum est, nihilo minus supra maxil-
 lam ceratum (quale supra posui) esse debet
 lana obtectum. Quidam etiam myrrhæ,
 cardamomi, singulorum p. i. *. croci, pyre-
 thri, ficorum, piperis, singulorum p. iv. *.
 sinapis p. viii. *. contrita linteolo illinunt,
 imponuntque in humero partis ejus, [qua
 dens dolet; si is superior est, à scapulis; si
 inferior, à pectore: idque dolorem levat;
 &, cum levavit, protinus submovendum
 est.

Si vero exesus e est dens, festinare ad exi-
 mendum eum, nisi res coegit, † non est ne-
 cesse: sed tum omnibus fomentis, quæ su-
 pra posita sunt, adjiciendæ quædam valen-
 tiores compositiones sunt, quæ dolorem
 levant. quales hæ sunt, quæ habent papa-
 veris lachrymæ p. i. *. piperis p. ii. *. foreos
 p. x. *. quæ contrita galbano excipiuntur,
 idque circumdatur: aut Menemachi, maxi-
 me ad maxillares dentes; in qua sunt, croci
 p. i. *. cardamomi, thuris fuliginis, ficorum,
 piperis, pyrethri, singulorum p. iv. *. sinapis
 p. viii. *. Quidam autem miscent pyrethri,
 piperis, elaterii, singulorum p. i. *. alumi-
 nis scissilis, papaveris lachrymæ, uvæ ta-
 minæ, sulphuris ignem non experti, bi-
 tuminis, lauri baccarum, sinapis, singulo-
 rum p. ii. *. Quod si dolor eximi eum co-
 git, piperis semen cortice liberatum, & eo-
 dem

e Oribas. de Loc. Affect. IV. 58. Aëtius Tetrab. II.
 Serm. IV, c. 33. 34. † Ita sentit Marcellus de Medic.
 Cap. XII, p. 293.

dem modo bacca * hederæ coniecta in ejus
foramen, dentem findit, isque per testas ex-
cidet. Plani quoque piscis (quem nos pa-
stinacam, Græci *ρευρένα* vocant) aculeus tor-
5 retur, deinde conteritur, resinaque exci-
pitur, quæ denti circumdata hunc solvit.
Alumen quoque scissile in foramen conje-
ctum dentum citat. Sed id tamen involu-
tum in lanula demitti commodius est; quia
10 sic & dentem servat, & dolorem levat.
Hæc à Medicis accepta sunt: sed agrestium 324,
experimento cognitum est, cum dens do- 18.
luerit, herbam † mentastrum cum suis radi-
cibus evelli debere, & in pelvem mitti, su-
15 praque aquam infundi, collocarique juxta
sedentem hominem undique veste conte-
ctum; tum in pelvem candentes filices de-
mitti, sic, ut aqua tegantur, hominemque
eum hiantem ore vaporem excipere, ut su-
20 pra dictum est, undique inclusum. Nam &
sudor plurimus sequitur, & per os conti-
nens pituita defluit; idque longiorem, sæpe
annuam valetudinem bonam præstat.

CAP. X.

De Tonsillis. 2

443.

SI vero tonsillæ sine exulceratione per
inflammationem intumescunt, caput
quoque velandum est, & extrinsecus is
30 locus vapore calido fovendus; multa am-
bulatione utendum; caput in lecto subli-
me habendum; gargarizandumque reprimen-
tibus medicamentis. Radix quoque ea,
quam dulcem appellant, contusa & in passo mul-

* Marcell. de Medic. Cap. XII. p. 296. † Idem eo-
dem cap. p. 293. 2 Oribas. de Loc. Affect. IV, 70.

mulsove decocta, idem præstat. Leniterque quibusdam medicamentis eas illini non alienum est; quæ hoc modo fiunt. Ex malo b punico dulci succus exprimitur, & ejus sextarius ad lenem ignem decoquitur, donec ei mellis crassitudo sit; tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. ii. *. per se conteruntur, paulatimque his adjiciuntur vini lenis cyathi duo, mellis unus; deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur: aut ejusdem succi sextarius eodem modo coquitur, atque eadem ratione trita hæc adjiciuntur; nardi p. *. omphacii p. i. *. cinnamomi, myrrhæ, casis, singulorum p. i. *. Eadem autem hæc & auribus & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus in hac quoque valetudine lenis esse debet, ne exasperet.

Quod si tanta inflammatio est, ut spiritum impediat, in lecto conquiescendum; cibo abstinendum, neque assumendum quicquam præter aquam calidam est: alvus quoque ducenda est: gargarizandumque ex fico & mulso: illinendumque mel cum omphacio. extrinsecus admovendus, sed aliquanto diutius, vapor calidus, donec ea suppurent, & per se aperiantur. Si pure substante non rumpuntur hi tumores, incidendi sunt. deinde mulso calido gargarizandum.

At, si modicus quidem tumor, sed exulceratio est, furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adjiciendum est, illi-

illinendaque ulcera hoc medicamento: passi-
 si quam dulcissimi tres heminæ ad unam
 coquantur; tum adjicitur thuris p. i. *.
 croci, myrrhæ, singulorum, p. *. iterum-
 5 que omnia fervere. Ubi pura ulcera
 sunt, eodem furfurum cremore, vel lacte
 gargarizandum est. Atque hic quoque cibis
 lenibus opus est; quibus adjici dulce vinum
 potest.

C A P. XI.

De Oris Ulceribus. a

U L C E R A autem oris, si cum inflamma-
 15 tione sunt, & parum pura ac rubicun-
 da sunt, optime his medicamen-
 tis curantur, quæ supra posita ex malis pu-
 nicis fiunt. Continendusque sæpe ore re-
 primens cremor est, cui paulum mellis sit
 20 adjectum: utendumque ambulationibus,
 & non acri cibo. Cum vero pura ulcera
 esse cœperunt, lenis humor, interdum
 etiam quam optima aqua ore continenda
 est. Prodestque assumtum purum vinum,
 25 pleniorque cibus, dum acribus, vacet: in-
 spargique ulcera debent alumine scissili, cui
 dimidio plus gallæ immaturæ sit adjectum.

Si jam crustas habent, quales in adustis
 esse consueverunt, adhibendæ sunt compo-
 30 sitiones, quas Græci *αἰνιγνῆς* nominant. † Ha-
 bent hæ junci quadrati, myrrhæ, sandara-
 chæ, aluminis, pares portiones: aut croci,
 myrrhæ singulorum p. ii. *. iridis, alu-
 minis scissilis, sandarachæ, singulorum p.
 iv. *. junci quadrati p. viii. *. aut gallæ,

B b

myr-

a Aëtius Tetrab. II. Serm. IV, c. 22. † Simile me-
 dicamentum vide apud Marcell. Cap. XI. p. 292. Plin.
 de Re Med. L. i. c. 31.

myrrhæ, singulorum p. 11. *. aluminis scissilis p. 11. *. rosæ foliorum p. 1v. *. Quidam autem croci p. *. aluminis scissilis, myrrhæ, singulorum p. 1. *. sandarachæ p. 11. *. junci quadrati p. 1v. *. miscent. Priora arida insperguntur: hoc cum melle illinitur; neque ulceribus tantum, sed etiam tonsillis.

46. 17.

Verum ea longe periculosissima sunt ulcera, quas *αφθαῖ*, b Græci appellant; sed in c pueris, hos enim sæpe consumunt. in viris & mulieribus idem periculum non est. Hæc ulcera à gingivis incipiunt; deinde palatum, totumque os occupant; tum ad uvam faucesque descendunt. quibus obsessis, non facile fit, ut puer convalescat. ac

98, 23.

miserius etiam est, si lactens adhuc infans est; quo minus imperari remedium aliquod potest. Sed inprimis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, & his operibus, quæ superiores partes movent: mittenda in balneum, jubendaque ibi calida aqua mammas perfundere: tum alenda cibis lenibus, & his qui non facile corrumpuntur: potione, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est, vini diluti. ac, si alvus nutrici subsistit, ducenda est. Si pituita in os ejus coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera perungenda sunt melle, cui * rhus quem Syriacum vocant, aut amaræ nuces adjectæ sunt: vel mistis inter se rosæ foliis aridis, nucleis pini, mentha, collectis cum melle: vel eo medicamento, quod ex moris fit: quorum succus eodem modo, quo punici mali, ad mellis

b Æginet. I, 10. Aretæus Morb. Acut I, 9. Oribas. de Loc. Affect. Cur. IV. c. 68. Actuarius. M. M. II, 10. IV, 14. Aët. Tetr. II, Serm. I, 39. c Aph. III, 24. * Salmas. de Homonym. Hyles Jatric. Cap. 58.

mellis crassitudinem coquitur; eademque ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, & mel miscetur. Neque quicquam dandum, à quo humor evocari possit. Si vero jam firmior puer est; gargarizare debet his fere, quæ supra comprehensa sunt. Ac, si leniora medicamenta in eo parum proficiunt, adhibenda sunt ea, quæ adurendo crustas ulceribus inducant. Valens quoque est scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum futorium. Prodest etiam fames & abstinencia, quanta maxima imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen ulcera, interdum caseus ex melle recte datur.

C A P. XII.

De Lingua ulceribus. a

LINGUAE quoque ulcera non aliis medicamentis egent, quam quæ prima parte superioris capitis exposita sunt. Sed quæ in latere ejus nascuntur, diutissime durant. Videndumque est, num contra dens aliquis acutior sit, qui fanescere sæpe ulcus eo loco non finit, ideoque limandus est.

C A P. XIII.

a De Parulidibus & ulceribus gingivarum.

SOLENT etiam interdum juxta dentes in gingivis tubercula quædam oriri dolentia; *παρλίδα* Græci appellant. Hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet; aut inter se mixtis sale fossili com-

Bb 2

busto,

a Actuar. M. M. II, 10. a Oribas. de Loc. Affect. IV, 66. Actuar. M. M. II, 10. IV, 14. Aëtius Tetr. II, Serm. IV, 24. Æginet. VI, 27.

385. busto, cupressō, nepeta; deinde eluere os cremore lenticulæ, & inter hæc hiare, donec pituitæ satis profluat. In majore vero inflammatione iisdem medicamentis utendum est, quæ ad ulcera oris supraposita sunt: & mollis linamenti paululum involvendum aliqua compositione ex his, quas *ἀνθραξ* b vocari dixi; demittendumque id inter dentem & gingivam. Quod si durior erit, & id prohibebit, extrinsecus admo- vendus erit spongiæ vapor calidus, imponendumque ceratum. Si suppuratio se ostendet, diutius eo vapore utendum erit: erit & continendum ore calidum mulsum, in quo ficus decocta sit. Idemque subcrudum incidendum, ne, si ibi diutius pus permanferit, os lædat. Quod si major is tumor est, commodius totus exciditur, sic ut ex utraque parte dens liberetur. Pure exempto, si levis plaga est, satis est ore calidam aquam continere, & extrinsecus fovere eodem vapore: si major est, lenticulæ cremore uti, iisdemque medicamentis, quibus cætera ulcera oris curantur.

Alia quoque ulcera in gingivis plerunque oriuntur, quibus eadem, quæ in reliquo ore, succurrunt. Maxime tamen mandere ligustrum oportet, succumque eum ore continere. Fit etiam interdum, ut ex gingivæ ulcere, sive *παρελὶς* fuit, sive non fuit, diutius pus feratur, dente aut corrupto, aut fracto, vel aliter vitiato ossē: maximeque id per fistulam evenire consuevit. Quod ubi incidit, locus aperiendus,

dus, dens eximendus; testa ossis, si qua decessit, recipienda est; si quid vitiosus est, radendum. Post quæ, quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est. Si vero à dentibus gingivæ recedunt, eadem antheræ succurrunt. Uti-
 5 le est etiam pira aut mala non permatura mandere, & ore eum humorem continere. Idemque præstare non acre acetum in ore
 10 retentum potest.

CAP. XVI.

De Uvæ morbo. a

15 **U**VÆ vehemens inflammatio terrere quoque debet. Itaque in hac abstinencia necessaria est, & sanguis recte mittitur; &, si id aliqua res prohibet, alvus utiliter ducitur: caputque super hæc velandum, & sublimius habendum est: tum aqua * garga-
 20 rizandum, in qua simul rubus & lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa uva vel omphacio, vel galla b, vel alumine scissili, sic ut cuilibet eorum mel adjiciatur. Est etiam medicamentum huic aptum, quod Androni-
 25 um c appellatur. constat ex his; alumine scissili, squama æris rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy. quæ per se contrita, mixtaque rursus paulatim adjecto vino austero, teruntur, donec his mellis crassitudo
 30 sit. Chelidoniæ quoque succo per cochlear illita uva maxime prodest. Ubi horum aliquo illita uva est, fere multa pituita decurrit: cumque ea quievit, ex vino calido gargarizandum.

Bb 3

Quod

a Oribas. de Loc. Affect. Cur. IV, 73. * Marcell. de Medic. Cap. XIV. pag. 299. b Scribon. Larg. C. XVII. c. 71. c Scribon. Larg. C. XIII. 63. Longe aliter exstat apud Marcell. de Medic. Cap. XI. pag. 292.

Quod si minor in ea inflammatio, laſer terere, eique adjicere frigidam aquam ſatis eſt, eamque aquam cochleari exceptam ipſi uvæ ſubjicere. Ac mediocriter eam tu- mentem aqua quoque frigida, eodem mo- do ſubjecta, reprimi. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque eſt, vel cum laſere, vel ſine eo. At curationis uvæ pro- ductæ per manum, ratio ſubjecta eſt.

C A P. XV.

De Cancro oris a

SI quando autem ulcera oris cancer in- vaſit, primo conſiderandum eſt, num malus corporis habitus ſit, eique oc- currendum: deinde ipſa ulcera curanda. Quod ſi in ſumma parte id vitium eſt, ſatis proficit anthera, humido ulceri arida in- ſperſa; ficciori, cum exigua parte mellis il- lita. Si paulo altius, chartæ combuſtæ par- tes duæ, auripigmenti pars una. Si peni- tius malum deſcendit, chartæ combuſtæ partes tres, auripigmenti pars quarta: aut pares portiones ſalis fricti, & iridis frictæ: aut etiam pares portiones chalcitidis, calcis, auripigmenti. Neceſſarium autem eſt li- namentum in roſa tingere, & ſuper adu- rentia medicamenta imponere; ne vicinum & ſanum locum lædant. Quidam etiam in acris aceti heminam frictum ſalem conjiciunt, donec tabeſcere deſinat; deinde id acetum coquunt, donec exiccetur; eumque ſalem contritum inſpergunt. Quoties au- tem medicamentum injicitur, & ante & poſt

post os diluendum est vel cremore lenticulæ, vel aqua, in qua aut ervum, aut *oleæ, aut verbenæ decoctæ sint, sic, ut cuilibet eorum paululum mellis misceatur. Acetum quoque ex scilla retentum ore, satis adversus hæc ulcera proficit: & ex aceto cocto sali, sicut supra demonstratum est, rursus mistum acetum sed & diu continere utrumlibet, & id bis aut ter die facere, prout vehemens malum est, necessarium est. Quod si puer est, cui id incidit, specillum lana involutum in medicamentum demittendum est, & super ulcus tenendum; ne per imprudentiam adurentia devoret. At, si dolor in gingivis est, moventurque aliqui dentes, refigi eos oportet. nam curationem vehementer impediunt. Si nihil medicamenta proficient, ulcera erunt adurenda. Quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius est. Et id quidem, æque adustum, atque excisum, sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur, impleri non potest. Gingivarum vero ossa, quæ hebetia sunt, in perpetuum ustione nudantur. neque enim postea caro increscit. Imponenda tamen adustis lenticula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

C A P. XVI.

De Parotidibus. a

HÆC in capite tere medicamentis egent. Sub ipsis vero auribus oriri *παρτίδης* solent; modo in secunda
Bb 4 vale-

* Marcell. de Medic. Cap. XI. pag. 292. a Oribas. de Loc. Affect. Cur. c. 44. Trallian. III, 7.

valetudine, ibi inflammatione orta; modo post longas febres, illuc impetu morbi converso. Id abscessus genus est. Itaq; nullam novam curationem desiderat: animadversionem tantummodo hanc habet necessariam, ut, si sine morbo id intumuit, primum reprimentibus experimentum fiat: si ex adversa valetudine, illud inimicum est, maturarique & quam primum aperiri commodius est.

C A P. XVII.

De Umbilico prominente. a

AD umbilicos vero prominentes, ne manu ferroque utendum sit, antea tentandum est, ut abstineant. alvus his ducetur: imponatur super umbilicum id, quod ex his constat; cicutæ & fuliginis, singulorum p. i. *. cerussæ elotæ p. iv. *. plumbi eloti p. viii. * ovis duobus; quibus etiam solani succus adjicitur. Hoc diutius impositum esse oportet; & interim conquiescere hominem; cibo modico uti, sic ut videntur omnia infantia.

C A P. XVIII.

De Obscœnarum partium vitiis.

PROXIMA sunt ea, quæ ad partes obscœnas pertinent. quarum apud Græcos vocabula & tolerabilius se habent, & accepta jam usu sunt; cum in omni fere medicorum volumine atque sermone jactentur: apud nos fœdiora verba, ne consuetudine quidem aliqua verecundius lo-

quen-

a Æginet. VI, 51. Aëtius Tetr. I. Serm. IV, c. 26. & Tetr. IV. Serm. IV, 111. Oribas. de Loc. Affect. IV, c. 117.

quentium ^a commendata sunt : ut difficilis hæc explanatio sit, simul & pudorem, & artis præcepta servantibus. Neque tamen ea res à scribendo deterrire me debuit. Primum, ut omnia, quæ salutaria accepi, comprehenderem : dein, quia in vulgus eorum curatio etiam præcipue cognoscenda est, quæ invitissimus quisque alteri ostendit.

2. *De Colis morbis.*

10 Igitur si ex inflammatione ^b coles intumuit, reduciq; summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fovendus locus est. Ubi vero glans contacta ^{472.} est, oriculario quoque clystere inter eam ^{22.} cutemque aqua calida inferenda est. si mollita sic & extenuata cutis reducenti paruit, expeditior reliqua curatio est : si tumor vicit, imponenda est vel lenticula vel marrubium, vel oleæ folia ex vino co-
20 cta, sic ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paululum adjiciatur : sursumque coles ad ventrem deligandus est : quod in omni curatione ejus necessarium est : isque homo continere se, & abstinere à cibo debet,
25 & potione aquæ tantum à siti vindicari. Postero die rursus adhibendum iisdem rationibus aquæ fomentum est, & tum vi quoque experiundum, an cutis sequatur : Eaque, si non parebit, leviter summa scal-
30 pello concidenda erit. nam, cum sanies profluxerit, extenuabitur is locus, & facilius cutis ducetur.

Sive autem hoc modo victa erit, sive nunquam repugnaverit; ulcera vel in cutis

B b 5

ulte-

ulteriore parte, vel in glande, ultrave eam in cole reperientur: quæ necesse est, aut pura siccaque sint, aut humida & purulenta. Si sicca sunt, primum aqua calida fovenda sunt: deinde imponendum licium ex vino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum. Si tenuis iis humor inest, vino eluenda sunt; tum butyro rosæ & mellis paululum, & resinæ terebinthinæ pars quarta adjicienda est, eoque utendum. At, si pus ex iis profluit, ante omnia elui mulso calido debent: tum imponi piperis P. I. *. myrrhæ P. II. *. croci, misyos cocti, singulorum P. II. *. quæ ex vino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, uvæ madenti, oris nariumque ulceribus accommodata est. Aliud ad idem; piperis P. I. *. myrrhæ P. I. *. croci P. II. *. misyos P. I. *. æris combusti P. II. *. quæ primum ex vino austero conteruntur; deinde, ubi inaruerunt, iterum teruntur ex passi tribus cyathis, & incoquuntur, donec visci crassitudinem habeant. Ærugo quoque cum cocto melle, & ea, quæ ad oris ulcera supra comprehensa sunt, curant. At Erasistrati compositio, aut Cratonis, recte super purulenta naturalia imponitur. Folia quoque oleæ ex novem cyathis coquuntur; his adjicitur aluminis scissilis P. IV. *. lycii P. VIII. *. mellis sesquicyathus: ac, si plus puris est, id medicamentum ex melle: si minus, ex vino diluitur. Illud perpetuum est; post curationem, dum inflam-

matio

matio manet, quale suprapositum est, cataplasma super dare, & quotidie ulcera eadem ratione curare. Quod si pus & multum, & cum malo odore coepit profluere, 5 elui cremore lenticulæ debet, sic, ut ei mellis paululum adjiciatur: aut oleæ aut lentisfolia, vel marrubium decoquendum est, eoque humore eodem modo cum melle utendum: imponendaque eadem; aut 10 etiam omphacium cum melle; aut id, quod ex ærugine & melle ad aures fit; aut compositio Andronis; aut anthera, sic, ut ei paululum mellis adjiciatur. Quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, 15 lycio ex vino curant.

Si vero ulcus latius atque altius serpit, eodem modo elui debet: imponi vero, aut ærugo, aut omphacium cum melle; aut Andronis compositio; aut marrubii, myrrhæ, croci, 20 aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ, singulorum p. i. *. minii sinopici p. ii. *. quæ per se singula primum teruntur; deinde juncta iterum, melle adjecto, donec liquidi cerati crassitudinem 25 habeant tum in æneo vase leniter coquuntur, ne superfluant; cum jam guttæ indurescunt, vas ab igne removetur: idque medicamentum tum prout opus est, aut ex melle aut ex vino liquatur. Idem autem per 30 se etiam ad fistulas utile est.

Solet etiam interdum ad nervos c ulcus descendere; profluitque multa pituita, sanies tenuis malique odoris, non coacta, at aquæ similis, in qua caro recens lota est: dolo-

doloresque is locus, & punctiones habet. Id genus quamvis inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est; quale est emplastrum τετραφάρμακον ex rosa liquatum, sic, ut thuris quoque paululum ei misceatur: aut id, quod ex butyro, rosa, resina, melle fit; supra vero à me positum est. Præcipueque id ulcus multa calida aqua fovendum est, velandumque, neque frigori committendum.

Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute exesus est sic, ut glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. Perpetuumque est, quoties glans, aut ex cole aliquid, vel excidit, vel abscinditur, illam esse servandam, ne confidat, ulcerique agglutinetur, ac neque reduci possit postea, & fortasse fistulam quoque urinæ intercludat.

Tubercula etiam, d quæ φύμαλα Græci vocant, circa glandem oriuntur; quæ vel medicamentis, vel ferro aduruntur; & cum crustæ exciderunt, squama æris inspergitur, ne quid ibi rursus increascit.

3. De Cancro, qui in Cole nascitur.

Hæc citra cancrum sunt; qui cum in reliquis partibus, tum in his quoque vel præcipue ulcera infestat. Incipit à nigritie, quæ si cutem occupavit, protinus specillum subjiendum, eaque incidenda est; deinde oræ vulsellaprehendendæ, tum, quicquid corruptum est, excidendum, sic, ut ex integro quoque paulum dematur, idque adurendum. Quoties quid ustum est,

id quoque sequitur, ut imponenda lenticula sit: deinde, ubi crustæ exciderunt, ulcera sicut alia curentur.

At, si cancer ipsum colem occupavit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeque id, quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. Si medicamenta vincuntur, hic quoque scalpello, quicquid corruptum est, sic, ut aliquid secum integri trahat, præcidi debet. Illud quoque æque perpetuum est; exciso cancro, vulnus esse adurendum. Sed si ex medicamentis, si ex ferro crustæ occalluerint, magnum periculum est, ne his deciditibus, ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete & immobili pene corpore opus est, donec ex ipso crustæ maturæ leniter resolvantur. At si vel volens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur immature, crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est. Si hæc parum valet decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. Si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter & timide debet: neque ullo postea motu dandus eidem periculo locus est.

4. De Phagedæna in Cole nascente.

Nonnunquam etiam id genus ibi cancri, quod *Φαγέδαινα* à Græcis nominatur, oriri solet. In quo minime differendum, sed protinus iisdem medicamentis occurrendum est; &, si parum valent, ferro adurendum. Quædam etiam nigrities est, quæ non sentitur, sed serpit, ac, si sustinuerimus, usque ad

ad vesicam tendit: neque succurri postea potest. Sed, si in summa glande circa fistulam urinæ est, prius in eam tenue specillum demittendum est, ne claudatur; deinde id ferro adurendum: si vero alte penetravit, quicquid occupatum est, præcidendum est. Cætera eadem, quæ in aliis cancriis facienda sunt.

5. *De Carbunculo, qui in Cole nascitur.*

Occallescit etiam in cole interdum aliquid; idque omni pene sensu caret. quod ipsum quoque excidi debet. Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est: deinde ipse quoque medicamentis e urendus, maximeque chalcitide cum melle, aut ærugine cum cocto melle, aut ovillo stercore fricto & contrito cum eodem melle. Ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quæ ad oras ulceris componuntur.

6. *De Testiculorum morbis.*

In testiculis vero, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est: à cibo abstinendum: imponendum, quod est ex fabæ farina ex mulso cocta, & cum cumino contrito ex melle coacta; aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto; aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum; aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso; aut lilii radix contrita. At, si iidem induruerunt, imponi debet lini vel fœni Græci semen ex mulso coctum; aut ex cyprino ceratum; aut similia ex vino contrita, cui paululum croci sit adjectum.

adjectum. Si vetustior jam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita.

Si ex ictu tument, sanguinem mitti necessarium est; magisque, si etiam livent. Imponendum vero utrumlibet ex his, quæ cum cumino componuntur, supraque posita sunt; aut ea compositio, quæ habet natri cocti P. I. *. resinæ pineæ, cumini, singulorum P. II. *. uvæ taminix sine seminibus P. IV. *. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculus aliquidem defuit, fere quoque pus increfcit; neque aliter succurri potest, quam si, inciso scroto, & pus emissum, & ipse testiculus excisus est.

7. De Ani morbis.

De Rhagadiis.

Anus quoque multa tædii que plena mala recipit, nec à se multum abhorrentes curationes habet. Ac primum in eo sæpe, & quidem pluribus locis, cutis scinditur; g *ῥαγ* 493
αδία Græci vocant. Id si recens est, quies- 15.
cere homo debet, & in aqua calida desidere. Columbina quoque ova coquenda sunt, &, ubi induruerunt, purganda: deinde alterum jacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus, sic, ut invicem utroque aliquandiu utatur. Tum tetrapharmacum, aut rhyodes rosa diluendum est; aut cæsypum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa facto; aut eidem cerato liquido plumbum elotum adjiciendum; aut resinæ terebinthinæ myrrha; aut

aut spumæ argenti vetus oleum; & quolibet ex his id perungendum. Si, quicquid læsum est, extra est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum superdandum est, & quicquid ante adhibuimus, cerato contegendum. In hoc autem casu, neque acribus cibis utendum, neque asperis, nec alvum comprimentibus: ne aridum quidem quicquam satis utile est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia, pingua, glutinosa, meliora sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

8. *De Condylomate.* ^h

494, 5.

Condyloma autem est tuberculum, quod ex quadam inflammatione nasci solet. Id ubi ortum est, quod ad quietem, cibos, potionisque pertinet, eadem servari debent, quæ proxime scripta sunt. Iisdem etiam ovis recte tuberculum id fovetur. sed desidere ante homo in aqua debet, in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimentibus: tum recte imponitur lenticula cum exigua mellis parte, fertula campana ex vino cocta, & rubi folia contrita cum cerato ex rosâ facto; & cum eodem cerato contritum vel cotoneum malum, vel malicorii ex vino cocti pars interior: & chalcitis cocta atque contrita, deinde œsypo ac rosâ excepta; & ex ea compositione, quæ habet thuris p. i. *. aluminis scissilis p. ii. *. cerussæ p. iii. *. spumæ argenti p. v. *. quibus, dum teruntur, invicem rosâ & vinum instillatur. Vinculum autem ei loco linteolum aut panniculus quadratus est, qui

^h Aëtius Tetr. IV, Serm. II, c. 3. Scribon. Larg. C. XC. Æginet. VI, 80.

qui ad duo capita duas ansas, ab altera vero parte totidem fascias habet: cumque subjectus est, ansis ad ventrem datis, à posteriore parte in eas adductæ fasciæ conjunguntur, atque, ubi artatæ sunt, dexterior sinistra, sinisterior dextra procedit, circumdatæque circa alvum inter se novissime nodo deligantur. Sed, si vetus condyloma jam induruit, neque sub his curationibus desit, aduri medicamento potest, quod ex his constat; æruginis P. II. *. myrrhæ P. IV. *. gummi P. VIII. *. thuris P. XII. *. stibii, papaveris lachrymæ, acaciæ, singulorum P. XVI. *. Quo medicamento quidam etiam ulcera, de quibus proxime dixi, renovant. Si id nondum in condylomate proficit, adhiberi possunt etiam vehementius adurentia. Ubi consumptus est tumor, ad medicamenta lenia transeundum est.

9. De Hemorrhoidibus. 1

Tertium autem ani vitium est, ora venarum tanquam capitulis quibusdamurgentia, quæ sæpe sanguinem fundunt; *αιμορροΐδας* Græci vocant. Idque etiam in ore vulvæ foeminarum incidere consuevit. Atque in quibusdam parum tuto suppressitur; qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt. habent enim purgationem hanc, non morbum. Ideoque curati quidam, cum sanguis exitum non haberet, inclinata in præcordia ac viscera materia, subitis & gravissimis morbis correpti sunt. Si cui vero id nocet, is desidere in aqua ex

Cc

ver-

verbenis debet : imponere maxime malicorium cum aridis rosæ foliis contritum ; aut ex his aliqua , quæ sanguinem supprimunt. Solet autem oriri inflammatio , maxime ubi dura alvus eum locum læsit. Tum in aqua dulci desidendum est , & id fovendum ovis , imponendi vitelli cum rosæ foliis ex passo ^k subactis : idque , si intus est , digito illinendum ; si extra , superillitum panniculo imponendum est. Ea quoque medicamenta , quæ recentibus scissuris posita sunt , hic idonea sunt. Cibus vero in hoc casu iisdem , quibus in prioribus , utendum est. Si ista parum juvant , solent imposita medicamenta adurentia ea capitula absumere. At , si jam vetustiora sunt , sub authore Dionysio inspergenda sandaracha est : deinde imponendum , quod ex his constat ; squamæ æris , auripigmenti , singulorum p. v. *. saxi calcis p. viii. *. postero die acu compungendum. Aductis capitulis fit cicatrix , quæ sanguinem fundi prohibet. Sed , quoties is suppressus est , ne quid periculi afferat , multa exercitatione digerenda materia est : prætereaque & viris , & foeminis , quibus menstrua non proveniunt , interdum ex brachio sanguis mittendus est.

10. Si Anus , vel Os vulvæ procidit , quæ
1 curatione utendum sit.

At , si anus ipse , vel os vulvæ procidit (nam id quoque interdum fit) considerari debet , purum ne id sit , quod provolutum est , an humore mucoso circumdatum. Si
purum

^k Alii subacto. 1. Æginet, III, 89. Aëtius Tetrab. IV. Serm. II. c. 8.

purum est, in aqua desidere homo debet, aut falsa, aut cum verbenis vel malicorio incocta. Si autem humidum, vino austero sublavandum est, illinendumque fece vini combusta. Ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est; imponendaque plantago contrita, vel folia salicis in aceto cocta; tum linteolum lana, eaque super deliganda sunt, cruribus inter se devinctis.

II. *De Fungo ani aut vulva.*

Fungo quoque simile ulcus in eadem sede nasci solet. Id, si hiems est, egelida; si aliud tempus, frigida aqua fovendum est; dein squama æris inspergenda, supraque ceratum ex myrteo factum, cui paululum squamæ, fuliginis, calcis sit adjectum. Si hac ratione non tollitur, vel aliis medicamentis similibus, vel vehementioribus, ferro adurendum est.

C A P. XIX.

De Digitorum ulceribus.

DI G I T O R U M autem vetera ulcera commodissime curantur, aut lycio, aut amurca cocta, cum utrilibet vinum adjectum est. In iisdem recedere caruncula ab unguibus cum magno dolore consuevit; *πτερύγιον* a Græci appellant. Oportet alumen Melium rotundum in aqua liquare; donec mellis crassitudinem habeat: tum, quantum ejus aridi fuit, tantundem mellis infundere, & rudicula miscere, donec similis croco color fiat, eoque illinere. Quidam ad eundem usum deco-

C c 2

quere

quere simul malunt, cum paria pondera aluminis aridi & mellis miscuerunt. Si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fovendi aqua ex verbenis, imponendumque super medicamentum ita factum: chalcitis, malicorium, squama æris excipiuntur fico pingui leviter cocta & melle; aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris ignem non expecti par modus cerato miscetur ex myrteo facto; aut æruginis rasæ p. i. *. squamæ æris p. ii. *. mellis cyatho coguntur; aut pares portiones miscentur, saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. Quicquid horum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est. Tertio die digitus resolvendus, & si quid aridi est, iterum excidendum, similisque adhibenda curatio est. Si non vincitur, purgandum est scalpello, tenuibusque ferramentis adurendum, & sicut reliqua usta, curandum.

At, ubi scabri e ungues sunt, circum aperiri debent, qua corpus contingunt: tum super eos ex hac compositione aliquid imponi; sandarachæ, sulphuris, singulorum p. ii. *. nitri, auripigmenti, singulorum p. iv. *. resinæ liquidæ p. viii. *. tertioque id die resolvendum est. Sub quo medicamento vitiosi ungues cadunt, & in eorum locum meliores renascuntur.

LIBER SEPTIMUS.

P R Æ F A T I O.

5 De Chirurgica, & qui in ea claruerint, &
qualis esse Chirurgus debeat, & quid
hoc in libro describatur.

10 **T**ertiam esse medicinæ partem, quæ
manu curet, & vulgo notum, & à me
propositum est. Ea non quidem me-
dicamenta atque victus rationem omittit;
sed manu tamen plurimum præstat. estque
ejus effectus inter omnes medicinæ par-
5 tes evidentissimus. Si quidem in morbis cum
multum a fortuna conferat †, eademque sæpe 18, 13.
salutaria, sæpe vana sint; potest dubitari, 19, 18.
secunda valetudo medicinæ, an corporis be- 111, 34.
neficio contigerit. In his quoque, in quibus 112, 17.
20 medicamentis maxime utimur, quamvis
profectus evidentior est, tamen sanitatem &
per hæc frustra quæri, & sine his reddi sæ-
pe, manifestum est. Sicut in oculis quoque
deprehendi potest; qui à medicis diu ve-
5 xati, sine his interdum sanescunt. At in ea
parte, quæ manu curat, evidens est, om-
nem profectum, ut aliquid ab aliis adju-
vetur, hinc tamen plurimum trahere. Hæc
autem pars, cum sit vetustissima, magis ta- 2, 7.
30 men ab illo parente omnis medicinæ Hip-
pocrate, quam à prioribus exulta est. De-
inde, posteaquam diducta ab aliis habere
professores suos cœpit, in Ægypto quoque
increvit, Philoxeno maxime authore, qui

Cc 3

plu-

a Hippocrat. de Arte. V. † remedia quidam ad-
scripsit margini edit. Cæsar.

pluribus voluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque & Sostratus, & Herones & Apollonii duo, & Ammonius Alexandrinus, multique alii celebres viri, singuli quædam repererunt. 11
Ac Romæ quoque non mediocres professores, maximeque naper * Tryphon pater, & Euelpistus Phlegetis filius, &, ut ex scriptis ejus intelligi potest, horum eruditissimus Meges, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei disciplinæ adjecerunt.

Esse autem Chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentiæ propior; manu strenua, stabili, nec unquam intremiscente, eaque non minus sinistra, quam dextra 11
promptus; acie oculorum acri, claraque; animo intrepidus, b immisericors, sic, ut sanari velit eum, quem accepit, non ut clamore ejus motus, vel magis, quam res desiderat, properet, vel minus, quam necesse est, fecet: sed perinde faciet omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriretur. 21

Potest autem requiri, quod huic parti proprie vindicandum sit: quia vulnerum quoque ulcerumque multorum curationes, 21
quas alibi executus sum, Chirurghi sibi vendicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista præstare concipio: atque, ubi se diviserunt, eum laudo, qui quamplurimum percipit. Ipse autem huic parti 31
ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit; & in quibus vulneribus ulceribusve plus profici manu, quam medicamento, credo: tum, quicquid ad ossa pertinet.

* Rhod. ad Scrib. Larg. pag. 291. b Theodoret. Græc. Affect. I. pag. m. 4.

5 tinet. Quæ deinceps exequi aggrediar, dilatisque in aliud volumen ossibus, in hoc cætera explicabo: præpositisque his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent, transibo.

C A P. I.

De Vexatis. a

10 **V**EXATA igitur in quacunque parte corporis sint, quamprimum sic curari debent, ut, qua dolor est, ea scalpello cutis crebro incidatur, de-
15 tergeaturque eodem adverso profluens sanguis. quod si paulo tardius subvenitur, jamque etiam rubor est; qua rubet corpus: si tumor quoque accessit, quacunque is est, id idem optimum auxilium est. Tum superdanda reprimentia sunt; maximeque lana succida ex b aceto & oleo. Quod si levior is casus est, possunt etiam, sine scalpello, imposita eadem mederi. Et, si nihil aliud est, cinis quoque; maxime ex sarmentis: si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

C A P. II.

De his, quæ per se intumescunt, quomodo incidenda, & curanda sint.

30 **V**ERUM hoc quidem promptum est. In his autem negotium majus est, quæ per se, vitio intus orto, intumescunt, & ad suppurationem spectant.

Cc 4

Ea

a Aëtius Tetrab. IV, Serm. II, 68. b Actuarius. M. M. IV, 16.

Ea omnia genera abscessuum esse alias proposui, medicamentaque his idonea executus sum: nunc superest, ut dicam, quæ in iis manu fieri debeant. Ergo, priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet; quod, quicquid illud malæ corruptæque materiæ coit, extrahat: idque iterum, tertioque recte fit, donec omne indicium inflammationis excedat. Neque tamen fas est, nihil à cucurbitula agere.

Interdum etiam fit, sed raro, ut quicquid abscedit, velamento suo includatur. id antiqui tunicam nominabant. Meges, quia tunica omnis nervosa est, dixit, non nasci sub eo vitio nervum, quo caro consumeretur, sed subiecto jam vetustiore pure, callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo modo pertinet; quia quicquid, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet: neque ulla res prohibet, etiam si callus est, tamen, quia cingit, tunicam nominari: tum, pure quoque maturiore, hæc interdum esse consuevit. ideoque, quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo, si id incidit, siue jam durities est, in hac auxilii nihil est: sed, ut alias scripsi, vel avertenda concurrens eo materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil præterea necessarium est. Si pus maturuit, in alis quidem & inguinibus raro secandum est: item ubicunque

que mediocris abscessus est: item quoties in summa cute, vel etiam carne vitium est; nisi festinare curandi imbecillitas cogit. Satisque est cataplasmatibus efficere, ut per
5 se pus aperiatur. nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Si autem altius malum est, considerari debet, nervosusne is locus sit, an non sit. Nam, si sine nervis est, candenti ferramento
10 aperiri debet. cujus hæc ratio est, quod exigua plaga diutius ad pus evocandum pateat, parvaque postea cicatrix sit. At, si nervi juxta sunt, ignis alienus est; ne distendantur & membrum debilitent: ne-
15 cessaria vero opera *scalpelli est. Sed cætera etiam subcruda aperiri possunt; inter nervos ultima expectanda maturitas est, quæ cutem extenuet, eique pus jungat, quo propius reperiatur. Jamque alia rectam
20 plagam desiderant, ut in carne: alia vero vehementer cutem extenuant, in quibus tota ea super pus excidenda est. Semper autem, ubi scalpellus admovetur, id agendum est, ut & quam minimæ & quam paucissimæ
25 plagæ sint: cum eo tamen, ut necessitati succurramus, & in modo, & in numero. Nam majores sinus, latius; interdum etiam duabus, aut tribus lineis incidendi sunt. Dandaque opera, ut imus sinus exitum habeat;
30 ne quis humor intus subsidat, qui proxima & adhuc sana rodendo sinuet. Est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit. Nam, ubi post longos morbos totius corporis habitus vitiatus est, lateque se sinus suf-

Cc 5

fudit

fudit, & in eo jam cutis pallet; scire licet, eam jam emortuam esse, & inutilem futuram. Ideoque excidere commodius est: maxime, si circa articulos majores id evenit, cubantemque ægrum fluens alvus exercuit, neque per alimenta quicquam corpori accedit. Sed excidi ita debet, ut plaga ad similitudinem myrtei folii fiat, quo facilius sanescat. Idque perpetuum est; ubicunque medicus & quacunque de causa cutem excidit. Pure effuso, in alis vel inguinibus linamento opus non est; sed spongia ex vino imponenda est. In cæteris partibus, si æque ea linamenta supervacua sunt, purgationis causa paulum mellis infundendum; dein glutinantia superdanda: si illa necessaria sunt, super ea quoque similiter dari spongia eodem modo ex vino expressa debet. Quando autem linamentis opus sit, quando non sit alias dictum est. Cætera eadem, incisa suppuratione, facienda sunt, quæ, ubi per medicamenta rupta est, facienda esse proposui.

C A P. III.

*De bonis, malisve signis Suppurationum.*295,
30.

PROTINUS autem, quantum curatio efficiat, quantumque aut sperari aut time-
ri debeat, ex quibusdam signis intelligi potest; fereque iisdem, quæ in vulneribus exposita sunt. Nam bona signa sunt, somnum capere, facile spirare, siti non confici, cibum non fastidire, si febricula fuit, ea vacare: itemque habere pus album, læve,
non

non foedi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus gravitas, sitis, cibi fastidium, febris; pus nigrum, aut feculentum, a & foedi odoris: item procedente curatione eruptio
5 sanguinis; aut si, antequam sinus carne impleatur, oræ callosæ^b fiunt, illa quoque ipsa^{300.} carne hebetæ, nec firma. Deficere tamen^{10.} animam vel in ipsa curatione, vel postea, pessimum omnium est. Quinetiam mor-
10 bus ipse, si subito solutus est, dein suppuratio exorta est; si effuso pure permanet, non injuste terret. Estque inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut hæc ipsa fortuna huc illucve
15 discernit; sic medici partium est, eniti ad reperiendam sanitatem. Ergo, quoties ulcus resolverit, eluere id, si reprimendus humor videbitur, vino & aqua pluviatili mixto, vel aqua, in qua lenticula cocta sit,
20 debeat: si purgandum erit, mulso, rursusque imponere eadem. Ubi jam repressus videbitur humor, ulcusque purum erit, produci carnem conveniet, & foveri ulcus pari portione vini ac mellis, superque im-
25 poni spongiam ex vino & rosâ tinctam. per quæ caro producitur. Plus tamen, ut alias quoque dixi, victus ratio eo confert. Ea est, solutis jam febribus & cibi cupiditate red-
dita, balneum rarum; quotidiana, sed lenis
30 gestatio; cibi potionesque corpori faciendæ aptæ. Quæ omnia, per medicamenta quoque suppuratione rupta, sequuntur. Sed, quia magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reservata sunt.

CAP.

CAP. I V.

328.

De Fistulis.

ADVERSUS fistulas quoque, si altius penetrant, ut ad ultimas demitti^a collyrium non possit, si tortuosæ sunt, si multiplices, majus in manu, quam in medicamentis, præsidium est; minusque operæ est, si sub cute transversæ feruntur, quam si recta intus tendunt. Igitur, si sub cute transversa fistula est, demitti^b specillum debet, supraque id ea incidi. Si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo & ferro persequendi sunt. Idemque faciendum, si plures se quasi rivuli ostendunt. Ubi ad fines fistulæ ventum est, excidendus ex ea totus callus est, superque fibulæ dandæ, & medicamentum, quo glutinetur. At, si recta subter tendit, ubi, quo maxime ferat, specillo exploratum est; excidi is sinus debet: dein fibula oris cutis injicienda est, eique glutinantia medicamenta superdanda sunt; aut, si corruptius ulcus est (quod interdum ossæ vitiato fit) ubi id quoque curatum est, pus moventia.

2. De Costarum fistulis.

Solent autem inter costas fistulæ subter ire. Quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte præcidenda † & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur. Solent quoque, ubi costas transierunt, septum id, quod transversum à superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intelligi potest & ex loco, & ex magnitudine doloris,

^a Æginet. IV. 49. ^b Aëtius Tetrab. IV, Ser. m. II, c 59. † H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. I. c. 4.

ris, & quia nonnunquam spiritus eo cum humore quasi bullante prorumpit, maximeque, si hunc ore ille continuit. In eo medicinæ locus nullus est. In cæteris vero, quæ circa costas sanabilia sunt, pinguia medicamenta inimica sunt; cæteris, quæ ad vulnera accommodantur, uti licet: optime tamen sicca linamenta, vel, si purgandum aliquid videtur, in melle tincta imponuntur.

3. De Ventris fistulis.

Ventri nullum os subest; sed ibi perniciofæ admodum fistulæ fiunt: adeo ut Sostrius insanabiles esse crediderit. Id non ex toto ita se habere usus ostendit. Et quidem, quod maxime mirum videri potest, tutior fistula est contra jecur, & lienem, & ventriculū, quam contra intestina: non quo perniciosior ibi res sit, sed quo alteri periculo locum faciat. Cujus experimento moti quidam authores parum modum rei cognoverunt. Nam venter sæpe etiam telo perforatur, prolapsaque intestina conduntur, & oras vulneris futuræ comprehendunt. quod quemadmodum fiat, mox indicabo. Itaque, etiam ubi tenuis fistula abdomen perrupit, excidere eam licet, futuraque oras conjungere. Si vero ca fistula intus patuit, excisā necesse est latius foramen relinquat. quod nisi permagna vi sui non potest; utique ab interiore parte, qua quasi membrana quædam finit abdomen, quam *περιτόναιον* Græci vocant. Ergo, ubi aliquis ingredi ac moveri cœpit,

rum-

rumpitur illa futura, atque intestina solvuntur. quo fit, ut pereundum homini sit. Sed non omnimodo res ea desperationem habet: ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

493.

4. De Ani fistulis. c

Propriam etiamnum animadversionem desiderant eæ, quæ in ano sunt. In has demisso specillo, ad ultimum ejus caput incidi cutis debet: dein novo foramine specillum educi lino sequente, quod in aliam ejus partem, ob id ipsum perforatam, conjectum sit. Ibi linum apprehendendum ligandumque cum altero capite est, ut laxè cutem, quæ super fistulam est, teneat. Idque * linum debet esse crudum, & duplex triplexve, sic tortum, ut unitas in eo facta sit. Interim autem licet negocia agere, ambulare, lavare, cibum capere, perinde atque sanissimo. Tantummodo id linum bis in die, soluto nodo, ducendum est sic, ut subeat fistulam pars, quæ superior tuit. Neque committendum est, ut id linum putrescat: sed tertio quoque die nodus resolvendus est, & ad caput alterum recens linum alligandum, eductoque vetere, id in fistula cum simili nodo relinquendum. Sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est, incidit: simulque & id sanescit, quod à lino relictum est; & id, quod ab eo mordetur, inciditur. Hæc ratio curationis longa, sed sine dolore est.

Qui festinant, adstringere cutem lino debent, quo celerius fecetur; noctuque ex

c Æginet. VI. 78. H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurg. P. I. c. 93. Petr. de Marchettis Observ. Medic. Chirurgic. in fine multa. * Quid sit docet H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. C. 93.

penicillo tenuia quædam intus demittere,
 ut cutis hoc ipso extenuetur, quo extendi-
 tur. sed hæc dolorem movent, Adjicitur
 celeritati, sicut tormento quoque, si & li-
 num, & id, quod ex penicillo est, aliquo
 medicamento illinitur ex iis, quibus cal-
 lum exedi proposui. Potest tamen fieri, ut
 ad scalpelli curationem etiam illo loco ve-
 niendum sit, si intus fistula fert, si multi-
 plex est. Igitur in hæc genera demisso spe-
 cillo, duabus lineis incidenda cutis est; ut
 media inter eas habenula tenuis admodum
 injiciatur, ne protinus oræ coeant; sitque
 locus aliquis linamentis, quæ quam pau-
 cissima superinjicienda sunt; omniaque
 eodem modo facienda, quæ in abcessibus
 posita sunt. Si vero ab uno ore plures sinus
 erunt, recta fistula scalpello erit incidenda;
 ab eo cæteræ, quæ jam patebunt, lino exci-
 piendæ. Si intus aliqua procedet, quo fer-
 rum tuto pervenire non poterit, collyrium
 demittendum erit.

Cibus autem in omnibus ejusmodi casi-
 bus, five manu, five medicamentis agetur,
 dari debet humidus; potio liberalis, diu-
 que aqua. ubi jam caro increfcit, tum de-
 mum & balneis raris utendum erit, & cibis
 corpus implentibus.

C A P. V.

De Telis è corpore extrahendis. a

TELA quoque, quæ illata corporibus
 intus hæserunt, magno negotio sæpe
 ejiciuntur. Sunt enim quædam difficul-
 tates

tates ex generibus eorum; quædam ex his sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua venit, aut ab ea, in quam tetendit. illic viam, qua redeat, ipsum sibi fecit: hic, à scalpello accepit. nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non alte telum infedit, & in summa carne est, aut certe magnas venas & loca nervosa non transit, nihil melius est, quam, qua venit, id revellere. Si vero plus est, per quod telo revertendum, quam quod perrumpendum est; jamque venas nervosque id transiit, commodius est aperire quod superest, & eaque extrahere. nam & propius petitur, & tutius evellitur. Et in majore membro, si medium mucro transiit, facilius sanescit, quod pervium est; quia utrinque medicamento fovetur. Sed, si retro telum recipiendum, amplianda plaga est; quo facilius id sequatur, quoque minor oriatur inflammatio: quæ major fit, si ab illo ipso telo, dum redit, corpus laniatur. Item, si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quam ut telo postea transeunte amplietur. In summa autem utraque parte ista habenda cura est, ne nervus, ne vena major, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo re-tuso est, abducendumque à scalpello. Ubi autem incisum est satis, telum eximendum est: tunc quoque eodem modo, & eadem cura habita, ne sub eo, quod eximitur, aliquid eorum lædatur, quæ tuenda esse proposui.

2. De

b Alii itaque.

2. *De Sagittis recipiendis.*

Hæc communia sunt: præter quæ propria quædam in singulis telorum generibus sunt, quæ protinus subjiciam. Nihil
5 tam facile in corpus, quam sagitta, conditur, eademque altissime insidit. Hæc autem eveniunt, & quia magna vi fertur illa, & quia ipsa angusta est. Sæpius itaque ab altera parte, quam ex qua venit, recipienda
10 est; præcipueque, quia fere spiculis cingitur; quæ magis laniant, si retro, quam si contra trahuntur. Sed inde, aperta via, caro diduci debet ferramento factò ad similitudinem Græcæ literæ *v*: deinde, ubi appa-
15 ruit mucro, si ei arundo inhæret, propellenda est, donec ab altera parte apprehendi & extrahi possit. Si jam illa decidit, solumque intus ferrum est; mucro vel digitis apprehendi, vel forcipe, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi
20 ab ea parte, qua venit, evelli magis placuit. nam, ampliato magis vulnere, aut arundo, si inest, evellenda est; aut, si ea non est, ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaque breviora & tenuiora sunt, forcipe
25 ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi: si ea majora valentioraque sunt, fissis scriptoriis calamis contegenda, ac, ne quid dilacerent, sic evellenda sunt.
30 & in sagittis quidem hæc observatio est.

3. *De Latis telis educendis.*

Latum vero telum, si aliquis intus in carne habuerit, ab altera parte educi non expedit; ne ingenti vulnere ipsi quoque

ingens vulnus adjiciamus. Evellendum est ergo quodam genere ferramenti, quod *Διοκλῆς γράφισκον* Græci vocant; quoniam authorem Dioclem habet: quem inter præcos maximosque medicos fuisse, jam posui. Lamina est ferrea, vel ænea etiam, ab altero capite duos utrinque deorsum conversos uncus habens; ab altero duplicata lateribus, leviterque extrema eam in partem inclinata, quæ sinuata est; insuper etiam ea parte inclinata, quæ perforata est. Hæc juxta telum transversa demittitur: deinde, ubi ad inum mucronem ventum est, paululum torquetur, ut telum foramine suo excipiat: cum in cavo mucro est, illico duo digiti, subjecti partis alterius uncis, simul ferramentum id extrahunt, & telum.

4. De alio telorum genere.

Tertium genus telorum, quod interdum evelli debet, est plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod, perrupta cute, integrum intus infedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idque, quod inest, ea, qua venit, forcipe extrahendum est. Accedit vero aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum vel offi inhæsit, vel in articulo se inter duo ossa demersit. In osse usque eo movendum est, donec laxetur is locus, qui mucronem momordit; & tunc vel manu vel forcipe telum extrahendum est. quæ ratio quoque in dentibus ejiciendis est. Et vix unquam ita telum non sequitur. sed, si morabitur, excuti quoque cum aliquo ferramento poterit. Ultimum est, ubi

non

non evellitur, terebra juxta forare, & ab eo foramine, ad speciem literæ v contra telum os excidere sic, ut lineæ, quæ diducuntur, ad telum spectent: eo facto, id necesse est labet, & facile auferatur.

Inter duo vero ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fasciis habenisve deliganda, & per has in diversas partes diducenda sunt, ut nervos distendant: quibus extentis, laxius inter ossa spatium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Illud videndum est, sicut in aliis locis posui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria à telo lædatur, dum id extrahitur: eadem scilicet ratione, quæ supra posita est.

5. *De venenato telo evellendo.*

At, si venenato quoque telo quis ictus est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis, adjicienda curatio est, quæ vel epoto veneno c, vel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius, extracto telo, medicina non alia est, quam quæ esset, si corpore icto nihil inhæsisset. de qua satis alio loco dictum est.

3051

C A P. VI.

De Gangliis, & Meliceride, & Atheromate, a & Steatomate, capitis tuberculis.

HÆc evenire in qualibet parte corporis possunt: reliqua certas sedes habent de quibus dicam, orsus à capite. In hoc multa variaque tubercula

D d 2

oriun-

oriuntur ^b γάγγλια, μελιηρίδας, & αιδερά-
 μαία nominant; aliisque etiamnum vocabu-
 bulis quædam alii discernunt; quibus ego
 στατώμαία quoque adjiciam. quæ quamvis
 & in cervice, & in alis, & in lateribus ori- 5
 ri solent; per se tamen non posui; cum ista
 omnia mediocres differentias habeant, ac
 neque periculo terreant, neque diverso
 genere curentur. Omnia autem ista & ex
 parvulo incipiunt, & diu paulatimque in- 10
 crescunt, & tunica sua includuntur. Quæ-
 dam ex his dura ac renitentia, quædam
 mollia cedentiaque sunt: quædam spatio
 nudantur, quædam tecta capillo suo per-
 manent, fereque sine dolore sunt. Quid 15
 intus habeant, ut conjectura prælagiri po-
 test; sic ex toto cognosci, nisi cum ejecta
 sunt, non potest. Maxime tamen in his,
 quæ renituntur, aut lapillis quædam fimi-
 lia, aut concreti confertique pili reperiun- 20
 tur. In his vero, quæ cedunt, aut melli si-
 mile aliquid, aut tenui pulticulæ, aut qua-
 si rāsæ cartilagini, aut carni hebeti & cruen-
 tæ, quibus alii alique colores esse consue-
 verunt. Fereque ganglia renituntur: athe- 25
 romati subest quasi tenuis pulticula: meli-
 ceridi liquidior humor; ideoque pressu
 circumfluit: steatomati pingue quiddam,
 idque latissime patere consuevit, resolvit-
 que totam cutem superpositam sic, ut ea la- 30
 bet; cum in cæteris sit adstrictior. Omnia,
 derafa ante, si capillis conteguntur, per
 medium oportet incidere. ut effundatur,
 quicquid intus coit. Sed steatomatis tuni-
 ca

288,
32.

ca quoque secanda est: quia non c facile à
 cute & subjecta carne ea separatur. At in
 cæteris ipsa tunica inviolata servanda est.
 Protinus autem, cum ista alba & intenta se
 5 ostendit, tum scalpelli manubriolo didu-
 cenda à cute & carne est, ejiciendaque cum
 eo, quod intus tenet. Si quando tamen ab
 inferiore parte tunicæ musculus inhæsit, ne
 is lædatur, superior pars illius decidenda,
 10 alia ibidem relinquenda est. Ubi tota ex-
 empta est, committendæ oræ, fibulaque
 his injicienda, & super medicamentum
 glutinans dandum est. Ubi vel tota tunica,
 vel aliquid ex ea relictum est, pus moven-
 15 tia adhibenda sunt,

C A P. VII.

*De Oculorum vitiis, quæ scalpello
 & manu curantur.*

20 S E D ut hæc neque genere vitii, neque
 ratione curationis inter se multum di-
 stant: sic in oculis, quæ manum postu-
 lant, & ipsa diversa sunt, & aliter aliter-
 que curantur. Igitur in superioribus pal-
 25 pebris vesicæ * nasci solent, pingues graves-
 que; quæ vix attollere oculos sinunt, le-
 vesque pituitæ cursus, sed assiduos, in ocu-
 lis movent. Fere vero in pueris nascuntur.
 Oportet, compresso digitis duobus oculo,
 30 atque ita cute intenta, scalpello transversa
 linea incidere, suspensa leviter manu, ne
 vesica ipsa vulneretur, & ut, loco ei pate-
 facto, ipsa prorumpat; tum digitis eam ap-
 prehendere, & evellere. facile enim sequi-
 tur.

Dd 3

tur. Dein superinungi collyrio debet ex iis aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur: quo paucissimis diebus cicatricula inducitur. Molestius est, ubi incisa vesica est. effundit enim humorem; neque postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri movendo sunt.

2. De Crithe. a

In eadem palpebra super pilorum locum tuberculum parvulum nascitur, quod à similitudine * hordei, à Græcis *κριθή* nominatur. Tunica quiddam, quod difficile maturescit, comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta foveri oportet sic, ne nimius is calor sit, sed facile à parte sustineatur, hac enim ratione sæpe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello dividi debet, & quicquid intus humoris est, exprimi: eodem deinde vapore postea quoque foveri, & superinungi, donec ad sanitatem perveniat.

3. De Chalazio. b

Alia quoque quædam in palpebris huic non dissimilia nascuntur; sed neque utique figuræ ejusdem, & mobilia, simulatque digito huc vel illuc impelluntur. Quæ, quia grandini similia sunt, *χαλαζία* Græci vocant. Hæc incidi debent, si sub cute sunt, ab interiore parte; si sub cartilagine, ab interiore: dein scalpelli manubriolo deducenda ab integris partibus sunt. Ac, si intus plaga est, inungendum primo lenibus, dein-

a Æginet. III, 22. A&uar. M. M. II, 7. * *Paralus* dicitur Marcell. de Med. C. VIII. pag. 279. b A&uar. M. M. II, 7.

Cap. 7. MEDICINA. 423
deinde acrioribus. si extra, superdandum
emplastrum, quo id glutinetur.

4. *De Ungue oculorum.* c

Unguis vero, quod *πτερόγιον* Græci vo-
cant, est membranula nervosa, quæ oriens
ab angulo, nonnunquam ad pupillam quo-
que pervenit, eique officit. Sæpius à narium,
interdum etiam à temporum parte nasci-
tur. Hunc recentem non difficile est discu-
tere medicamentis, quibus cicatrices in
oculis extenuantur. Si inveteravit, jamque
ei crassitudo quoque accessit, excidi debet.
Post abstinentiam vero unius diei, vel ad-
versus in sedili contra medicum is homo
collocandus est, vel sic averfus, ut in gre-
mium ejus caput resupinus effundat. Qui-
dam, si in sinistro oculo vitium est, adver-
sum: si in dextro, resupinum collocari
volunt. Alteram autem palpebram à mini-
stro diduci oportet, alteram à medico: sed
ab hoc, si ille adversus est, inferiorem; si
supinus, superiorem. Tum idem medicus
hamulum acutum, paulum mucrone intus
recurvato, subjicere extremo ungui debet,
eumque infigere; atque eam quoque pal-
pebram tradere alteri: ipse, hamulo appre-
henso, levare unguem, eumque acu traji-
cere linum trahente; deinde acum ponere,
lini duo capita apprehendere, & per ea
erecto ungue, si qua parte oculo inhæret,
manubriolo scalpelli diducere, donec ad an-
gulum veniat; deinde invicem modo remit-
tere, modo attrahere, ut sic & initium ejus, &
finis anguli reperiatur. Duplex enim pericu-

D d 4

lum

c Æginet. III, 22. VI, 18. H. F. ab Aquapend.
Oper. Chirurg. Part. 1. Cap. 18.

lum est; ne vel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem; vel ex angulo quoque caruncula abscindatur, quæ, si vehementius unguis ducitur, sequitur quoque ac decidit. Si abscissa est, patefit foramen, per quod postea semper humor descendit: *d puncta* Græci vocant. Verus ergo anguli finis utique noscendus est; qui ubi satis constitit; non nimium adducto ungue scalpellus adhibendus est; deinde sic excidenda membrana, ne quid ex angulo lædatur. Ei deinde ex melle linamentum superdandum est, supraque linteolum, & aut spongia aut lana succida: proximisque diebus diducendus quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebræ glutinentur (siquidem id quoque tertium periculum accedit) eodemque modo linamentum imponendum, ac novissime inungendum collyrio, quo ulcera ad cicatricem perducuntur.

Sed ea curatio vere esse debet, aut certe ante hiemen. De qua re, ad plura loca pertinente, semel dixisse satis erit. Nam duo genera curationum sunt: alia, in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod incidit; sicut in vulneribus, & fistulis: alia, in quibus nullus dies urget, & expectare tutissimum & facile est; sicut evenit in iis, quæ & tarde increscunt, & dolore non cruciant. In his ver expectandum est: aut, si quid magis prestat, melior tamen autumnus quam hiems vel æstas est; atque is ipse medius, jam fractis

385, 5.

etis æstibus, & nondum ortis frigoribus. Quo magis autem necessaria pars erit, quæ tractabitur, hoc quoque majori periculo subjecta est. & sæpe, quo major plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio servabitur.

5. De Encanthide. *

Ex curatione vero unguis, ut dixi, vitia nascuntur, quæ ipsa aliis quoque de causis oriri solent. Interdum enim fit in angulo, parum ungue exciso, vel aliter, tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur; ἰγκανθίς e Græce nominatur. Excipi hamulo, & circumcidi debet: hic quoque diligenter temperata manu, ne quid ex ipso angulo abscindatur. Tum exiguum linamentum respergendum est vel cadmia, vel atramento futorio; inque eum angulum, ductis palpebris, inferendum, supraque eodem modo deligandum: proximisque diebus similiter nutriendum, ut primo tantum aqua egelida, vel etiam frigida foveatur.

6. De Ancyloblepharo. †

Interdum inter se palpebræ coalescunt, aperiri que non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebræ cum albo oculi cohærescant; scilicet, cum in utrovis fuit ulcus negligenter curatum. fanescendo enim, quod diduci potuit & debuit, glutinabitur; ἀγκυλοβλήφαρον sub utroque vitium Græci vocant. Palpebræ tantum inter se cohærentes, non difficulter diducuntur; sed interdum frustra. nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet;

* Tulpius Observ. lib. I. cap. 29. H.F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 19. e Æginet. III, 22. Acuar. M. M. IV, 11. † Æginet. III, 22. VI, 15.

tet; quia bene res sæpius cedit. Igitur † ad-
 versum * specillum inferendum, diducendæ-
 que eo palpebræ sunt: deinde exigua peni-
 cilla interponenda, donec exulceratio ejus
 loci finiatur. At, ubi albo ipsius oculi palpe-
 bra inhæsit, Heraclides Tarentinus author est,
 adverso scalpello subsecare, magna cum mo-
 deratione, ut neque ex oculo, neque ex pal-
 pebra quicquam abscindatur; ac, si necesse
 est, ex palpebra potius. Post hæc, inungatur
 oculus medicamentis, quibus aspritudo cura-
 tur: quotidieque palpebra vertatur, non so-
 lum ut ulceri medicamentum inducatur, sed
 etiam ne inhæreat: ipsique etiam ægro præ-
 cipiatur, ut sæpe eam duobus digitis attollat.
 Ego sic restitutum esse neminem memini.
 Meges se quoque multa tentasse, neque um-
 quam profuisse, quia semper iterum oculo
 palpebra inhæserit, memoriæ prodidit.

7. De Ægilope. g

Etiamnum in angulo, qui naribus propior
 est, ex aliquo vitio quasi parva fistula aperit-
 ur, per quam pituita assidue destillat: *αιγίλωπα*
 Græci vocant. Idque assidue male habet ocu-
 lum: nonnunquam etiam exeso osse, usque
 ad nares penetrat. Idque interdum naturam
 carcinomatis habet: ubi intentæ venæ & re-
 curvatæ sunt, color pallet, cutis dura est, &
 levi tactu irritatur, inflammationemque in
 eas partes, quæ conjunctæ sunt, evocat. Ex
 his eos, qui quasi carcinoma habent, curare
 periculosum est. nam mortem quoque ea res
 ma-

† *Aversum* legendum esse constat ex H. F. ab Aquap.
 Chirurg. Oper. Part. I, c. 7. qui meretur inspicere. * Quid
 sit docet H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. Part. I. c. 7. p.
 46. g Actuar. M. M. IV. 11. Aëlius Tetr. II. Serm. III,
 86. H. F. ab Aquap. Oper. Chirurg. Part. I, c. 21.

maturat. Eos vero, quibus ad nares tendit, supervacuum. neque enim sanescunt. At, quibus id in angulo est, potest adhiberi curatio; cum eo, ne ignotum sit, esse difficilem. quanto autem angulo propius id foramen est, tanto difficilior est; quoniam perangustum est, in quo versari manus possit: recenti tamen re mederi facilius est. Hamulo autem summum ejus foraminis excipiendum; deinde totum id cavum, sicut in fistulis dixi, usque ad os excidendum; oculoque & cæteris junctis partibus bene obtectis, os ferramento adurendum est vehementius. quod si jam carie vexatum est, quo crassior huic squama abscedat, quidam adurentia imponunt; ut atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel æruginem rasam. quod & tardius & non idem facit. Osse adusto, curatio sequitur eadem, quæ in cæteris ustis.

412,
20.

8. De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.

Pili vero, qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consueverunt. Nam modo palpebræ summa cutis relaxatur, & procidit; quo fit, ut ejus pili ad ipsum oculum convertantur, quia non simul cartilago quoque se remittit: modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrescit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes vero hæc sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus h terrea ad similitudinem spathæ lata, in ignem conjicienda est: deinde candens, sublata palpebra sic, ut ejus perniciosi pili in conspectum curantis

rantis veniant, sub ipsis pilorum radicibus angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ transvehat: deinde iterum, tertioque ad alterum angulum. quo fit, ut omnes pilorum radices adustæ emoriantur. Tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat: atque ubi crustæ exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facillime autem id genus sanescit. Quidam aiunt, acu i transsui¹ juxta pilos exteriorem partem palpebræ oportere, eamque transmitti duplicem capillum muliebrem ducentem; atque ubi acus transiit, in ipsius capilli sinum, qua duplicatur, pilum esse injiciendum, & per eum in superiorem palpebræ partem attrahendum, ibique corpori adglutinandum, & imponendum medicamentum, quo foramen glutinetur. sic enim fore, ut is pilus in exteriorem partem postea spectet. Id primum fieri non potest, 2 nisi in pilo longiore; cum fere breves eo loci nascantur. Deinde si plures pili sunt, necesse est longum tormentum sit, & toties acus transiens magnam inflammationem moveat. Novissime, cum humor aliquis 2 ibi subsit, oculo & ante per pilos & tum per palpebræ foramina affecto, vix fieri potest, ut gluten, quo vinctus est pilus, non resolvatur: eoque fit, ut is eo, unde vi abductus est, redeat. Ea vero curatio, quæ 3 palpebræ laxioris ab omnibus frequenter, nihil habet dubii. Siquidem oportet confecto oculo mediam palpebræ cutem, siue ea superior, siue inferior est, apprehendere

dere digitis, ac levare. tum considerare, quantulo detracto futurum sit, ut naturaliter se habeat. Siquidem hic quoque duo pericula circumstant: si nimium fuerit excisum, ne contegi oculos non possit; si parum, ne nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit. Quod deinde incidendum videbitur, per duas lineas atramento notandum est sic, ut inter oram, quæ pilos
10 continet, & propiorem ei lineam, aliquid relinquatur, quod apprehendere acus postea possit. His constitutis, scalpellus adhibendus est: & si superior palpebra est, ante; si inferior, postea propius ipsis pilis incidendum: initiumque faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo, qui temporis; in dextro, ab eo, qui naribus propior est: idque, quod inter duas lineas est, excidendum. deinde oræ vulneris inter se simplici
20 futura committendæ, operiendusque oculus est: & si parum palpebra descendet, laxanda utique; si nimium, aut adstringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ulteriore ora excidenda. Ubi secta est, aliæ futura
25 turæ adjiciendæ, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc, in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent. Idque, si levis inclinatio est, etiam solum
30 satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, spongia, ex aqua frigida expressa, super deliganda est. Postero die glutinans emplastrum injiciendum. Quarto futura tollenda est, & collyrio, quod inflammatio-

mationes reprimit, superinungendum.

9. De Lagophthalamo. ^k

Nonnunquam autem, nimium sub hac curatione excisa cute, evenit, ut oculus non contegatur. Idque interdum etiam alia de causa fit. *λαγώφθαλμον* Græci appellant. In quo si nimium palpebræ deest, nulla id restituere curatio potest: si exiguum, mederi licet. Paulum infra supercilium cutis incidenda est lunata figura, cornibus ejus deorsum spectantibus. Altitudo esse plagæ usque ad cartilaginem * debet, ipsa illa nihil læsa. nam, si ea incisa est, palpebra concidit, neque attolli postea potest. Cute igitur tantum diducta sit, ut paululum in ima oculi ora descendat; hiantem scilicet super plaga. in quam linamentum injiciendum est, quod & conjungi diductam cutem prohibeat, & in medio carunculam creet: quæ ubi eum locum implevit, postea recte oculus operitur.

10. De Eutropio. ^l

Ut superioris autem palpebræ vitium est, quo parum descendit, ideoque oculum non contegit: sic inferioris, quo parum sursum attollitur, sed pendet & hiat, neque potest cum superiore committi. Atque id quoque evenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute. *εὐτρόπιον* Græci vocant. si ex mala curatione est, eadem ratio medicinæ est, quæ supra posita est: plagæ tantum cornua ad maxillas, non ad oculum convertenda sunt. Si ex senectute est, tenui feramento id

^k Æginet. VI, 10. Aëtius Tetr. II. Serm. III, c. 73.

* Vide H. F. ab Aquapend, Oper. Chir. Part. I, c. 14.

^l Actuar. M. M. II. 7.

id totum extrinsecus adurendum est; deinde melle inungendum à quarto die, vapore aquæ calidæ fovendum, inungendumque medicamentis ad cicatricem perducentibus.

11. De Staphylomate.

Hæc fere circa oculum in angulis palpebrisque incidere consueverunt. In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, five ruptis intus membranis aliquibus, five laxatis †; & similis figura macino fit, unde id *σαφύλωμα* Græci vocant. Curatio duplex est. Altera, ad ipsas radices per medium transfluere acu duo lina ducente; deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex inferiore adstringere inter se, quæ paulatim secando id excidant. Altera, in summa parte ejus ad lenticulæ magnitudinem excidere; deinde spodium aut cadmiam infricare. Utrolibet autem factò, album ovi lana excipiendum & imponendum; posteaque vapore aquæ calidæ fovendus oculus, & lenibus medicamentis ungendus est.

12. De Clavis oculorum.

Clavi autem vocantur callosa in albo oculi tubercula; quibus nomen à figuræ similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acu commodissimum est, infraque eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

13. De Oculorum natura.

Suffusionis jam alias feci mentionem; quia cum recens incidit, medicamentis quo-

† H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. Part. I. c. 17. in Æginet. III, 22. VI, 19. Aëtuar. M. M. II, 7. Aëtius Tetrab. II. Serm. III. 34. 35. Aliud proidentia genus observavit Tulpus Observ. L. I. cap. 28. in Aëtuar. M. II, 7.

quoque sæpe discutitur. sed, ubi vetustior facta est, manus curationem desiderat. quæ inter subtilissimas haberi potest. De qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. Cujus cognitio, cum ad plura loca pertineat, tum vel præcipue ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas: ex quibus superior à Græcis *κεφαλοειδης* vocatur; eaque, qua parte alba est, fatis crassa, pupillæ loco extenuatur. Huic interior adjuncta est media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, circa tenuis, ulterioribus partibus ipsa quoque plenior. quæ *χοειειδης* à Græcis nominatur. Hæ duæ tunicæ, cum interiora oculi cingant, rursus sub his coeunt; extenuatæque & in unum coactæ per foramen, quod inter ossa est, ad membranam cerebri perveniunt, eique inhærescunt. Sub his autem, qua parte pupilla est, locus vacuus est: deinde infra rursus tenuissima tunica, quam Herophilus *αραχνοειδης* nominavit. Ea media subsidit; eoque cavo continet quiddam, quod, à vitri similitudine, *υαλοειδης* Græci vocant. Id neque liquidum, neque aridum est; sed quasi concretus humor. Ex cujus colore pupillæ color vel niger est, vel cæsius, cum summa tota tunica alba sit. Id autem superveniens ab interiore parte membranula includit. Sub his gutta humoris est, ovi albo similis: à qua videndi facultas proficiscitur. *κρυσαλλοειδης* à Græcis nominatur.

14. De Suffusione.

369
18.

Igitur vel ex morbo, vel ex ictu concre-
 scit humor sub duabus tunicis*, qua locum
 vacuum esse proposui; isque paulatim in-
 5 durefcens, interiori potentia se opponit.
 Vitii ejus plures species sunt, quædam sana-
 biles, quædam quæ curationem non ad-
 mittunt. Nam si exigua suffusio est, si im-
 mobilis, colorem vero habet marinæ aquæ,
 10 vel ferri nitentis, à latere sensum aliquem
 fulgoris relinquit, spes superest. Si magna
 est, si nigra pars oculi, amissa naturali fi-
 gura, in aliam se vertit, si suffusioni color
 cœruleus est, aut auro similis, si labat, &
 15 hac atque illac movetur, vix unquam suc-
 curritur. Fere vero peior est, quo ex gra-
 viore morbo, majoribusve capitis dolori-
 bus, vel ictu vehementiore orta est. Neque
 idonea curationi senilis ætas est; quæ sine
 20 novo vitio, tamen aciem hebetem habet:
 ac ne puerilis quidem; sed inter has media
 ætas. Oculus quoque curationi neque exi-
 guus, neque concavus, satis opportunus
 est. Atque ipsius quoque suffusionis quæ-
 25 dam maturitas est. Expectandum igitur est,
 donec jam non fluere, sed duritie quadam
 concrevisse videatur.

Ante curationem autem modico cibo
 uti, bibere aquam triduo debet; pridie, ab
 30 omnibus abstinere. Post hæc in adverso
 sedili collocandus est loco lucido, lumine
 adverso, sic ut contra medicus paulo altius
 sedeat; à posteriore autem parte caput ejus,
 qui curabitur, minister contineat, & im-
 Ee mo-

* Hoc non usque adeo veritati consentire putat H.
 F. ab Aquapend. Oper. Chir. Part. 1. C. 16.

mobile id præstet : nam levi motu eripi
 acies in perpetuum potest. Quin etiam ip-
 se oculus, qui curabitur, immobilior fa-
 ciendus est, super alterum lana imposita &
 deligata. Curari vero sinister oculus dex- 5
 tra manu, dexter sinistra debet. Tum acus
 admovenda est, aut acuta, aut certe non
 nimium tenuis, eaque demittenda, sed re-
 cta, est per summas duas tunicas medio
 loco inter nigrum oculi & angulum tem- 15
 pori propiorem, è regione mediæ suffusio-
 nis sic, ne qua vena lædatur. Neque ta-
 men timide demittenda est, quia inani lo-
 co excipitur. Ad quem cum ventum est,
 ne mediocriter quidem peritus falli potest; 15
 quia prementi nihil renititur. Ubi eo ven-
 tum est, inclinanda acus ad ipsam suffu-
 sionem est, leniterque ibi verti & paulatim
 eam deducere infra regionem pupillæ de- 20
 bet; ubi deinde eam transiit, vehementius
 imprimi, ut inferiori parte insadat. Si hæ-
 sit, curatio expleta est. Si subinde redit,
 eadem acu magis concidenda, & in plures
 partes dissipanda est: quæ singulæ & faci-
 lius conduntur, & minus late officiunt. 25
 Post hæc educenda acus recta est, impo-
 nendumque est lana molli exceptum ovi
 album, & supra, quod inflammationem
 coerceat, atque ita devinciendum.

348,
 21.

Post hæc opus est quiete, abstinentia, 30
 lenium medicamentorum inunctionibus,
 cibo (qui postero die satis mature datur)
 primum liquido, ne maxillæ laborent;
 deinde, inflammatione finita, tali, qualis in
 vul-

vulneribus propositus. Quibus, ut aqua quoque diutius bibatur, necessario accedit.

15. *De Pituita oculorum..*

347

De pituitæ quoque tenuis cursu, qui
5 oculos infestat, quatenus medicamentis
agendum est, jam explicui. Nunc ad ea
veniam, quæ curationem ex manu postu-
lant. Animadvertimus autem quibusdam
nunquam siccescere oculos, sed semper hu-
10 more tenui madere: quæ res aspritudinem
continuat, & ex levibus momentis inflam-
mationes & lippitudines excitat, totam
denique vitam hominis infestat. Idque in
quibusdam nulla ope adjuvari potest, in
15 quibusdam sanabile est. Quod primum dis-
crimen nosse oportet, ut alteris succurra-
tur, alteris manus non injiciatur.

Ac primum supervacua curatio est in
his, qui ab infantibus id vitium habent;
20 quia necessario mansurum est usque mor-
tis diem. Deinde non necessaria etiam in
his, quibus non multa, sed acris pituita est:
siquidem manu nihil adjuvantur; medica-
mentis, & victus ratione, quæ crassiorem
25 pituitam reddit, ad sanitatem perveniunt.
Lata etiam capita vix medicinæ patent.
Tum interest, pituitam emittant venæ,
quæ inter calvariam & cutem sunt, an quæ
inter membranam cerebri & calvariam:
30 superiores enim per tempora oculos rigant;
inferiores, per eas membranas, quæ ab
oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem
adhiberi remedium his, quæ supra os fluunt;
non potest his, quæ ab osse. Ac ne his qui-

dem succurritur, quibus pituita utrinque descendit: quia levata altera parte, nihilominus altera infestat.

Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lip-
 pitudine pituita suspenditur, à superciliis
 usque ad verticem illini debent: si ficci
 oculi esse coeperunt, apparet per eas venas,
 quæ sub cute sunt, irrigari: si nihilomi-
 nus madent, manifestum est sub osse de-
 scendere: si est tumor, sed levior, duplex
 vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus
 reperiuntur, quos superiores venæ exerce-
 ant; ideoque pluribus etiam opitulari
 licet. Idque non in Græcia tantummodo,
 sed in aliis quoque gentibus celebre est:
 adeo ut nulla medicinæ pars magis per na-
 tiones quasque exposita sit.

Reperti in † Græcia sunt, qui novem li-
 neis cutem capitis inciderent: duabus in
 occipitio rectis, una super eas transversa:
 dein duabus super aures, una inter eas item
 transversa: tribus denique inter verticem
 & frontem rectis. Reperti sunt, qui à ver-
 tice recta eas lineas ad tempora deduce-
 rent; cognitisque, ex motu maxillarum,
 musculorum initiis, leviter super eos cu-
 tem inciderent, diductisque per retusos
 hamos oris, infererent linamenta sic, ut
 neque inter se cutis antiqui fines commit-
 terentur, & in medio caro cresceret, quæ
 venas, ex quibus ad oculos transfiret, adstrin-
 geret. Quidam etiam atramento duas li-
 neas duxerunt à media aure ad mediam al-
 teram

teram aurem; deinde à naribus ad verticem: tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt; & post sanguinem effusum, os ibidem adusserunt. Nihilominus
5 autem & in temporibus, & inter frontem atque verticem eminentibus venis idem candens ferrum admoverunt.

Frequens curatio est, venas in temporibus adurere, quæ fere quidem in ejusmodi
10 malo tument: sed tamen, ut inflentur magisque se ostendant, cervix ante modice deliganda est. Tenuibus autem ferramentis, & retusis venæ adurendæ; donec in oculos pituitæ cursus conquiescat. Id enim signum
15 est quasi excæcatorum itinerum, per quæ humor ferebatur.

Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditæque venæ sunt, ideoque legi non possunt, eodem modo cervice deligata†, retentoque ab ipso spiritu, quo magis venæ prodeant, atramento notare eas contra tempora, & inter verticem ac frontem: deinde cervice resoluta, qua notæ sunt, venas incidere, & sanguinem mittere:
25 ubi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. contra tempora quidem, timide: ne subjecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem vero & verticem, vehementer sic, ut squama ab osse recedat.

30 Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem usque ad os adurunt sic, ut squamam remittat. Sed nihil melius est, quam quod in Gallia quoque Comata fit, ubi venas in temporibus & in su-

Ec 3

periore

† H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurg. Part. I. c. 3.

periore capitis parte legunt. Aduſta quo modo curanda ſint, jam explicui. Nunc illud adjicio; neque ut cruſtæ decidant, neque ut ulcus impleatur, aduſtis venis, eſſe prope-
randum; ne vel ſanguis erumpat, vel cito ſup-
pus ſupprimatur: cum per hoc ſicceſcere eas partes opus ſit; per illud exhauriri opus non ſit. Si quando tamen ſanguis eru-
perit, infrianda medicamenta eſſe, quæ ſic ſanguinem ſupprimant, ut ne adurant. Quemadmodum autem venæ deligendæ ſint, quidque lectis his faciendum ſit, cum venero ad crurum varices, dicam.

C A P. VIII.

De Aurium morbis, qui manu & ſcalpello curantur.

VERUM ut oculi multiplicem curationem, etiam manus exigunt: ſic in auribus admodum pauca ſunt, quæ in hac medicinæ parte tractentur. Solet tamen evenire vel à prima natali die protinus, vel poſtea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen a in ea nullum ſit, ideoque audiendi uſu careat. Quod ubi incidit, ſpecillo tentandum eſt, alte ne id repletum, an in ſummo tantum glutinatum ſit. Nam ſi alte eſt, prementi non cedit: ſi in ſummo, ſpecillum protinus recipit. Illud attingi non oportet; ne ſine effectus ſpe oriatur diſtentio nervorum, & ex ea mortis periculum ſit: hoc facile curatur. Nam qua cavum eſſe debet, vel medicamentum aliquod im-
impo-

imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumque id patefactum, & jam ulcus purum est, injicienda eo pinna
 5 est, illita medicamento cicatricem inducente: circaque id, medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat; quo fit, ut ea remota, postea facultas audiendi sit.

- 10 At ubi aures perforatæ sunt, & offendunt, trajicere id cavum celeriter candente acu satis est, ut leniter ejus oræ exulcerentur; aut etiam adurente medicamento idem exulcerare: postea deinde imponere
 15 id quod purget; tum quod eum locum repleat, & cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est, sicut solet esse in his, qui majora pondera auribus gesserunt, incidere, quod super est, ad extremum
 20 oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire. quæ res cum in labris quoque & naribus fieri possit,
 25 eandem autem curationem habeat, simul explicanda est.

CAP. IX.

- 30 *Curta in auribus, labrisque ac naribus, quomodo sarciri & curari possint.* ^a

CURTA igitur in his tribus, ac si qua parte parva sunt, curari possunt: si qua majora sunt, aut non accipiunt curationem, aut ita per hanc ipsam defor-

Ee 4

man-

mantur, ut minus indecora ante fuerint. Atque in aure quidem & naribus deformitas sola timeri potest: in labris vero, si nimium contracta sunt, usus quoque necessario jactura fit; quia minus facile & ci-
bus assumitur, & sermo explicatur. Neque enim creatur ibi corpus; sed ex vicino adducitur. quod etsi in levi mutilatione, & nihil eripere, & fallere oculum potest; in magna, non potest. Neque senile autem
corpus, neque quod mali habitus est, neque in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinæ idoneum est; quia nusquam aut celerius cancer occupat, aut difficilius tollitur.

Ratio curationis ejusmodi est: id quod curtatum est, in quadratum redigere; ab interioribus ejus angulis lineas transversas incidere, quæ citiorem partem ab ulteriore ex toto diducant; deinde ea, quæ
sic ^b resolvimus, in unum adducere. Si non satis junguntur, ultra lineas, quas ante fecimus, alias duas lunatas, & ad plagam conversas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur: sic enim fit, ut facilius
quod adducitur, sequi possit. quod non vi cogendum est; sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, & dimissum non multum recedat.

Interdum tamen ab altera parte cutis
haud omnino adducta deformem, quem reliquit locum, reddit. Hujusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta habenda est. Ergo neque ex imis auribus, neque ex
me-

^b Al. *repositimus*.

medio naso imisve narium partibus, neque ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. Utrunque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis aut mediis naribus, aut mediis labris deerit. Quæ tamen interdum etiam duobus locis curta esse consueverunt: sed eadem ratio curandi est. Si cartilago in eo, quod incisum est, eminet, excidenda est: neque enim aut
 10 glutinatur, aut acu tuto trajicitur. Neque longe tamen excidi debet, ne inter duas oras liberæ cutis utrinque coitus puris fieri possit. Tum junctæ oræ inter se suendæ sunt, utrinque cute apprehensa; & qua
 15 priores lineæ sunt, ea quoque futuræ injiciendæ sunt. Siccis locis, uti naribus illita spuma argenti, satis proficit. In interiores vero, lunatasque plagas, linamentum dandum est; ut caro increscens vulnus im-
 20 pleat. Summaque cura, quod ita sutum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fovendum erit vapore aquæ calidæ: rursusque idem medicamentum
 25 injiciendum. quo fere septimo die glutinatum est. Tum futuræ eximi, & ulcus ad sanitatem perducere debet.

C A P X,

30 De Polypo. 2

380.

POLYPUM vero, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari jam alias posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto, in modum * spathæ facto, resolvere

Ee 5

ab

a Æginet. VI, 25. H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I, c. 24. 25. * De hac consule Rhodium, ad Scribon. Largum, pag. 46.

ab osse oportet: adhibita diligentia, ne infra cartilago lædatur; in qua difficilis curatio est. Ubi abscissus est, unco ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentum, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur, eoque nares leniter implendæ. Sanguine suppresso, linamento ulcus purgandum est. Ubi purum est, eo pinna, eodem modo, quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat,

439. 5.

C A P. XI.

379.

De Ozæna.

ID autem vitium, quod *ὄζαυα* à Græcis vocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos Chirurgos non reperi. Credo, quia res raro ad sanitatem satis proficit; cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. Apud quosdam tamen positum est, vel subtilem† fistulam, vel enodem scriptorium calamum * in narem esse conjiciendum, donec sursum ad os perveniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum os: deinde adustum locum purgandum esse ærugine & melle: ubi purus est, lycio ad sanitatem perducendum. Vel narem incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius candens ferramentum admoveri. Tum sui narem debere; & adustum quidem

† *Fistilem* legit H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. P. I. cap. 26. pag. 104. & 106. * Hodierni Chirurghi argenteum habent, H. F. ab Aquap. Oper. Chirur. P. I. c. 26.

dem ulcus eadem ratione curari: futuram vero illini vel spuma argenti, vel alio glutinante.

CAP. XII.

De Oris vitiis, quæ manu & ferro curantur.

I. De Dentibus. a

381.

IN ore quoque quædam manu curantur.

Ubi in primis dentes nonnunquam moventur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter gingivarum marcescentium vitium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingivis admove-
re, ut leviter attingat, non ut insadat. Adustræ
gingivæ melle illinendæ, & mulso eluendæ sunt. Ut pura ulcera esse cœperunt, arida medicamenta infrienda sunt ex his, quæ reprimunt.

Si vero dens dolores movet, eximique eum, quia medicamenta nihil adjuvant, placuit, circumradi debet, ut gingiva ab eo * resolvatur; tum is concutiendus est. Eademque facienda, donec bene moveatur. nam dens hærens cum summo periculo evellitur, ac nonnunquam maxilla loco movetur †. Idque etiam majore periculo in superioribus dentibus fit; quia potest tempora oculosve concutere. Tum, si fieri potest, manu; si minus, forcipe § dens excipiendus est.

At si exesus est ante, id foramen vel b linamento, vel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forcipe confringatur.

Recta

a Æginet. III, 26. * Id sæpenumero sufficit teste Simone Paulo Quadr. Botan. pag. 151. † Imo pars avellitur, quod aliquando ipse vidi. § Vide figuram apud Rhodium ad Scrib. Largum, pag. 94. b. Æginet VI, 28.

Recta vero forceps ducendus est, ne inflexis radicibus os rarum, cui dens inhæret, parte aliqua frangatur. Neque ideo nullum ejus rei periculum est; utique in dentibus brevibus, qui fere longiores radices habent: sæpe enim forceps, cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingivæ prehendit & frangit.

Protinus autem, ubi plus sanguinis profuit, scire licet, aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo conquirenda est testa, quæ recessit, & vulsellâ protrahenda est: si non sequitur, incidi gingiva debet, donec labans ossi testa recipiatur. Quod si fractum statim non est, sed intumescit extrinsecus maxilla, ut os hiare non possit, foris imponendum calidum ex farina & fico cataplasma est, donec ibi pus moveatur: tum incidi gingiva debet. Pus quoque multum profluens, ossis fracti nota est. Itaque etiam tum id extrahi convenit. Nonnunquam etiam, eo læso, fissura fit. quæ eradi debet.

Dens autem scaber, qua parte niger est, radendus est, illinendusque rosæ flore contrito, cui gallæ quarta pars & altera myrrhæ sit adjecta: continendumque ore crebro vinum meracum. Atque in eo casu velandum caput, ambulatione multa, frictione capitis, cibo non acri utendum est.

At, si ex ictu vel alio casu aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene hærent, vinciendi sunt; continendaque ore reprimenda,
mentia,

mentia, ut vinum, in quo malicorium decoctum, aut in quod galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris ante dens nascitur, quam prior excidat, is, qui
 5 cadere debuit, circumradendus & evellendus est; is, qui natus est in locum prioris, quotidie digito adurgendus, donec ad justam magnitudinem perveniat. Quotiescunque dente exempto radix relicta est,
 10 protinus ea quoque ad id facto forcipe, quam *πισάργαν* * Græci vocant, eximenda est.

2. De Tonsillis induratis.

383.

Tonsillas autem, quæ post inflammationes induruerunt, *αἰσινάδες* autem à Græcis
 15 appellantur, cum sub levi tunica sint, oportet digito circumradere & evellere: si ne sic quidem resolvuntur, hamulo excipere, & scalpello excidere: tum ulcus aceto eluere, & illinire vulnus medicamento, quo
 20 sanguis supprimitur.

3. De Uva.

389.

Uva, si cum inflammatione descendit, dolorique est, & subrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest: solet enim
 25 multum sanguinem effundere, itaque melius est iis uti, quæ alias proposita sunt. Si vero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra justum modum à pituita diducta est, & tenuis, acuta, alba
 30 est, præcidi debet. Itemque, si ima, livida & crassa; summa, tenuis est. Neque quicquam commodius est, quam vulsellâ apprehendere, sub eaque, quod volumus, excidere. Neque enim ullum periculum est,

DE

ne plus minusve præcidatur : cum liceat tantum infra vulsellam relinquere, quantum inutile esse manifestum est; idque præcidere, quo longior uva est, quam esse naturaliter debet. Post curationem eadem facienda sunt, quæ in tonsillis proxime posui.

387.

4. De Lingua.

Lingua vero quibusdam cum subjecta parte à primo natali die juncta est; qui ob id ne c loqui quidem possunt. Horum extrema lingua vulsella apprehendenda est, sub eaque membrana incidenda : magna cura habita, ne venæ, quæ juxta sunt, violentur, & profusione sanguinis noceant. Reliqua curatio vulneris in prioribus posita est. Et plerique quidem, ubi confanuerunt, loquuntur. Ego autem cognovi, qui, succisa lingua, cum abunde super dentes eam promeret, non tamen loquendi facultatem consecutus est. Adeo in medicina, etiam, ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id, quod consequi convenit.

5. De Abscessu sub lingua.*

Sub lingua quoque interdum aliquid abscedit; quod fere consistit in tunica, doloreque magnos movet. Quod si exiguum est, incidi semel satis est: si majus, summa cutis usque ad tunicam excidenda est; deinde utrinque oræ hamulis excipiendæ, & tunica, undique circumdata, liberanda est: magna diligentia per hanc curationem habita, ne qua major vena incidatur.

6. De

6. De Labris. d

Labra autem sæpe finduntur, eaque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur; qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has si in summo sunt, medicamentis curare commodius est, quæ ad ulcera oris fiunt: si vero altius descenderunt, necessarium est tenui ferramento adurere. quod spathæ simile, quasi transcurrere, non imprimi debet. postea facienda eadem sunt, quæ in naribus adustis exposita sunt.

C A P. X I I I.

De Cervicis vitio.

AT in cervice, inter cutem & asperam arteriam, tumor increscit (βρογχονή-
λιν a Græci vocant) quo, modo caro hebes, modo humor aliquis, melli aquæ-
ve similis, includitur; interdum etiam minutis ossibus pili immisti. Ex quibus quicquid est, quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari. Quibus summa cutis cum subjecta tunica b exurit. quo facto, siue humor est, profluit; siue quid densius, digitis educitur: tum ulcus sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio brevior est. Medio tumor una linea inciditur usque ad tunicam: deinde vitiosus sinus ab integro corpore digito separatur, totusque cum velamento suo eximitur: tum aceto, cui vel salem vel nitrum aliquis adjecit, eluitur; oræque una futura junguntur; cæteraque eadem, quæ in aliis su-

d Oribas. de Loc. Affe&. IV, 56. a Æginet. VI, 38.
b Edit. Aldi, Steph. exeditur, Al. exeritur.

futuris, superinjiciuntur: leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur. Si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia, linamentisque id curandum, & cæteris pus moventibus.

C A P. X I V.

De Umbilici vitiis. a

392.

SUNT etiam circa umbilicum plura vitia; de quibus, propter raritatem, inter authores parum constat. Verisimile est autem, id à quoque prætermisum, quod ipse non cognoverat: à nullo id, quod non viderat, fictum. Commune omnibus est, umbilicum indecore prominere. Causæ requiruntur? Meges tres has posuit: modo intestinum eo irrumpere, modo omentum, modo humorem. Sistratus nihil de omento dixit. Duobus iisdem adjecit, carnem ibi interdum increfcere, eamque modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit: sed eadem tria causatus, spiritum quoque interdum eo dixit irrumpere. Heron omnibus his quatuor positis, & omenti mentionem habuit, & ejus, quod simul & omentum & intestinum habuerit.

^b Quod autem horum sit, his indiciis cognoscitur. Ubi intestinum prolapsum est, tumor neque durus, neque mollis est: omni frigore minuitur; non solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit: sonat interdum; atque, ubi resupinatus est aliquis, relapso intestino, ipse desidit. Ubi
vero

a Æginet. VI, 51. H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. I. c. 52. b Ald. Steph. *quid*.

vero omentum est, cætera similia sunt, tumor mollior, & ab c ima parte extenuatus in verticem est; si quis apprehendit, elabatur. Ubi utrumque est, indicia quoque mixta sunt, & inter utrunque mollities. At caro durior est, semperque etiam resupinato corpore tumet, prementique non cedit, prioribus facile cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. Humor autem, si premittitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit, sed protinus redit: resupinato quoque corpore tumorem in eadem figura tenet.

Ex his id, quod ex spiritu vitium est, medicinam non admittit. Caro quoque, carcinomati similis, cum periculo tractatur. itaque omittenda est. Sana excidi debet; idque vulnus linamentis curari. Humorem quidam vel inciso summo tumore effundunt, & vulnus iisdem linamentis curant. In reliquis variæ sententiæ sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse, res ipsa testatur; ut in uterum, sive intestinum, sive omentum est, relabatur. Si nus vero umbilici, tum vacuus, à quibusdam duabus regulis excipitur; vehementerque earum capitibus deligatis, ibi emoritur: à quibusdam d ad imum acu trajectatur, duo lina ducente; deinde utriusque lini duobus capitibus diversæ partes adstrunguntur, (quod in uva quoque oculi fit:) nam sic id, quod supra vinculum est, moritur. Adjecerunt quidam, ut antequam vincirent, summum una linea inciderent;

F f

quo

quo facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent: tum deinde vincirent. Sed abunde est, jubere spiritum continere, ut tumor, quantus maximus esse potest, se ostendat: tum imam basim ejus atramento notare; resupinatoque homine, digitis tumorem eum premere, ut, si quid relapsum non est, manu cogatur: post hæc, umbilicum adtrahere, & qua nota atramenti est, lino vehementer adstringere: deinde partem superiorem aut medicamentis, aut ferro adurere, donec emoriatur: atque, ut cætera usta, ulcus nutrire. Idque non solum ubi intestinum, vel omentum, vel utrumque est; sed etiam, ubi humor est, optime proficit.

Sed ante quædam visenda sunt, ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est; sed à septimo fere anno ad quartum decimum. Deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est: at quod mali habitus est, quodque papulas, impetigines, similiaque habet, idoneum non est. Levibus quoque tumoribus facile subvenitur: at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale, & hibernum vitandum est. Ver idoneum maxime est. Ac prima æstas non aliena est. Præter hæc, abstinere pridie debet. Neque id satis est: sed alvus quoque ei ducenda est; quo facilius omnia quæ excesserunt, intra uterum confidant.

stero die rursus fistulam demittunt (quod recens vulnus paululum diductum patitur) ut, si quid humoris superest, emittatur: idque bis ita fecisse contenti sunt.

C A P. XVI.

*De Ventre ictu perforato, &
Intestinis vulneratis. a*

NONNUNQUAM autem venter ictu aliquo perforatur; sequiturque, ut intestina evolvantur. Quod ubi incidit, protinus considerandum est, an integra ea sint; deinde, an his color suus maneat. Si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse, jam retuli. Latius intestinum sui potest: non quod certa fiducia sit; sed quod dubia spes, certa desperatione sit potior. interdum enim glutinatur. Tum, si utrumlibet intestinum lividum, aut pallidum, aut nigrum est, quibus illud quoque necessario accedit, ut sensu careat, medicina omnis inanis est. Si vero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est: momento enim alienantur externo & infueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est, coxis erectioribus; &, si angustius vulnus est, quam ut intestina commode refundantur, incidendum est, donec satis pateat. Ac, si jam ficciora intestina sunt, perlucida aqua sunt, cui paululum admodum olei sit adjectum. Tum minister oras vulneris leniter diducere manibus suis, vel etiam duobus hamis, membranæ interiori injectis,

a H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurg. P. 1.

ctis, debet: medicus priora semper intestina, quæ posteriora prolapsa sunt, condere sic, ut orbium singulorum locum servet. Repositis omnibus, leniter homo concutien-
5 dus est. quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes reducantur, & in his confidant. His conditis, omentum quoque considerandum est: ex quo, si quid jam nigri & emortui est, forfice excidi debet: si quid
10 integrum est, leniter super intestina reduci: futura autem, neque summæ cutis, neque interioris membranæ per se, satis proficit; sed utriusque. Et quidem è duobus linis facienda est, & spissior quam alibi;
15 quia & rumpi facilius motu ventris potest, & non æque magnis inflammationibus pars ea exposita est. Igitur in duas acus fila conjicienda, exque duabus manibus tenendæ; & prius interiori membranæ futura inji-
20 cienda est sic, ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinisterrima à principio vulneris orsa, ab interiori parte in exteriorem acum immittat. quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acum longè sit, quæ
25 acuta; propinqua, quæ retusa est. Semel utraque parte trajecta, permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quæ fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra continuit: iterumque eodem modo per
30 oras immittendæ sunt: atque ita tertio & quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus includenda plaga. Post hæc, eadem fila, eademque acus ad cutem transferendæ, similique ratione ei quoque parti

utraq; futura injicienda; semper ab interiore parte acubus venientibus, semper inter manus trajectis. Dein glutinantia injicienda. Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto expressam accedere debere, manifestius est, quam ut semper dicendum sit. Impositis his leniter deligari venter debet.

C A P. XVII.

*De Interiore membrana
abdominis rupta. a*

INTERDUM tamen vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub gravi fasce, interior abdominis membrana, superiore cute integra, rumpitur. Quod foeminis quoque ex utero saepe evenire consuevit: fitque praecipue circa ilia. Sequitur autem, cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intenta cutis indecora intumescat. Atque id quoque aliter atque aliter curatur. Quidam enim per acum duobus lineis ad imam basim immisis sic utrinque devinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in uva positum est, ut, quicquid super vinculum est, emoriatur. Quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folii (quod semper eodem modo servandum esse jam posui) & tum oras futura jungunt. Commodissimum est autem, re-supinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est, ea parte rupta membrana sit; quaque integra

449,
32.

gra est, ea magis obnitatur: tum, qua rupta videbitur, & incidendæ scalpello duæ tunicae sunt, ut exciso medio, interior membrana utrinque recentem plagam habeat; 5 quia, quod vetus est, futura non coit. Loco patefacto, si qua parte membrana non novam plagam, sed veterem habet, tenuis excidenda habena est, quæ tantum oras 467, 2. ejus exulceret. Cætera, quæ ad futuram, 10 reliquamque curationem pertinent, supra comprehensa sunt.

2. De Varicibus ventris.

Præter hæc evenit, ut in quorundam ventribus varices sint, quarum quia nulla 15 alia curatio est, quam quæ in cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus, hanc quoque eo differo. 495, 26.

CAP. XVIII.

20 De Testiculorum natura, & morbis *

VENIO autem ad ea, quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent. quæ quo facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda 25 est. Igitur testiculi simile quiddam glandulis habent. nam sanguinem non emittunt, & omni sensu carent: dolent autem in ictibus & inflammationibus tunicarum, quibus hi continentur. Dependent vero ab 30 inguinibus per singulos nervos, quos κρημνιστήρας Græci nominant, cum quorum utroque binæ descendunt & venæ & arteriæ. Hæc autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba, quæ ἐλυτροειδής

F f 4

à

a Edit. Ald. Steph. aliæque, immittendæ scalpello duæ lineæ. Cæsarius legit i. f. d. tunica. * H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. C. 71.

à Græcis nominatur. Super eam valentior tunica est, quæ interiori vehementer ima parte inhæret. *δαρτόν* Græci vocant. Multæ deinde membranulæ venas & arterias, eosque nervos comprehendunt; atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus tenues patulæque sunt. Hactenus propria utrique testiculo & velamenta & auxilia sunt. Communis deinde utrique, omnibusque interioribus sinus est, qui etiam conspicitur à nobis. *ὄρχεον* Græci, scrotum nostri vocant. Isque ab ima parte mediis tunicis leviter innexus, à superiore tantum circumdatus est.

398,
22.

Sub hoc igitur plura vitia esse consueverunt. quæ modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui, modo his integris fiunt. siquidem interdum vel ex morbo primum inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur, vel ex ictu aliquo protinus rumpitur tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus intestina debuit. Tum pondere eo devolvitur, aut omentum, aut etiam intestinum: atque ibi repta via, paulatim ab inguinibus in inferiores quoque partes nisum, subinde nervosas tunicas, & ob id, quod dixi patentes diducit. *ἐντεροκήλυξ* & *ἐπιπλοκήλυξ* Græci vocant: apud nos indecorum, sed commune his, herniæ nomen est.

Deinde, si descendit omentum, nunquam in scroto tumor tollitur, siue inedia fuit, siue corpus huc illucve conversum, aut alio quovis modo collocatum: itemque,

si

si retentus est spiritus, non magnopere increfcit, tactu vero inæqualis est, & mollis, & lubricus.

At si intestinum quoque descendit, tumor is sine inflammatione modo minuitur, modo increfcit; estque fere sine dolore &, cum conquiescit aliquis aut jacet, interdum ex toto defidit, interdum sic minuitur, ut in scroto exiguæ reliquæ maneat: at sub clamore, & fatietate, & si sub aliquo pondere is homo nixus est, crefcit: frigore omni contrahitur, calore diffunditur; estque tum scrotum & rotundum, & tactu leve: idque, quod subest, lubricum est; si pressum est, ad inguen revertitur; dimissumque, iterum cum quodam quasi murmure devolvitur. & id quidem in levioribus malis evenit. Nonnunquam autem stercore accepto vastius tumet, retroque compelli non potest: adfertque tum dolorem & scroto, & inguinibus, & abdomini. Nonnunquam stomachus quoque affectus primum rufam bilem per os reddit, deinde viridem, quibusdam etiam nigram.

Integris vero membranis interdum eam partem humor distendit. Atque ejus quoque species duæ sunt. Nam vel inter tunicas is increfcit, vel in membranis, quæ ibi circa venas & arterias sunt, ubi hæ gravatæ occalluerunt. Ac ne ei quidem humori, qui inter tunicas est, una sedes est. Nam modo inter summam & mediam, modo inter mediam & imam consistit.

468,
5.

Græci communi nomine, quicquid est, ὁδροκῆλιν appellant: nostri vero, scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hoc quoque sub eodem nomine, quo priora, habent.

Signa autem quædam communia sunt, quædam propria. Communia, quibus humor deprehenditur: propria, quibus locus. Humorem subesse discimus, si tumor est, nunquam ex toto se remittens, sed interdum levior, aut propter famem, aut propter febriculam, maximeque in pueris: isque mollis est, si non nimius humor subest; at, si is vehementer increvit, renititur sicut uter repletus & arcte adstrictus: venæ quoque in scroto inflantur; &, si digito premimus, cedit humor, circumfluenisque id, quod non premitur, attollit; & tanquam in vitro cornuve per scrotum apparet; isque, quantum in ipso est, sine dolore est. Sedes autem ejus sic deprehenditur. Si inter summam mediamque tunicam est, cum digitis duobus premimus, paulatim humor inter eos revertens subit: scrotum remissius & albidius est; si ducitur, aut nihil, aut paululum intenditur: testiculus ea parte neque visu, neque tactu sentitur. At, si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior coles sub tumore delitefcet.

468,
23.

Præter hæc æque integris tunicis ramex innascitur. κισσοκῆλιν Græci adpellant, cum venæ intumescunt. Hæ quandoque intortæ*, conglomeratæque ad superiorem partem, vel ipsum scrotum implent, vel
mediam

* De hac voce vide I. Rhodium de Acia, C. 15. p. 212.

mediam tunicam, vel imam: interdum
etiam sub ima tunica, circa ipsum testicu-
lum nervumque ejus, increſcunt. Ex is eæ,
quæ in ipſo ſcroto ſunt, oculis patent: hæ
5 vero, quæ mediæ imæve tunicæ inſident,
ut magis conditæ non æque quidem cer-
nuntur, ſed tamen etiam viſui ſubjectæ
ſunt: præterquam quod & tumoris aliquid
eſt, pro venarum magnitudine & modo; &
10 id prementi magis renititur, ac per ipſos
venarum toros inæquale eſt; &, qua parte
id eſt, teſticulus magis juſto dependet,
Cum vero etiam ſuper ipſum teſticulum
nervumque ejus id malum increvit, ali-
15 quanto longius teſticulus ipſe deſcendit,
minorque altero ſit, utpote alimento a-
miſſo.

Raro, ſed aliquando caro quoque inter
tunicas increſcit. *σαρκοκήλη* Græci vo- 470,
20 cant. 17.

Interdum etiam ex inflammatione tu-
met ipſe teſticulus, ac febres quoque ad-
fert; & niſi celeriter ea inflammatio con-
quievit, dolor ad inguina atque ilia perve-
25 nit; partesque hæ intumeſcunt, & nervus,
ex quo teſticulus dependet, plenior ſit, ſi-
mulque indureſcit.

Super hæc, inguen quoque nonnun-
quam ramices implent. *βεβανοκήλη* adpel- 471,
30 lant. † 4.

C A P. XIX.

*De Testiculorum curationibus communibus:
& primo de incisione & curatione
Inguinis, vel Scroti.*

HIs cognitis, de curatione dicendum est. In qua quædam communia omnium sunt, quædam propria singulorum. Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant. nam quæ vel sanari non possint, vel aliter nutrirī debeant, dicendum erit, simul ac ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. In utraque curatione homo ante per triduum bibere aquam; pridie abstinere etiam à cibo debet: ipso autem die collocari supinus: deinde, si inguen incidendum est, idque jam pube contegitur, ante radendum est: tum, extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, qua cum abdomine tunicæ inferiores committuntur. Aperendum autem audacter est, donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur, perveniatque ad eam, quæ media est. Plaga facta, foramen deorsum versus subest. In id demittendus est sinistræ manus digitus index, ut deductis intervenientibus membranulis, sinum laxet. Minister autem, sinistra manu comprehenso scroto, sursum versus eum debet extendere, & quam maxime ab inguinibus abducere; primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas,

nulas, quæ super mediam tunicam sunt, si digito diducere non potest, scalpello abscindat: deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ jungatur, digitoque inde promatur, & super ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde si qua vitiosa sunt, circuncidenda sunt. In quibus cum multæ venæ discurrent, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: majores vero ante
10 longiore lino deligandæ sunt; ne periculose sanguinem fundant.

Sin media tunica vexata erit, aut sub ea malum increverit, excidenda erit sic, ut alte ad ipsum inguen præcidatur. Infra
15 tamen non tota demenda est: nam quod ad basin testiculi vehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo non potest. itaque ibi relinquendum est.

20 Idem in ima quoque tunica, si læsa est, faciendum est. Sed non à summa inguinis plaga, verum infra paululum ea abscindenda; ne, læsa abdominis membrana, inflammationes moveat. Neque tamen nimium ex
25 ea rursus relinquendum est; ne postea sinuetur, & sedem eidem malo præstet.

Purgatus ita testiculus per ipsam plagam cum venis, & arteriis, & nervo suo leniter demittendus est; videndumque,
30 ne sanguis in scrotum descendat, neve concretus aliquo loco maneat. Quæ ita fient, si venis vinciendo medicus prospexerit. Lina, quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debent.

bunt. quæ, pure orto, sine ullo dolore excident. Ipsi autem plagæ injiciendæ duæ fibulæ sunt; & insuper medicamentum, quo glutinetur.

Solet interdum ab altera ora necessarium 5
esse aliquid excidi, ut cicatrix major & latior fiat. Quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leviter tantum ponenda sunt; supraque ea, quæ inflammationem repellant, id est, ex aceto vel lana succida, vel spongia: cætera eadem, quæ, ubi pus moveri debet, adhibenda sunt. At, cum infra incidi oportet, resupinato homine, subjicienda sub scroto sinistra manus est; deinde id vehementer apprehendendum, & incidendum; si parvulum est, quod nocet, modice, ut tertia pars integra, ad sustinendum testiculum, infra relinquitur: si majus est, etiam amplius, ut paululum tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit, integrum maneat. Sed primo rectus scalpellus quam levissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat: tum inclinandus mucro est, ut transversas membranas fecet, quæ inter 20
summam mediamque tunicam sunt. At, si vitium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet: si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est; sicut tertia quoque, si illa vitium tegit. Ubicumque 30
autem repertum malum est, ministrum ab inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet: medicum, digito manubriolove scalpelli diducta inferiore parte, tunicam

cam extra collocare; deinde eam ferramento, quod à similitudine corvum vocant incidere sic, ut intrare duo digiti, index & medius possint: his deinde confectis, incidenda reliqua pars tunicæ, & inter digitos scalpellus immittendus est, eximendumque aut effundendum quicquid est noxium.

Quamcunque autem tunicam quis violavit, illam quoque debet excidere; ac mediam quidem, ut supra dixi, quam altissime ad inguen; imam autem, paulo infra. Cæterum antequam excidantur, hæ quoque vinciri lino summa cura debent; & ejus lini capita extra plagam relinquenda sunt, sicut in aliis quoque venis, quæ id requisierint.

Eo factò, testiculus intus reponendus est: oræque scroti futuris inter se committendæ; neque paucis, ne parum glutinentur, & longior fiat curatio; neque multis, ne inflammationem augeant. Atque hic quoque videndum est, ne quid in scroto sanguinis maneat: tum imponenda glutinantia sunt.

Si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidve concretum ex eo decidit, incidi subter id debet; purgatoque eo spongia, acri aceto madens, circumdari. Deligatum autem vulnus omne, quod ex his causis factum est, si dolor nullus est, quinque primis diebus non est resolvendum, sed bis die tantum aceto irroranda, lana vel spongia imposita: si dolor est, ter-
tia

tia die resolvendum; &, ubi fibulæ sunt, hæ incidendæ; ubi linamentum, id mutandum est; rosaque & vino madefaciendum id, quod imponitur. Si inflammatio increfcit, adjiciendum prioribus cataplasma ex lenticula & melle; vel ex malicorio, quod in austero vino coctum fit; vel ex his mixtis. Si sub his inflammatio non conquierit, post diem quintum multa calida aqua vulnus fovendum, donec scrotum ipsum & extenuetur, & rugosius fiat: tum imponendum cataplasma ex triticea farina, cui resina pinea adjecta fit. quæ ipsa, si robustus curatur, ex aceto; si tener, ex melle coquenda sunt. Neque dubium est, quodcunque vitium fuit, si magna inflammatio est, quin ea quæ pus movent, imponenda sint.

Quod si pus in ipso scroto ortum est, paululum id incidi debet, ut exitus detur; linamentumque eatenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter nervos propiore cataplasmate, dein cerato utendum est. Hæc proprie ad ejusmodi vulnera pertinent. Cætera, & in curatione, & in victu, similia his esse debent, quæ in alio quoque vulnerum genere præcepimus.

C A P. XX.

De Intestini in scrotum devoluti curatione. 2 3

HIs propositis ad singulas species veniendum est. Ac, si cui parvulo puerō intestinum descendit, ante scalpellum

pellum experienda vinctura est. Fascia ejus rei causa fit, cui uno loco pila affuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi illi subjicitur: deinde reliqua
5 fasciæ pars arctè circumdatur. sub quo sæpe & intus compellitur intestinum, & inter se tunicæ glutinantur. Rursus, si ætas processit, multumque intestini descendisse ex tumore magno patet, adjiciunturque do-
10 lores & vomitus (quæ ex stercore, per cruditatem eo delapso, fere accidunt) scalpel- lum adhiberi sine perniciæ non posse, manifestum est: levandum tantummodo ma- lum, & per alias curationes extrahendum
15 est.

Sanguis mitti ex brachio debet: deinde, si vires patiuntur, imperanda tridui abstinentia est; si minus, certe pro vi corporis quam longissima. Eodem vero tempore su-
20 perhabendum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc, & farina hordeacea cum resina injicienda; & ipse demittendus in solum aquæ calidæ; cui oleum quoque adjectum
25 sit; dandumque aliquid cibi levis & calidi. Quidam etiam alvum ducunt. Id ducere ali- quid in scrotum potest, educere ex eo non potest. Per ea vero, quæ supra scripta sunt, levato malo, si quando alias dolor reverte-
30 rit, eadem erunt facienda.

Sine dolore quoque si multa intestina prolapsa sunt, secari supervacuum est: non quo excludi à scroto non possint (nisi tamen id inflammatio prohibuit) sed quo

repulsa inguinibus immorentur, ibique tumorem excitent, atque ita fiat mali non finis, sed mutatio.

At in eo, quem scalpello curari oportebit, simulatque ad mediam tunicam vulnus in inguine factum pervenerit, duobus hamulis ea juxta ipsas oras apprehendi debebit, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberet. Neque enim nisi cum periculo læditur, quæ incidenda est; cum intestinum esse, nisi sub ea, non possit. Ubi diducta autem erit, ab inguine usque ad testiculum incidi debebit sic, ne ipse lædatur; tum excidi. Fere tamen hanc curationem puerilis ætas, & modicum malum recipit.

Sin vir robustus est, majusque id vitium est, extrahi testiculus non debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione usque ad mediam tunicam scalpello aperitur; eaque tunica eodem modo duobus hamis excipitur sic, ut à sinistro testiculus eatenus contineatur, ne per vulnus exeat: tum ea tunica deorsum versus scalpello inciditur: sub eaque index digitus sinistræ manus ad imum testiculum demittitur, eumque ad plagam compellit: deinde dextræ manus duo digiti, pollex atque index, venam & arteriam & nervum tunicamque eorum à superiore tunica diducunt. quod si aliquæ membranulæ prohibent, scalpello resolvuntur, donec ante oculos tota jam tunica sit. Excisis, quæ excidenda sunt, repositoque testiculo,

culo, ab ora quoque ejus vulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulo latior est; quo major plaga sit, & plus creare carnis possit.

CAP. XXI.

De Omenti in scrotum prolapsi curatione.

AT si omentum descendit, eodem
 10 quidem modo, quo supra scriptum
 est, aperiendum inguen, diducen-
 dæque tunicæ sunt. Considerandum au-
 tem est, majorne ejus modus, an exiguus
 sit. Nam quod parvulum est, super inguen
 in uterum vel digito vel adverso specillo
 15 repellendum est: si plus est, sinere oportet
 dependere, quantum ex utero prolapsum
 est; idque adurentibus medicamentis illi-
 nere, donec a emoriatur & excidat. Quidam
 hic quoque duo lina acu trajiciunt, binif-
 20 que singulorum capitibus diversas partes
 adstringunt. Sub quo æque, sed tardius
 emoritur. Adjicitur tamen hic quoque
 celeritati, si omentum super vinculum
 illinitur medicamentis, quæ exedunt, nec
 25 erodunt. *συνίλαα* Græci vocant. Fuerunt
 etiam, qui omentum forfice præciderent.
 Quod in parvulo non est necessarium: si
 majus est, potest profusionem sanguinis
 facere; siquidem omentum quoque venis
 30 quibusdam, etiam majoribus illigatum est.
 Neque vero, si discisso ventre id, quod
 prolapsum est, forfice præciditur, cum &
 emortuum sit, & aliter tutius avelli non pos-
 sit, inde huc exemplum transferendum est.

Gg 2

Vul.

Vulnus autem curari, si reductum omentum est, futura debet: si id amplius fuit, & extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est.

458, 2.

2. *De Hernie aqueæ curatione.* b

Si vero humor intus est, incidendum est: in pueris quidem, inguen; nisi in his quoque liquoris ejus major modus prohibet: in viris vero, & ubicunque multus humor subest, scrotum. Deinde, si inguen incisum est, eo protractis tunicis humor effundi debet: si scrotum, & sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quam humor est effundendus, abscindendæque membræ sunt, si quæ eum continuerunt; deinde eluendum id ex aqua, quæ vel salem adjectum, vel nitrum habeat: si sub media, imæve tunica, totæ hæ extra scrotum collocandæ, excidendæque sunt.

CAP. XXII.

*De Ramicis curatione.*458,
31.

RAMEX *autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis, quæ ipsis venis insignantur; cum eo, ne amplius quam has urant; maximeque, ubi inter se implicatæ glomerantur, eo ferrum id admovendum est; tum super farina ex aqua frigida subacta injicienda est; utendumque eo vinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui: tertio die lenticula cum melle imponenda est: post, ejectis crustis, ulcera melle purganda, rosa implenda, & ad cicatricem aridis linamentis

400,
34.

b Æginet. VI, 62. * Hanc vocem exponit Salmasius Epist. 56.

mentis perducenda sunt. Quibus vero super mediam tunicam venæ tument, incidendum inguen est, atque tunica promenda, ab eaque venæ digito vel manubriolo scalpelli separandæ. qua parte vero inhærebunt, & ab superiore & ab inferiore parte lino vinciendæ; tum sub ipsis vinculis præcidendæ, reponendusque testiculus est. At, ubi supra tertiam tunicam ramex insedit, mediam excidi necesse est. Deinde, si duæ tresve venæ tument, & ita pars aliqua oblidetur, ut major eo vitio vacet, idem faciendum, quod supra scriptum est; ut ab inguine, & à testiculo deligatæ venæ præciantur,isque condatur. Sin totum id ramex obsederit, per plagam demittendus digitus index erit, subjiciendusque venis sic, ut paulatim eas protrahat æque adducendo, donec is testiculus par alteri fiat; tum fibulæ oris sic injiciendæ, ut simul eas quoque venas comprehendant. Id hoc modo fit. Acus ab exteriori parte oram vulneris perforatur: tum non per ipsam venam, sed per membranam ejus immittitur, per eamque in alteram oram compellitur. Venæ vulnerari non debent, ne sanguinem fundant. Membrana semper inter has venas est, ac neque periculum affert, & filo comprehensas illas abunde tenet. itaque etiam satis est, duas fibulas esse. Tum venæ, quæcunque protractæ sunt in ipsum inguen, averso specillo compelli debent. Solvendi fibulas tempus, inflammatione finita, & purgato vulnere, est; ut una simul & oras & venas cicatrix devinciatur.

Ubi vero inter imam tunicam & ipsum testiculum nervumque ejus ramex ortus est, una curatio est, quæ totum testiculum abscindit. Nam neque ad generationem quicquam is confert, & omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed tum quoque inguen incidendum, media tunica promenda, atque excidenda est: idem in ima faciendum; nervusque, ex quo testiculus dependet, præcidendus. Post id venæ & arteriæ ad inguen lino deligandæ, & infra vinculum abscindendæ sunt.

CAP. XXIII.

*De Carne, quæ inter tunicas testiculorum
concrevit, & de Nervo indurato. a*

459,
19.

CARO quoque, si quando inter tunicas increvit, nihil dubii est, quin exci- menda sit: sed id, ipso scroto inciso, fieri commodius est.

At, si nervus induruit, curari res neque manu, neque medicamento potest. Urgent enim, febres ardentes; & aut virides, aut nigri vomitus: præter hæc, ingens sitis, & linguæ aspritudo; fereque à die tertio spumans bilis alvo cum rosione redditur. Atque neque assumi facile cibus, neque contineri potest: neque multo post extremæ partes frigescunt, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur; deinde in fronte frigidus sudor, eumque mors sequitur.

CAP.

CAP. XXIV.

De Ramice inguinis. 2

5 **U**BI vero in ipso inguine ramex est, si ^{459,}
 tumor modicus est, semel incidi; si ^{29.}
 major, duabus lineis debet, ut me-
 dium excidatur: deinde, non extracto te-
 sticulo, sicut intestinis quoque prolapsis in-
 terdum fieri docui, colligendæ venæ, vin-
 10 ciendæque; ubi tunicis inhærebunt, & sub
 his nodis præcidendæ sunt. Neque quicquam
 novi curatio vulneris ejus requirit.

CAP. XXV.

15 *Ad tegendam Glandem colis, si nuda est. **

AB his ad ea transeundum est, quæ in
 cole ipso fiunt. In quo si glans nuda
 est, vultque aliquis eam decoris a cau- ^{393,}
 sa tegere, fieri potest: sed expeditius in ^{12.}
 20 puero, quam in viro; in eo, cui id naturale
 est, quam in eo, qui quarundam gentium
 more circumcissus est; in eo, cui glans parva
 juxtaque eam cutis spatiosior, brevis ipse
 coles est, quam in quo contraria his sunt.
 25 Curatio autem eorum, quibus id natura-
 le est, ejusmodi est. Cutis circa glandem
 prehenditur b & extenditur, donec illam
 ipsam condant; ibique deligatur: deinde, jux-
 ta pubem, in orbem tergitur inciditur, donec
 30 coles nudetur; magnaue cura cavetur, ne
 vel urinæ iter, vel venæ, quæ ibi sunt, in-
 cidantur. Eo facto, cutis ad vinculum in-
 clinatur, nudaturque circa pubem velut cir-
 culus; tum super eo linamenta dantur, ut ca-

Gg 4

ro

a Æginet. VI, 66. Aëtius Tetrab. IV, Serm. II, 24.

* H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. Part. I. C. 61.

a Æginet. VI, 53. b Æginet. VI, 53.

ro increſcat & id impleat, ſatisque vela-
menti ſupra latitudo plagæ præſtet. Sed,
donec cicatrix ſit, vinctum eſſe id debet; in
medio tantum relicto exiguo urinæ itine-
re. At in eo, qui circumciſus eſt, ſub circu-
lo glandis ſcalpello diducenda cutis ab in-
teriore cole eſt. Non ita dolet, quia, ſum-
mo ſoluto, diduci deorſum uſque ad pubem
manu poteſt; neque ideo ſanguis profluit.
Reſoluta autem cutis rurfus extenditur ul-
tra glandem: tum multa frigida aqua fove-
tur; emplaſtroque circumdatur, quod vā-
lenter inflammationem reprimat; proximis-
que diebus abſtinere, donec prope à fame
victus ſit, ne forte eam partem ſatietas ex-
citet. Ubi jam ſine inflammatione eſt, deli-
gari debet à pube uſque circulum: ſuper
glandem autem adverſo emplaſtro impoſito
induci. ſic enim ſit, ut inferior pars glutine-
tur; ſuperior ita ſaneſcat, ne inhæreat.

2. *Quomodo Glans penis conteſta aperiri poſſit.**

393,
43.

CONTRA, ſi glans ita conteſta eſt, ut
nudari non poſſit (quod vitium Græci
φίμωσιν a appellant) aperienda eſt.
Quod hoc modo ſit. Subter à ſumma ora,
cutis inciditur recta linea uſque ad fre-
num; atque ita ſuperius tergus relaxatum,
cedere retro poteſt. Quod ſi parum ſic
proſectum eſt, aut propter anguſtias, aut
propter duritiem tergoris, protinus trian-
gula forma cutis ab inferiore parte exci-
denda eſt ſic, ut vertex ejus ad frenum;
baſis in tergo extremo ſit. Tum ſuperdan-
da linamenta ſunt, aliaque medicamenta
quæ

* H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. I. c. 62.
a Æginet. VI, 54.

quæ ad sanitatem perducant. Neceſſarium autem eſt, donec cicatrix ſit, conquieſcere: nam ambulatio, atterendo ulcus ſordidum reddit.

3. Infibulandi ratio. *

Infibulare quoque adoleſcentulos interdum valetudinis cauſa quidam conſuerunt: ejuſque hæc ratio eſt. Cutis, quæ ſuper glandem eſt, extenditur, notaturque utrinque à lateribus atramento, qua perforetur; deinde remittitur. Si ſuper glandem notæ revertuntur, nimis apprehenſum eſt, & ultra notari debet: ſi glans ab his libera eſt, iſ locus idoneus fibulæ eſt. Tum, qua notæ ſunt, cutis acu filum ducente tranſuitur, ejuſque ſili capita inter ſe deligantur, quotidieque id movetur, donec circa foramina cicatriculæ fiant. Ubi hæ confirmatæ ſunt, excepto filo fibula inditur, quæ † quo levior, eo melior eſt. Sed hoc quidem ſæpius inter ſupervacua, quam inter neceſſaria eſt.

C A P. XXVI.

De Urina reddenda difficultate, & curatione. a

REs vero interdum cogit emoliri manu urinam, cum illa non redditur; aut quia ſenectute iter ejus collapſum eſt; aut quia calculus, vel concretum aliquid ex ſanguine intus ſe oppoſuit: ac mediocris quoque inflammatio ſæpe eam reddi naturaliter prohibet. Idque non in viris tantummodo, ſed in ſcæminis quoque interdum neceſſarium eſt. Ergo æneæ fiſtulæ

G g 5

fiunt:

* H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. Part. I. C. 63. † Rhodius de Acia, Cap. 6. pag. 83. a Æginet. VI. 59.

fiunt: exæque, ut omni corpori, ampliori minorique sufficiant, ad mares, tres; ad foeminas, duæ medico habendæ sunt. Ex virilibus maxima decem & quinque est digitorum; media, duodecim; minima, novem: ex mulieribus major, novem; minor, sex. Incurvas vero esse eas paululum, sed magis viriles oportet, lævesque admodum; ac neque nimis plenas, neque nimis tenues.

Homo tum resupinus eo modo, quo in curatione calculi figuratur, super subsellium aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere, sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra vero fistulam demittere in iter urinæ debet: atque ubi ad cervicem vesicæ ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam vesicam compellere, eamque, urina reddita, recipere. Foemina brevius urinæ iter, simul & rectius habet, quod carunculæ simile, inter imas oras super naturale positum, non minus sæpe auxilio eget, sed aliquanto minus difficultatis exhibet.

Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longe ab exitu inhærescit. Eum si fieri potest, oportet evellere, vel oriculario specillo, vel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. Sed id fieri non potuit, cutis extrema quamplurimum attrahenda &, condita glande, lino vincienda est: deinde à latere recta plaga coles

185,

30.

481,

22.

les incidendus, & calculus eximendus est: tum cutis remittenda. sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, & urina naturaliter profluat.

5 2. *Calculosis quæ curatio adhibeatur.* b

Cum vesicæ vero, calculique facta mentio sit; locus ipse exigere videtur, ut subiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam
10 festinare, cum præceps sit, nullo modo convenit. Ac neque omni tempore, neque in omni ætate, neque in omni vitio id experiendum est: sed solo vere, in eo corpore, quod
15 jam novem annos, nondum quatuordecim excessit; &, si tantum mali subest, ut neque medicamentis vinci possit, neque etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo non
interdum etiam temeraria medicina pro- 138.3.
20 ficiat; sed quo sæpius utique in hoc fallat, in quo plura & genera & tempora periculi sunt. quæ simul cum ipsa curatione proponam.

Igitur, ubi ultima experiri statutum est,
25 ante aliquot diebus victu corpus præparandum est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi vero inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad
30 vesicæ cervicem descendat. Quod an inciderit, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. Ubi ejus rei fides est, pridie is puer in jejunio continendus est; & tum loco calido curatio adhi-

adhibenda: quæ hoc modo ordinatur.

Homo prævalens & peritus in fedili alto confidit, supinumque eum & aversum, super genua sua coxis ejus collocatis, comprehendit; reductisque ejus cruribus, ipsum quoque jubet, manibus ad suos poplites datis, eos, quam maxime possit, attrahere; simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus ejus est, qui curatur, duobus sedilibus junctis, duo valentes insidunt: quorum & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atque alter, prout confedit, finistrum crus ejus, alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. Sive autem unus, sive duo continent, super humeros ejus suis pectoribus incumbunt. Ex quibus evenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extentus, & in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Præter hæc, etiamnum à lateribus duo valentes objiciuntur, qui circumstantes, labare vel unum vel duos, qui puerum continent, non sinunt.

Medicus deinde, diligenter unguibus circumcisis, sinistræ manus duos digitos, indicem & medium, leniter prius unctos oleo, simul in anum ejus demittit; dextræque digitos super imum abdomen leniter imponit; ne, si utrinque digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam lædat. Neque vero festinanter in hac re, ut in plerisque, agendum est; sed ita, ut
quam

quam maxime id tuto fiat. Nam læsa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. Ac primum circa cervicem quaritur calculus. ubi repertus, minore negotio expellitur. Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc indiciis suis cognitum est. Si vero aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam vesicam dantur; paulatimque dextra quoque manus ejus ultra translata subsequitur.

Atque, ubi repertus est calculus (qui necesse est in manus incidat) eo curiosius deducitur, quo minor læviorque est; ne effugiat, id est, ne sæpius agitanda vesica sit. Ergo ultra calculum dextra semper manus ei se opponit; sinistra eum compellit deorsum digitis, donec ad cervicem pervenitur. In quam, si oblongus est, sic compellendus est, ut ne pronus exeat: si planus, sic, ut transversus sit: si quadratus, ut duobus angulis sedeat: si altera parte plenior, sic, ut prius ea, qua tenuior sit, evadat. In rotundo nihil interesse, ex ipsa figura patet; nisi, si lævior altera parte est, ut ea antecedit.

Cum jam eo venit, ut super vesicæ cervicem sit, juxta anum incidi cutis plaga lunata usque ad cervicem vesicæ debet, cornibus ad coxas spectantibus paululum: deinde ea parte, qua strictior ima plaga est, etiamnum sub cute, altera transversa plaga facienda est, qua cervix aperiatur; donec urinæ iter pateat sic, ut plaga paulo major, quam calculus sit. Nam, qui metu
fistu-

fistulæ (quam illo loco d *ἐποπυλάδα* Græci vocant) parum patefaciunt, cum majore periculo eodem revolvuntur: quia calculus iter, cum vi promitur, facit, nisi accipit. idque etiam perniciosius est, si figura quoque calculi, vel aspritudo aliquid eo contulit. Ex quo & sanguinis profusio, & distentio nervorum fieri potest. quæ si quis evasit, multo tamen patientiorem fistulam habiturus est rupta cervice, quam habuisset, incisa.

Cum via perfecta est, in conspectum calculus venit: in cujus corpore multum discrimen est. Ideo, si exiguus est, digitis ab altera parte propelli, ab altera protrahi potest. Si major, injiciendus à superiore ei parte uncus est, ejus rei causa factus. Is est ad extremum tenuis, in semicirculi speciem retusæ latitudinis; ab * interiori parte lævis, qua corpori jungitur; ab interiori asper, qua caculum attingit. Isque longior potius esse debet: nam brevior extrahendi vim non habet. Ubi injectus est, in utrumque latus inclinandus est, ut appareat calculus, & teneatur, quia, si apprehensus est, ille simul inclinatur. Idque eo nomine opus est, ne, cum adduci uncus coeperit, calculus intus effugiat, hic in oram vulneris incidat, eamque convulneret. In qua re, quod periculum esset, jam supra proposui.

Ubi satis teneri calculum patet, eodem pene momento triplex motus adhibendus est: in utrumque latus; deinde extra, sic tamen

d Alii *χοπιάδα* vel *ἐπιάδα*. edit. optimæ *ἐπίθρα*.
anni 1497. *corhyada*. * anteriori vel exteriori.

tamen, ut leniter id fiat, paululumque primo calculus attrahatur: quo facto, attolendus uncus extremus est, uti intus magis maneat, faciliusque illum producat. Quod si aliquando à superiore parte calculus parum commodè comprehenditur, à latere erit apprehendendus. Hæc est simplicissima curatio.

10 Sed varietas rerum quasdam etiamnum animadversiones desiderat. Sunt enim quidam non asperi tantummodo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in cervicem, sine ullo periculo eximuntur.

15 In vesica vero, non tuto vel hi conquiruntur, vel attrahuntur: quoniam, ubi illam convulnerant, ex distentione nervorum mortem maturant; multoque magis, si spina aliqua vesicæ inhæret, eamque, cum deduceretur, duplicavit. Colligitur autem eo, quod difficilius urina redditur, in

20 cervice calculum esse; eo, quod cruenta distillat, illum esse spinosum: maximeque id sub digitis quoque experiendum est, neque adhibenda manus, nisi id consistit.

25 Ac tum quoque leniter intus digiti obijciendi, ne violenter promovendo convulnerent: tum incidendum. Multi hic quoque scalpello usi sunt. Meges (quoniam is

30 infirmior est, potestque in aliqua prominentia incidere, incisoque super illam corpore, qua cavum subest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi necesse sit) ferramentum fecit rectum, in summa parte labrosum, in ima semicirculatum acutum-

tumque. Id receptum inter duos digitos, indicem ac medium, super pollice imposito sic deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret. Quo consequebatur, ut semel, quantum satis esset, aperiret. Quocunque autem modo cervix ea parte secta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet; nulla propter festinationem, vi adnota.

3. *Signa calculorum, vel arenosorum, vel mollium.*

61, 16. At calculus arenosus, & ante manifestus est; quoniam urina, quæ redditur, arenosa est: & in ipsa curatione; quoniam inter subjectos digitos neque æque, sed leniter renititur, & insuper dilabitur. Item molles calculos, & ex pluribus minutisque, sed inter se parum adstrictis, compositos indicat urina, secum trahens quasdam quasi squamulas. Hos omneis, leniter permutatis subinde digitorum vicibus, sic oportet abducere, ne vesicam lædant, neve intus aliquæ dissipatæ reliquæ maneant, quæ postmodum curationi difficultatem faciant. Quicquid autem ex his in conspectum venit, vel digitis, vel unco eximendum est.

At, si plures calculi sunt, singuli protrahi debent; sic tamen, ut, si quis exiguus supererit, potius relinquatur. Siquidem in vesica difficulter invenitur; inventusque celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica læditur, excitatque inflammationes mortiferas; adeo ut quidam non secti, cum diu frustra per digitos vesica esset agitata,

tata, decesserint. Quibus accedit etiam, quod exiguus calculus, ad plagam urina postea promovente, excidit.

Si quando autem is major non videtur, nisi rupta cervice, extrahi posse, findendus est. cujus repertor Ammonius, qui ob id *Ἀμμόνιος* cognominatus est. Id hoc modo fit. Uncus injicitur calculo sic, ut facile eum conclusum quoque teneat, ne is retro revolvatur: tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ, prima parte tenui, sed retusa, quod admotum calculo, & ex altera parte ictum, findat; magna cura habita, ne aut ad ipsam vesicam ferramentum perveniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

4. De Calculis fœminarum.

Hæ vero curationes in fœminis quoque similes sunt; de quibus parum, proprie tamen quædam dicenda sunt. Siquidem in his, ubi parvulus calculus est, scalpellus supervacuus est; quia is urina in cervicem compellitur, quæ & brevior, e quam in maribus, & laxior est. Ergo & per se sæpe excidit, & si in urinæ itinere, quod est angustius, inhæret, eodem tamen unco sine ulla noxa educitur. At in majoribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subjici digiti tanquam masculo, mulieri per naturalia ejus debent. Tum, virgini quidem, sub ima finistiore ora; mulieri vero, inter urinæ iter & os pubis, incidendum est sic, ut utroque loco plaga transversa sit. neque terreri convenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

H h

5. Que

5. *Quæ curatio calculo evulso habenda sit.*

Calculo evulso, si valens corpus est, neque magnopere vexatum, finire oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur. Atque, ingredi quoque eum paululum, non alienum est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. Quod si per se non destitit, rursus, ne vis omnis intereat, supprimi debet. Idque protinus, in imbecillioribus, ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem, ut distentione nervorum periclitatur aliquis, dum vesica ejus agitur; sic alter metus excipit, remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat, ut occidat. Quod ne incidat, desidere is debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adjectum. sub quo & sanguis fere conquiescit, & adstringitur vesica, ideoque minus inflammatur. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, & in genibus, & coxis, & super pubem.

Ubi jam satis vel evocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxæ paululum excitentur: ac super vulnus imponendum est duplex aut triplex linteolum, aceto madens. Deinde, interpositis duabus horis, in folium is aquæ calidæ resupinus demittendus est sic, ut à genibus ad umbilicum aqua teneat, cætera vestimentis circumdata sint; manibus tantummodo pedibusque nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. Ex quo sudor multus oriri solet: qui spongia subinde in facie detergendus est.

est. Finisque ejus fomenti est, donec infirmando offendat. Tum multo is oleo perungendus, inducendusque hapsus lanæ 210,6. mollis, tepido oleo repletus, qui pubem, & 5 coxas, & inguina, & plagam ipsam, contactam eodem ante se linteolo, protegat: isque subinde oleo tepido madefaciendus est; ut neque frigus ad vesicam admittat, & nervos leniter molliat. Quidam cataplasmatibus 10 calefacientibus utuntur. Ea plus pondere nocent, atque vesicam urgendo vulnus irritant, quam calore proficiunt. Ergo ne vinculum quidem ullum necessarium est.

Proximo die, si spiritus difficiliter red- 15 ditur, si urina non exit, si locus circa pubem mature intumuit, scire licet, in vesica sanguinem concretum remansisse. Igitur, demissis eodem modo digitis, leniter pertractanda vesica est, & discutienda, si 20 qua coierunt: quo fit, ut per vulnus postea procedant. Non alienum etiam est, oriculario clystere acetum nitro mixtum per plagam in vesicam compellere. nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coi- 25 erunt. Eaque facere etiam primo die convenit, si timemus, ne quid intus sit: maximeque, ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit. Cætera eadem facienda sunt: ut demittatur in folium, ut eodem 30 modo panniculus, eodem lana superinji- ciatur.

Sed neque sæpe, neque tamdiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens est; infirmus, quam valens; levi, quam

graviore inflammatione adfectus; is, cujus corpus digeritur, quam is, cujus adstrictum est. Inter hæc vero, si somnus est, & æqualis spiritus, & madens lingua, & sitis modica, & venter imus sedet, & mediocris est cum febre modica dolor, scire licet, recte procedere curationem.

At in his inflammatio fere quinto vel septimo die finitur: qua levata, solum supervacuum est. supini tantummodo vulnus aqua calida fovendum est, ut, si quid urinæ rodit, abluatur. Imponenda autem medicamenta sunt pus moventia; &, si purgandum ulcus videbitur, melle liniendum. Id, si rodet, rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum videtur *ἐννεαφάρμακον* emplastrum. nam & sebum habet ad pus movendum, & mel ad ulcus repurgandum: medullam etiam, maximeque vitulinam; quæ in id, ne fistula relinquatur, præcipue proficit. Linamenta vero tum super ulcus non sunt necessaria; super medicamentum, ad id continendum, recte imponuntur. At, ubi ulcus purgatum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est.

Quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, varia circa pericula oriuntur. Quæ præsagire protinus licet, si continua vigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vulnus hiat, si transfiliens urina id non rodit, si similiter ante tertium diem quædam livida excidunt, si is aut nihil aut tarde respondet, si vehementes dolores

lores sunt, si post diem quintum magnæ febres urgent, & fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem jucundius est. Nihil tamen pejus est distentione nervorum, & ante nonum diem, vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinentia, modicis & tempestivis cibis; inter hæc, fomentis, & quibus supra scripsimus, oportet.

10 C A P X X V I I.

De Cancro, qui excisa vesica nascitur.

15 **P**ROXIMUS canceri metus est. Is cognoscitur, si, & per vulnus, & per ipsum colem, fluit sanies mali odoris, cumque ea quædam à concreto sanguine non abhorrentia, tenuesque carunculæ lanulis similes. præter hæc, si oræ vul-
 20 ris aridæ sunt, si dolent inguina, si febris non desinit, eaque in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est, in quam partem cancer is tendat. Si ad colem, indurefcit is locus, &
 25 rubet, & tactu dolorem excitat, testiculi-que intumescunt: si in ipsam vesicam, *ani dolor sequitur, coxæ tumescunt, non facile crura extendi possunt: at, si in alterutrum latus, oculis id expositum est, pares-
 30 que utrinque easdem notas, sed minores, habet.

Primum autem ad rem pertinet corpus recte jacere, ut superior pars semper ea sit, in quam vitium fertur. Ita, si ad colem it,

•Hh 3

supi-

* Tulpus Observat. Lib. IV. Cap. 38.

supinus is collocari debet: si ad vesicam, in ventrem: si in latus, in id, quod integrius est. Deinde, ubi ventum fuerit ad curationem, homo in aquam demittetur, in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, 5 aut myrtus; idemque humor clystere intus adigetur: tum superponetur lenticula cum malicorio mixta; quæ utraque ex vino decocta sint; vel rubus, aut oleæ folia, eodem modo decocta; aliave medicamenta, 100 quæ ad cohibendos purgandosque cancos proposuimus. ex quibus, si qua erunt arida, per scriptorium calamum inspirabuntur.

Ubi stare cœperit cancer, mulso ulcus 155 eluetur. vitabiturque eo tempore ceratum; quod, ad recipiendum id malum, corpus emollit. potius plumbum elotum cum vino inungetur: super quæ idem linteolo illitum imponetur. Sub quibus perveniri 200 ad sanitatem potest: cum eo tamen, quod non ignoremus, orto cancro sæpe affici stomachum, cui cum vesica quoddam consortium est: exque eo fieri, ut neque retineatur cibus, neque, si quis retentus est, 255 concoquatur, neque corpus alatur: ideoque ne vulnus quidem aut purgari, aut ali possit. quæ necessario mortem maturant.

Sed ut his succurri nullo modo potest, sic à primo tamen die tenenda ratio curationis est. In qua quædam observatio, ad cibum quoque potionemque pertinens, 300 necessaria est. Nam cibus inter principia, non nisi humidus dari debet: ubi ulcus purga-

purgatum est, ex media materia. olera & balsamenta semper aliena sunt. Potione opus est, non immodica. Nam, si parum bibitur, accenditur vulnus, & vigilia urget, & vis corporis minuitur: si plus æquo assumitur, subinde vesica impletur, eoque irritatur. Non nisi aquam autem bibendam esse, manifestius est, quam ut subinde dicendum sit.

10 Solet vero sub ejusmodi victu evenire, ut alvus non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua vel fœnum Græcum, vel malva decocta sit. Idem humor rosa mixtus in ipsum vulnus oriculario clystere agendus, ubi id rōdit urina, neque purgari patitur. Fere vero primo per vulnus exit hæc: deinde, eo sanescente, dividitur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur. Quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoque anno fit.

Neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer rupta
25 cervix est, aut ex cancro multæ magnæque carunculæ, simulque nervosa aliqua exciderunt. Sed, ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo, cum jam ad cicatricem vulnus tendit, extentis jacere feminibus & cruribus oportet; nisi tamen molles arenosive calculi fuerunt: sub his enim tardius vesica purgatur. Ideoque diutius plagam patere necessarium est: & tum

demum, ubi jam nihil tale extra fertur, ad cicatricem perducit.

Quod; si antequam vesica purgata est, oræ se glutinarunt, dolorque & inflammatio redierunt, vulnus digitis vel averso specillo diducendum est; ut torquentibus exitus detur. Hisque effusis, cum diutius pura urina descendit, tum demum, quæ cicatricem inducant, imponenda sunt, extendendique, ut supra docui, pedes, quam maxime juncti. 10

Quod si fistulæ metus ex his causis, quas proposui, subesse videbitur, quo facilius claudatur ea, vel certe coangustetur, in anum quoque danda plumbea fistula est; extentisque cruribus femina talique inter se deliganda sunt, donec, qualis futura est, cicatrix sit. 15

C A P. XXVIII.

Si Naturalia foeminarum non admittunt concubitum, quomodo curari conveniat. a 20

ET hoc quidem commune esse maribus & foeminis potest. Proprie vero quædam ad foeminas pertinent: ut in primis, quod earum naturalia nonnunquam, inter se glutinatis oris, concubitum non admittunt. Idque interdum evenit protinus in utero matris: interdum ^b exulceratione in his partibus facta, & per malam curationem his oris sanescendo junctis. Si ex utero est, membrana ori vulvæ opposita est: si ex ulcere, caro id replevit. 25 30

Opor-

a Æginet. vi, 72. Aëtius Tetrab. iv. Serm. iv, c. 96. Hipp. de Steril. XIII, i. Idem de Natur. Mulieb. VI. Joan. Wierus Observ. L. i. p. 935. b Hipp. I. de Morb. Mul. T. LXVIII.

Oportet autem membranam duabus lineis, inter se transversis, incidere ad similitudinem literæ c X, magna cura habita, ne urinæ iter violetur: deinde undique eam
 5 membranam excidere. At, si caro increvit, necessarium est recta linea patefacere: tum ab ora vel vulsella vel hamo apprehensam, tanquam habenulam, excidere: & intus implicitum in longitudinem linamentum (λημνίσκον Græci vocant) in aceto tinctum demittere, supraque succidam lanam aceto madentem deligare: tertio die solvere, & vulnus, sicut alia vulnera, curare. Cumque jam ad sanitatem tendet, plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamque intus dare: supraque idem medicamentum injicere, donec ad cicatricem plaga perveniat.

C A P. XXIX.

Qua ratione partus emortuus ex utero excutiat. a

Ubi concepit autem aliqua, si jam prope maturus partus intus emortuus est, neque excidere per se potest, adhibenda curatio est. Quæ numerari inter difficillimas potest. nam & summam prudentiam moderationemque desiderat, & maximum periculum affert. Sed ante omnia vul-
 25 væ natura mirabilis, cum in multis aliis, tum in hac re quoque facile cognoscitur.

Oportet autem ante omnia b resupinam mulierem transverso lecto sic collocare, ut

H h 5

femi-

c Chiasmus vocatur ab Æginet. VI, 51, 65. & ab aliis. H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. I. c. 83.
 a Æginet. VI, 74. Aëtius Tetrab. IV. Serm. IV, c. 23.
 b Hippocr. I. de Morb. Mul. T. XCIV. 4.

feminibus ejus ipsius ilia comprimantur. quo fit, ut & imus venter in conspectu medici sit, & infans ad os vulvæ compellatur; quæ, emortuo partu, id comprimit: ex intervallo vero paululum debiscit. Hac occasione usus medicus, unctæ manus indicem digitum primum debet inferere, atque ibi continere, donec iterum os adaperiatur, rursusque alterum digitum demittere debebit, & per easdem occasiones alios, donec tota esse intus manus possit. Ad cujus rei facilitatem multum confert & magnitudo vulvæ, & vis nervorum ejus, & corporis totius habitus, & mentis etiam robur: cum præsertim intus nonnunquam etiam duæ manus dari debeant.

Pertinet etiam ad rem, quam calidissimum esse imum ventrem, & extrema corporis; nequedum inflammationem c accepisse, sed recenti re protinus adhiberi medicinam. Nam, si corpus jam intumuit, neque demitti manus, neque educi infans, nisi ægerrime potest; sequiturque sæpe cum vomitu, & cum tremore, mortifera nervorum distentio. Verum intus emortuo corpori manus injecta protinus habitum ejus sentit. nam aut in caput, aut in pedes conversum est, aut in transversum jacet: fere tamen sic, ut vel manus ejus, vel pes in propinquo sit.

Medici vero propositum est, ut infantem manu dirigat vel in d caput e, vel etiam in pedes, si forte aliter compositus est. Ac, si nihil aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus rectius

c Alii cepisse. d Alii manus. e Hipocr. I, de Morb. Mul. XCV, 2.

rectius reddit. nam manus in caput, pes in pedes eum convertet. Tum, si caput proximum est, demitti debet uncus, undique lævis, acuminis brevis, qui vel oculo, vel auri, vel ori, interdum etiam fronti recte injicitur: deinde attractus infantem educit. Neque tamen quolibet is tempore extrahi debet. nam, si compresso vulvæ ore id tentatum est, non emittente eo, infans abumpitur, & unci acumen in ipsum os vulvæ delabitur, sequiturque nervorum distentio, & ingens periculum mortis. Igitur, compressa vulva, conquiescere; hiante, leniter trahere oportet; & per has occasiones paulatim eum educere. Trahere autem dextra manus uncum; sinistra, intus posita, infantem ipsum, simulque dirigere eum debet.

Solet etiam evenire, ut is infans f humore distendatur; exque eo profluat foedi odoris sanies. Quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut, effuso humore extenuetur: tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. nam uncus injectus putri corpusculo facile elabitur. in quo quid periculi sit, supra positum.

Sed in pedes quoque conversus infans non difficulter extrahitur. namque his apprehensus per ipsas manus commode educitur.

Si vero transversus est, neque dirigi potuit, uncus alæ injiciendus, paulatimque attrahendus est. Sub quo fere cervix replicatur, retroque caput ad reliquum corpus spectat.

spectat. Remedio est, cervix præcisa; ut separatim utraque pars auferatur. Id unco fit, qui, priori similis, in interiore tantum parte per totam aciem exacuitur. Tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur: quia fere, majore parte extracta, caput in vacuam vulvam prolabitur, extrahique sine summo periculo non potest.

Si tamen id incidit, super ventrem mulieres duplici panniculo injecto, valens homo, non imperitus, à sinistro latere ejus debet assistere, & super imum ventrem ejus duas manus imponere, alteraque alteram premere. quo fit, ut illud caput ad os vulvæ compellatur, idque tum eadem ratione, quæ supra posita est, unco extrahi possit.

At, si pes alter juxta repertus est, alter retro cum corpore est, quicquid prolapsum est, paulatim abscindendum est. Et, si clunes os vulvæ urgere cœperunt, iterum retro repellendæ sunt, conquisitusque pes ejus adducendus. Aliæque etiamnum difficultates faciunt, ut, qui solidus non exit, concisus eximi debeat.

Quoties autem infans protractus est, tradendus ministro est. Is eum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet ita, ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas Secundas vocant, quod velamentum infantis intus fuit: hisque ultimis apprehensis, venulas membranulasque omnes eadem ratione manu diducere à vulva, totumque illud extrahere, & si quid intus

intus præterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in unum feminibus, illa in conclavi collocanda est, modicum calorem, sine ullo perflatu, habente. Super
 5 imum ventrem ejus imponenda lana succida, in aceto & rosa tineta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his vulneribus, quæ in nervosis locis sunt, adhibetur.

10 C A P. X X X.

De Ani vitiis.

414.

ANI quoque vitia, ubi medicamentis non vincuntur, manus auxilium de-
 15 siderant. Ergo, si qua fissa in eo ve-
 399, 23. tustate induruerunt, jamque callum ha-
 bent, commodissimum est, ducere alvum;
 tum spongiam calidam admove, ut relaxentur illa, & foras prodeant: ubi in con-
 20 spectu sunt, scalpello singula excidere, & ulcera a renovare; deinde imponere linamentum molle, & super linteolum illitum melle; locumque cum molli lana implere, & ita vincire: altero die, deincepsque cæte-
 25 ris, lenibus medicamentis uti; quæ ad recentia eadem vitia necessaria esse, alias proposui: utique per primos dies forbitionibus eum sustinere, paulatim deinde cibis adjicere aliquid, generis tamen ejus, quod eodem loco præceptum est. Si quando autem
 30 ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit, incidendum est; ne anus ipse suppuret. Neque tamen ante properandum est. nam, si crudum incisum est,

11.

494 A. CORN. CELSI Lib. 7.
inflammationi multum accedit, & puris a-
liquanto amplius concitatur. His quoque
vulneribus, lenibus cibis, iisdemque medi-
camentis opus est.

2. De Condylomatibus. b

5

400,
84.
403,
11.

At tubercula, quæ *κονδυλώματα* appel-
lantur, ubi induruerunt, hac ratione cu-
rantur. Alvus ante omnia ducitur. Tum
vulsella tuberculum apprehensum, juxta
radices exciditur. Quod ubi factum est, ea-
dem sequuntur, quæ supra post curationem
adhibenda esse proposui: tantummodo, si
quid increfcit, squama æris coercendum
est.

10

3. De Hamorrhoidibus. c

15

401,
22.

Ora etiam venarum, fundentia sangui-
nem, sic tolluntur. Ubi sanguini, qui effluit,
sanies adjicitur, alvus acribus ducitur; quo
magis ora promoveantur. eoque fit, ut d o-
mnia vasa, quasi capitula conspicua sint. 20
Tum, si capitulum exiguum est, basimque te-
nuem habet, adstringendum lino paulum su-
pra est, quam ubi cum ano committitur, im-
ponendaque spongia ex aqua calida est, do-
nec id liveat: deinde aut ungue, aut scalpel-
lo, supra nodum id exulcerandum est. Quod 25
nisi factum est, magni dolore subsequun-
tur: interdum etiam urinæ difficultas. Si id
majus est, & basis latior, hamulo uno aut
altero excipiendum est, paululumque supra 30
basim incidendum: neque relinquendum
quicquam ex eo capitulo, neque quicquam
ex ano demendum est. quod consequitur
is, qui neque nimium, neque parum hamos
ducit.

b Æginet. VI, 80. c Æginet. VI, 79. d Alii, Rons-
seus omnes vene.

ducit. Qua incisum est, acus debet immitti, infraque eam lino id capitulum alligari. Si duo triave sunt, intimum quodque primum curandum est: si plura, non omnia simul; ne tempore eodem undique teneræ cicatrices sint. Si sanguis profluit, excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum, ungenda femina, & inguina, & quicquid juxta ulcus est, ceratumque superdandum, & farina hordeacea calida implendus is locus, & sic deligandus est. Postero die is desidere in aqua calida debet, eodemque cataplasmate foveri. Ac bis die, & ante curationem, & post eam, coxendices ac femina liquido cerato perungenda sunt; tepidoque is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda, &, si capitula simul non exciderunt, digito promovenda: tum lenibus medicamentis, iisdemque, quæ alibi posui, ulcera ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, jam alias superius exposui.

C A P. XXXI.

De Varicibus. a

AB his ad crura proximus transitus est. In quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem & earum venularum, quæ in capite nocent; & eorum varicum, qui in ventre sunt, curationem distuli: quoniam ubique eadem est. Igitur vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur.

Si

Si recta; si quamvis transversa; tamen simplex; si modica est, melius aduritur. Si curva est, & velut in orbes quosdam implicatur, pluresve inter se involvuntur, utilius excidere est.

Adurendi ratio hæc est. Cutis superinciditur: tum, patefacta vena, tenui & retuso ferramento candente modice premitur; vitaturque, ne plagæ ipsius oræ adurantur: quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit: & tum superponitur medicamentum, quo adusta sanantur.

At exciditur hoc modo. Cute eadem ratione super venam incisâ, hamulo oræ excipiuntur; scalpelloque undique à corpore vena diducitur; caveturque, ne inter hæc ipsa lædatur; eique retusus hamulus subjicitur; interpositoque eodem fere spacio, quod supra positum est, in eadem vena idem fit: quæ, quo tendat, facile hamulo extento cognoscitur.

Ubi jam idem, quacunque varices sunt, factum est, uno loco adducta per hamulum vena præciditur: deinde, qua proximus hamus est, attrahitur & evellitur; ibique rursus abscinditur. Ac sic undique varicibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur, & super emplastrum glutinans injicitur.

CAP. XXXII.

De Digitis coherentibus, & curvatis.

5 **A**T, si digiti vel in utero protinus, vel propter communem exulcerationem postea cohæserunt, scalpello diducuntur: dein separatim uterque non pingui emplastro circumdatur: atque ita per se u-
10 terque sanescit.

Si vero fuit ulcus in digito, posteaque male inducta cicatrix curvum eum reddidit; primum malagma tentandum est: dein, si id nihil prodest (quod & in veteri
15 cicatrice, &, ubi nervi læsi sunt, evenire consuevit) videre oportet, nervine id vitium, an cutis sit. Si nervi est, attingi non debet: neque enim sanabile est. Si cutis, tota cicatrix excidenda est, quæ fere callo-
20 sa efficit, ut extendi digitus non possit. Tum rectus sic ad novam cicatricem perducendus est.

CAP. XXXIII.

25 *De Gangræna.*

GANGRÆNAM inter ungues alasque, aut inguina nasci; &, siquando medicamenta vincuntur, membrum præ-
cidi oportere, alio loco mihi dictum est. 304;
20 Sed id quoque cum periculo summo fit. 23.
nam sæpe in ipso opere, vel profusione sanguinis vel animæ defectione moriuntur. Verum hic quoque nihil interest, an satis tutum præsidium sit, quod unicum est.
I i Igitur

Igitur inter sanam vitiatamque partem incidenda scalpello caro usque ad os est sic, ut neque contra ipsum articulum id fiat, & potius ex sana parte aliquid excidatur, quam ex ægra relinquatur. Ubi ad os ventum est, reducenda ab eo sana caro, & circa os subsecanda est, ut ea quoque parte aliquid ossis nudetur: deina id ferrula præcidendum est, quam proxime sanæ carni etiam inhærenti: ac tum frons ossis, quam ferrula exasperavit, lævanda est, supraque inducenda cutis. quæ sub ejusmodi curatione laxa esse debet, ut quam maxime undique os contegat. Quo cutis inducta non fuerit, id linamentis erit contegendum, & super id spongia ex aceto deliganda. Cætera postea sic facienda, ut in vulneribus, in quibus pus non moveri debet, præceptum est.

LIBER OCTAVUS.

C A P. I.

De positu & figura Ossium totius humani corporis.

SUPEREST ea pars, quæ ad ossa pertinet. Quæ quo facilius accipi possit, prius positus figuraeque eorum indicabo. Igitur calvaria incipit ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque lævis, &, qua cerebri * membranam contegit, &, qua cute, capillum gignente, conte-

* Græci *μνίστρας*, Macrob. Saturn. L. 7. *Omentum* vocant.

tegatur. Eaque simplex, ab occipitio & temporibus; duplex, usque in verticem à fronte, est. Ossaque ejus, ab exterioribus, dura; ab interioribus; quibus inter se connectuntur, 5 molliora sunt. Interque ea venæ discurrent, quas his alimentum subministrare, credibile est.

Raro autem calvaria solida, sine *sutura est: locis tamen æstuosis facilius invenitur. & id caput firmissimum, atque à dolore 10 tutissimum est: ex cæteris, quo futuræ pauciores sunt, eo capitis valetudo commodior est. neque † enim certus earum numerus est, sicut nec locus quidem. Fere tamen duæ, super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt: tertia, ad latera per verticem tendens, occipitium à summo capite diducit: quarta, ab eodem vertice per medium caput ad frontem procedit; eaque modo sub imo capillo desinit, 20 modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his cæteræ quidem futuræ in unguem committuntur: hæ vero, quæ super aures transversæ sunt, totis oris paulatim extenuantur; atque ita inferiora ossa 25 superioribus leniter ‡ insidunt. Crassissimum vero in capite os post aurem est; qua capillus, ut verisimile est, ob idipsum non gignitur. Super hos quoque musculos, qui tempora § contegunt, os medium, in exterioriorem partem inclinatum, positum est. At 30 facies futuram habet maximam. quæ à tempore incipiens, per medios oculos, naresque transversa pervenit ad alterum tem-

Ii 2

pus.

* Nonnumquam tamen observatur, uti variis exemplis probat Vertunianus ad Hippocr. de Vulneribus Capitis, pag. 45. † etiam leg. Pauw, pag. 6. ‡ assidens leg. Pauw, p. 12. § connectunt, Pauw, p. 12.

pus. A qua breves duæ sub interioribus
angulis deorsum spectant. Et malæ quo-
que in summa parte singulas transversas
futuras habent. A mediisque naribus, aut
superiorum dentium gingivis, per medium
palatum una procedit; aliaque transversa
idem palatum secat. Et futuræ quidem in
plurimis hæ sunt.

Foramina autem, intra caput, maxima
oculorum sunt; deinde narium; tum quæ
in auribus habemus. Ex his, quæ oculo-
rum sunt, recta simpliciaque ad cerebrum
tendunt. Narium duo foramina osse me-
dio discernuntur. siquidem hæc primum
à superciliis, angulisque oculorum, osse in-
choantur ad tertiam fere partem: deinde
in cartilaginem versa, quo propius ori
descendunt, eo magis caruncula quoque
molliuntur. Sed ea foramina, quæ à sum-
mis ad intimas nares simplicia sunt, ibi
rursus in bina itinera dividuntur: aliaque
ex his, ad fauces pervia, spiritum & red-
dunt & accipiunt; alia ad cerebrum ten-
dunt. In ultima parte in multa & tenuia
foramina dissipantur, per quæ sensus odo-
ris nobis datur. In aure quoque primo re-
ctum & simplex iter procedendo flexuo-
sum fit. Quod juxta cerebrum in multa
& tenuia foramina diducitur, per quæ fa-
cultas audiendi est. Juxta ea duo parvuli
quasi sinus sunt; superque eos finitur os,
quod transversum à genis tendens, ab in-
ferioribus ossibus sustinetur. Jugale appel-
lari potest ab eadem similitudine, à qua id

Græci *ζυγῶδες* appellant. Maxilla vero est molle os, eoque una est. Cujus eadem & media, & etiam ima pars, mentum est: à quo utrinque procedit ad tempora; sola-
 5 que ea movetur. Nam malæ cum toto osse, quod superiores dentes excipit, immobiles sunt. Verum ipsius maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt. Alter processus, intra latior, vertice ipso tenuatur,
 10 longiusque procedens sub osse jugali subit, & super id temporum musculis illigatur. Alter brevior & rotundior, & in eo sinu, qui juxta foramina auris est, cardinis modo fit; ibique huc & illuc se inclinans maxillæ
 15 * facultatem motus præstat.

Duriores osse dentes sunt: quorum pars maxillæ, pars superiori ossi malarum hæret. Ex his quaterni primi, quia secant, *τομικοί* à Græcis nominantur. Hi deinde
 20 quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrinque fere 1 maxillares 2 quini sunt, præterquam in iis, in quibus 3 genuini, qui fero gigni solent, 4 non increverunt. Ex his primores singulis ra-
 25 dicibus; maxillares utique binis; quidam etiam ternis, quaternisve nituntur. Fereque longior radix brevior dentem edit; rectique dentis recta etiam radix, curvæ flexa est. Ex ea radice in pueris novus
 30 dens subit, qui multo sæpius priorem expellit: interdum tamen supra infrave eum se ostendit.

Caput autem spina exipit. Ea constat ex vertebra quatuor & viginti. Septem in

Ii 3

cer-

* Facilitatem alii, sed malè, Pauw pag. 23. 1. militares i. e. molares vocat Soranus Ephesius, Isag. C. 17.
 2. quaterni. 3. ultimi. 4. jam, Pauw, pag. 26.

cervice sunt, duodecim ad costas, reliquæ
 quinque sunt proximæ costis. Hæ teretes
 brevæque, ab utroque latere, processus
 duos 1. exigunt: mediæ perforatæ, qua spinæ
 medulla cerebro commissa descendit: 2 late- 5
 ra quoque inter duos processus tenuibus
 cavis pervia, per quæ à membrana cerebri
 similes membranulæ deducuntur. Omnes-
 que vertebræ (exceptis tribus summis) à
 superiore parte in ipsis processibus parum 100
 desidentes sinus habent: ab inferiore alios
 deorsum versus processus exigunt. Summa
 igitur protinus caput sustinet, per duos si-
 nus receptis exiguis ejus processibus. Quo
 fit, ut caput deorsum 3 parvis tuberibus ex- 155
 asperetur. Secunda 4 superioris parti 5 inferiori
 inferitur. Quod ad circuitum pertinet,
 pars summa angustiore orbe finitur. itaque
 superior secundæ circumdata in latera
 quoque caput moveri finit. Tertia eodem 200
 modo secundam excipit. Ex quo facilis
 cervici mobilitas est. Ac, ne sustinere qui-
 dem caput possêt, nisi utrinque recti va-
 lentesque nervi collum continerent, quos
καρπῶτες Græci appellant. siquidem ho- 255
 rum inter omnes flexus alter semper in-
 tentus ultra prolabi superiora non patitur.
 Jamque vertebra tertia tubercula, quæ in-
 feriori inferantur, excipit. Cæteræ pro-
 cessibus deorsum spectantibus in inferiori- 300
 res insinuantur, ac per sinus, quos utrin-
 que habent, superiores accipiunt, multif-
 que nervis & multa cartilagine continen-
 tur. Ac sic, uno flexu modico in primum
 dato,

1. *exserunt* legit Pauw, p. 32. 2. *ea* leg. Pauw,
 p. 32. i. e. spinæ medulla. 3. *versus*, Pauw, p. 64.
 4. *Superiori*, 5. *inferioris*, Pauw, p. 64.

dato, cæteris negociis homo & rectus insitit, & alioqui ad necessaria opera curvatur.

Infra cervicem vero summa costa contra humeros sita est. Inde septem inferiores usque ad imum pectus perveniunt: hæque, primis partibus rotundæ & leniter quasi capitulatae, vertebrarum transversis processibus, ibi quoque paululum sinuatis, inhærent: inde lateſcunt, & in exteriorem partem recurvatae paulatim in cartilaginem degenerant; eaque parte rursus in interiora leniter flexæ committuntur cum osse pectoris. Quod valens ac durum à faucibus incipit, ab utroque latere lunatum, & à præcordiis, jam ipsum quoque cartilagine mollium, terminatur. Sub costis vero superioribus quinque (quas *νόθας* Græci nominant) breves tenuioresque, atque ipsæ quoque paulatim in cartilaginem versæ, extremis abdominis partibus inhærescunt; imaque ex his, majore jam parte nihil, nisi cartilago est.

Rursus, à cervice duo lata ossa utrinque ad scapulas tendunt: nostri scutula operta; *ὤμοπλάτας* Græci nominant. Ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula, paulatimque lateſcentia ad spinam tendunt; & quo latiora quaque parte sunt, hoc hebetiora. Atque ipsa quoque, in imo cartilaginosa, posteriore parte velut innatant; quoniam, nisi in summo, nulli ossi inhærescunt. Ibi vero validis musculis nervisque constrieta sunt.

At à summa costa paulo interius, quam

quam ubi ea media est, os excrescit, ibi quidem tenue, procedens vero, quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius latiusque est, paululum in interiora curvatum. quod protinus altera verticis parte modice intumescens, sustinet jugulum. Id ipsum recurvum ac inter durissima ossa numerandum, altero capite in eo, quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit, paululumque motu brachii movetur, & cum lato osse scapularum, infra caput ejus, nervis & cartilagine connectitur. 15

Hinc humerus incipit, extremis utrinque capitibus tumidus, mollis, sine medulla; cartilaginofus: medius teres, durus, medullifus: leniter cavus, in priorem & anteriorem; gibbus, in posteriorem & posteriorem partem. Prior autem pars est, quæ à pectore est: posterior, quæ ab scapulis: interior, quæ ad latus tendit: exterior, quæ ab eo recedit. 20 quod ad omnes articulos pertinere, in ulterioribus patebit. Superius autem humeri caput rotundius, quam cætera ossa, de quibus adhuc dixi, verticillati scapularum ossi inseritur, ac majore parte extra id situm 25 nervis deligatur. At inferius duos processus habet: inter quos, quod medium est, magis etiam extremis partibus sinuatur.

Quæ res sedem brachio præstat. quod constat ex ossibus duobus. Radius, quem 30 *ῥαδις* Græci appellant, superior breviorque, & primo tenuior, rotundo & leniter cavo capite exiguum humeri tuberculum recipit. quod ibi nervis & cartilagine continetur.

5 tinetur. Cubitus inferior longiorque, & primo plenior, in summo capite duobus quasi verticibus extantibus in sinum humeri, quem inter duos processus ejus esse
10 proposui, se inserit. Primo vero duo, radii & brachii, ossa juncta paulatim dirimuntur, rursusque ad manum coeunt, modo crassitudinis mutato. Siquidem ibi radius plenior, cubitus admodum tenuis est. Dein ra-
15 dius, in caput cartilaginosum confurgens, in cervicem ejus insinuatur. Cubitus rotundus in extremo, parte altera paululum procedit. Ac, ne sæpius dicendum sit, illud ignorari non oportet, plurima ossa in cartilaginem desinere, nullum articulum non sic finire. Neque enim aut moveri posset, nisi lævi inniteretur; aut cum carne nervisque conjungi, nisi ea media quædam materia committeret.

20 In manu vero prima palmæ pars ex multis minutisque ossibus constat, quorum numerus incertus est. Sed oblonga omnia, & triangula, structura quadam inter se connectuntur, cum invicem superior alterius
25 planities sit: eoque fit ex his unius ossis paululum in interiora concavi species. Verum ex manu duo exigui processus in sinum radii conjiciuntur. Tum ex altera parte quinque ossa recta, ad digitos tendentia,
30 palmam explent. A quibus ipsi digiti oriuntur: qui ex ossibus ternis constant. omniumque eadem ratio est. Interius os in vertice sinuatur, recipitque exterioris exiguum tuberculum, nervique ea continent. A quibus
Ii5 bus

bus orti ungues indurescunt. Ideoque non ossi sed carni magis radicibus suis inhærent. At superiores quidem partes sic ordinatæ sunt.

Ima vero spina in coxarum osse desinit; quod transversum longeque valentissimum, vulvam, vesicam, rectum intestinum tuetur. Idque ab exteriori parte gibbum; ad spinam, resupinatum; à lateribus, id est, in ipsis coxis, sinus rotundos habet. A quibus oritur os, quod pectinem vocant; idque, super intestina sub pube transversum, ventrem firmat: rectius in viris, recurvatum magis in exteriora in foeminis, ne partum prohibeat.

Inde femina oriuntur. Quorum capita rotundiora etiam, quam humerorum sunt; cum illa ex cæteris rotundissima sint. Infra vero duos processus à priore & à posteriore parte habent. Dein dura, & medullosa, & ab exteriori parte gibba, rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt: superiora in sinus coxæ, sicut humeri in ea ossa, quæ scalpularum sunt, conjiciuntur; tum infra introrsus leviter tendunt, quo æqualius superiora membra sustineant. Atque in eo inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint. Quæ commissura osse parvo, molli, cartilaginoso tegitur. patellam vocant. Hæc super innatans, nec ulli ossi inhærens, sed carne & nervis deligata, pauloque magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus juncturam tuetur.

Ipsum autem crus est ex ossibus duobus.

Etenim

Etenim per omnia femur humero, crus vero brachio simile est: adeo ut habitus quoque & decor alterius ex altero cognoscatur. quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. Verum alterum os ab exteriori parte suræ positum est: quod ipsum quoque sura recte nominatur. Id brevius, supraque tenuius, ad ipsos talos intumescit. Alterum à priore parte positum, cui tibiæ nomen est, longius & in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur; sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa, infra supraque conjuncta, media, ut in brachio, dehiscunt.

Excipitur autem crus infra ossē ex transverso talorum; idque ipsum super os calcis situm est. quod quadam parte sinuatur, quadam excessus habet, & procedentia ex talo recipit, ut in sinum ejus inferitur. Idque sine medulla durum, magisque in posteriorem partem projectum, teretem ibi figuram representat. Cætera ossa pedis ad eorum, quæ in manu sunt, similitudinem instructa sunt. Plantæ palmis, digiti digitis, ungues unguibus respondent.

CAP. II.

Ossa vitiata & corrupta quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur.

OMNE autem os, ubi injuria accessit, aut vitiatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut de loco movetur. Id, quod vitiatum est, pri-

primo fere pingue fit, deinde vel^a nigrum, vel cariosum. quæ, supernatis gravibus ulceribus aut fistulis, hisque vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis, eveniunt. Oportet autem ante omnia os nudare, ulcere exciso, &, si latius est ejus vitium, quam ulcus fuit, carnem subsecare, donec undique os integrum patefiat: tum id, quod pingue est, semel iterumve satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo squama secedat; aut radere, donec jam aliquid cruoris ostendatur, quæ integri ossis nota est. nam necesse est aridum sit id, quod vitiatum est. Idem in cartilagine quoque læsa faciendum est. siquidem ea quoque scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquitur. Deinde, siue os siue cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. Neque alia facienda sunt, ubi caries, nigritiesve in summo osse est. siquidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum, vel radendum est. qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, ut & agat aliquid, & maturius desinat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad solidum ventum est. Albo finiri ex nigritie vitium, soliditate quadam ex carie, manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum est. Si quando autem altius descenderit utrumlibet, dubium est.

In carie quidem expedita cognitio est, si specillum tenue in foramina demittitur; quod magis minusve intrando, vel in summo cariem esse, vel altius descendisse, testatur.

Colligi

Colligi idem potest etiam ex dolore, & ex febre, quæ ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest. Manifestior tamen adaëta terebra fit. nam finis vitii est, ubi scobis nigra esse desiit. Igitur, si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est, quæ altitudine vitium æquent: tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec siccum os ex toto fiat. simul enim & post hæc solvetur ab inferiore osse, quodcumque vitiatum est; & is sinus carne replebitur; & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris.

15 Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Idem quoque in carie, ad alteram partem ossis penetrante, fieri potest. Sed quod totum vitiatum, totum eximendum
20 est. Si inferior pars integra est, eatenus, quod corruptum est, excidi debet. Item siue capitis, siue pectoris os, siue costa cariiosa est, inutilis ustio, sed excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt, qui osse
25 nudato, diem tertium expectant, ut tunc excidant. ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque, quantum fieri potest, eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum, & omni vitio liberandum est. Longeque perniciosissimum
30 est, quod in osse pectoris est: quia vix, etiamsi recte cessit curatio, veram sanitatem reddit.

CAP. III.

Quomodo os excidatur; & de Modiolo, & Terebra, ferramentis ad id paratis.

EXCIDITUR vero os duobus modis. Si parvulum est, quod læsum est, * modiolus, quem *κοινίσιον* Græci vocant: si spatiosius, terebris. Utriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concavum, teres, est, imis oris ferratum: per quod medium clavus, ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarum autem duogenera sunt: alterum simile ei, quo fabri utuntur: alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit; atque iterum ab alio principio paulominus quam æqualiter sursum procedit.

Si vitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. At, si caries subest, medius clavus in foramen demittitur. Si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus sit, qui clavum recipiat, ut, eo insistente, circumactus modiolus delabi non possit: deinde his habena quasi terebra, convertitur. Estque† quidam premendi modus, ut & foretur, & circumagatur: quia, si leviter imprimitur, parum proficit; si graviter, non movetur. Neque alienum est, instillare paululum rosæ, vel lactis, quo magis lubrico circumagatur. quod ipsum tamen, si copiosius est, aciem ferramenti hebetat. At, ubi jam iter modiolo impressum est, medius clavus educitur, & ille per

* Vide Francisc. Vertunian. Comment. in Hipocr. Lib. de cap. vulner. p. 89. 90. H. F. ab Aquapend Oper. Chirurg. P. I. c. 2. † Quid in premendi modo, Pauw. p. 85.

per se agitur. deinde, cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remove-
tur.

* At, si latius vitium est, quam ut illo com-
prehendatur, terebra res agenda est. Ea fo-
ramen fit in ipso fine vitiosi ossis atque in-
tegri: deinde alterum non ita longe, ter-
tiumque, donec tactus is locus, qui exci-
dendus est, his cavis cinctus sit. atque ibi
quoque, quatenus terebra agenda sit, sco-
bis significat. Tum excisorius scalper ab al-
tero foramine ad alterum malleolo adactus
id, quod inter utrumque medium est, ex-
cidit; ac si ambitus similis ei sit, qui in an-
gustiore orbem modiolo imprimitur. U-
tro modo vero id circumductum est, idem
excisorius scalper, & in ossè corrupto pla-
nus, summam quamque testam a lævet, donec
integrum os relinquatur.

Vix unquam nigrities integrum, caries
per totum os perrumpit, maximeque ubi
vitiata calvaria est. Id quoque vitii specillo
significatur. quod depressum in id fora-
men, quod infra solidam sedem habet, &
renitens aliquid invenit, & madens exit. Si
pervium invenit, altius descendens inter os
& membranam, nihil oppositum invenit,
educiturque siccum: non quo non sublit
aliqua vitiosa sanies; sed quoniam ibi, ut
in latiore sede, diffusa sit.

Sive autem nigrities, quam terebra dete-
xit, sive caries, quam specillum ostendit, os
transit, modioli quidem usus fere superva-
cuus est; quia latius pateat necesse est, quod
tam

* Leg. *Ac sic*, Pauw, p. 87. & *Al. lavigat, leviget*,
Pauw. p. 87.

283,
28.

tam alte processit. Terebra vero ea, quam secundo loco posui, utendum; eaque, ne nimis incalescat, subinde in aquam frigidam demittenda est. Sed tum majore cura agendum est; cum jam aut simplex os dimidium perforatum est; aut in duplici superius. illud spatium ipsum; hoc sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habena, suspendendaque magis sinistra manus est, & sæpius attollenda, & foraminis altitudo consideranda, ut, quodocunque os perumpitur, * sentiamus, neque periclitemur, ne mucrone cerebri membrana lædatur: ex quo graves inflammationes, cum periculo mortis b oriuntur.

519,
16.

Factis foraminibus, eodem modo media septa, sed multo circumspectius, excidenda sunt; ne forte angulus scalpri eandem membranam violet; donec fiat aditus, per quem membranæ custos immittatur. *μηνιγγοφύλακα* Græci vocant. lamina autem ænea est, firma, paululum resima, ab exteriori parte lævis. Quæ demissa sic, ut exterior pars ejus cerebro propior sit, subinde ei subjicitur, quod scalpri discutiendum est: ac, si excipit ejus angulum, ultra transire non patitur: eoque & audacius, & tutius, scalprium malleolo subinde medicus ferit, donec excisum undique os, eadem lamina levetur, tollique sine ulla noxa cerebri possit. Ubi totum os ejectum est, circumradendæ lævandæque sunt oræ, & si quid scobis membranæ insedit, colligendum. Ubi, superiori parte sublata, inferior relicta est, non

* *Periclitemur*, hoc est probemus, Vertunian. p. 92.
b Aph. VI, 18.

non oræ tantum, sed os quoque totum lævandum est; ut sine noxa postea cutis incre-scat, quæ aspero ossi innascens protinus non sanitatem, sed novos dolores movet.

5 Patefacto cerebro, qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa pervenero. Si basis aliqua servata est, superimponenda sunt medicamenta non pingua, quæ re-centibus vulneribus accommodantur; su-
10 praque imponenda lana succida, oleo at-que aceto madens. Ubi tempus processit, ab ipso ossè caro increfcit, eaque factum manu finum complet. Si quod etiam os adustum est, à parte sana recedit; subitque inter in-
15 tegram atque emortuam partem caruncu-la, quæ, quod abscessit, expellat. eaque fe-re, quia testa tenuis & angusta est, *λεπίς*, id est squama, à Græcis nominatur.

Potest etiam evenire, ut ex ictu neque fin-
20 datur os, neque perfringatur; sed summum tantum collidatur, exaspereturque. Quod ubi incidit, radi & lævari satis est. Hæc quamvis maxime fiunt in capite, tamen cæ-teris quoque ossibus communia sunt: ut,
25 ubicunque idem incidet, eodem remedio sit utendum. At, cum ea fracta, fissa, forata, collisa sunt, quasdam proprias in singu-lis generibus, quasdam communes in pluri-bus curationes requirunt. De quibus proti-
30 nus dicam, initio ab eadem calvaria accepto.

De Calvaria fracta. 2

IGITUR, ubi calvaria ^b percussa, protinus
 requirendum est, * num bilem is homo 5
 vomuerit; num † oculi ejus obcæcati sint;
 num obmutuerit; num per nares auresve san-
 guis ei effluxerit; num conciderit; num sine
 sensu quasi dormiens jacuerit. Hæc enim non
 nisi osse fracto eveniunt. Atque, ubi incide- 10
 runt, scire licet, necessariam, sed difficilem
 curationem esse. Si vero etiam torpor ‡ acces-
 sit; si mens non constat, si nervorum vel re-
 solutio vel distentio secuta est; verisimile est,
 etiam cerebri membranam esse violatam: eo- 15
 que in angusto magis spes est. At, si nihil
 horum secutum est, & jam potest dubitari,
 an os fractum sit; & protinus considerandum
 est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo
 percussum sit, & hoc ipso lævi an aspero, 20
 mediocri an vastiore, vehementer an leviter.
 quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei
 restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius
 est, quam certiore id nota explorare. Ergo,
 qua plaga est, demitti specillum oportet, ne- 25
 que nimis tenue, neque acutum; ne, cum in
 quosdam naturales sinus inciderit, opinionem
 fracti ossis frustra faciat: neque nimis plenum;
 ne parvulæ rimulæ fallant. Ubi specillum ad
 os venit, si nihil nisi læve & lubricum occur- 30
 rit, integrum id videri potest: si quid asperi
 est, utique qua futuræ non sint, fractum os
 esse testatur. A fu-

a Æginet. VI, 90. b Omnes edit. *pertusa*. * Plura quæ
 Recentiores adjiciunt, signa enumerat Vertunianus in
 Comment. ad Hippocr. Lib. de Cap. vulnerib. p. 68, 69.
 † Malè, potius, *si oculi obtenebrarint*, ex Hippocrate.
 Vertunian. ibid. p. 68. ‡ Græcis *νόσος*. Idem pag. 71.

A futuris se deceptum esse, c Hippocrates memoriae tradidit, more scilicet magnorum virorum, & fiduciam magnarum rerum habentium. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, multaque nihilominus habituro, convenit etiam simplex veri erroris confessio; præcipueque in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur; ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis ante deceptus est. Sed hæc quidem alioquin memoria magni professoris, uti interponeremus, effecit.

Potest autem futura eo nomine fallere, quia æque aspera est; ut aliquis hanc esse, etiam si rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc verisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet: sed os deoperire tutissimum est. Nam neque utique certa sedes, ut supra posui, suturarum est: & potest idem & naturaliter commissum & ictu fissum esse, juxta-ve aliquid fissum habere. Quin aliquando etiam, ubi ictus fuit vehementior, quamvis specillo nihil invenitur, tamen aperire commodius est. At, si ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os atramentum scriptorium est, deinde scalpro id deradendum, nigritiem enim continet, si quid fissum est.

* Solet etiam evenire, ut altera parte fuerit ictus, & os altera fiderit. Itaque, si graviter aliquis percussus est, si mala indicia subsecuta sunt, neque ea parte, qua cutis discissa est, rima reperitur; non incommodum

K k 2

dum

c Quintil. Institut. Orator. III, 6. ad quem locum plura dabimus exempla. * Hic quintus fracturarum cranii modus *ἀρθρῆμα* dictus describitur, de quo vide Vertunian. in Comment. in Hippocr. de Cap. vulner. pag. 63, & seq.

dum est, parte altera considerare, num quis locus mollior sit, & tumeat; eumque aperire: siquidem ibi fissum os reperietur. Nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiamsi * frustra secta est. Os d fractum nisi succursum est, gravibus e inflammationibus afficit, difficiliusque postea tractatur.

Raro, sed aliquando tamen, evenit, ut os quidem totum integrum maneat, intus vero ex ictu vena aliqua in cerebri membrana rupta aliquid sanguinis mittat; isque ibi concretus magnos dolores moveat, † & oculos quibusdam obæcet. Sed fere contra id dolor est, &, eo loco cute incisa, pallidum os reperitur. ideoque id quoque os excidendum est. Quacumque autem de causa curatio hæc necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec, quicquid læsum est, in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsa membranula, quæ sub cute calvariam cingit, super os relinquatur: siquidem hæc scalpro terebrisve lacerata vehementes febres cum inflammationibus excitat. Itaque eam commodius est ex toto ab osse deduci. Plagam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. Si manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus transversis lineis literæ x figuram accipit, ut deinde à singulis procedentibus angulis cutis ‡ subsecetur.

Inter quæ, si sanguis fertur, sponsia subinde

* *In frustra defecta.* Ita legendum censet Scaliger apud Vertunian. in Comment. in Hippoc. de Cap. Vulner. pag. 65. d Aph. VII, 14, 24. e Æginet. VI, 90. † *& oculos &c.* lege *oculosque pns obæcet.* Scaliger apud Vertunian. p. 64. ‡ Edit. *lingulis*, aliæ, *ligulis*. ‡ *Subsequatur.* Scalig. apud Vertunian. p. 90.

inde in aceto tincta cohibendus est, occupandusque objectis linamentis, & caput altius g excitandum. Neque id vitium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, adfert: sed ibi quoque nihil tutius fit.

In omni vero fisso fractove osse, protinus antiquiores medici ad ferraamenta veniebant, quibus id exciderent. Sed multo melius est, ante emplastra experiri, quæ calvaria causa componuntur. eorumque aliquod oportet ex aceto mollitum per se super fissum fractumve os imponere: deinde super id, aliquanto latius quam vulnus est, eodem medicamento illitum linteolum, & præterea succidam
10 lanam aceto tinctam: tunc vulnus deligare, & quotidie resolvere; similiterque curare usque ad diem quintum. A sexto die etiam vapore aquæ calidæ per spongiam fovere: cæteraque eadem facere. Quod si caruncula
20 increfcere cœperit, & febricula aut soluta fuerit, aut levior, & cupiditas cibi reverterit, satisque somni accedat, in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum,
25 adjecto cerato ex rosa factò; quo facilius carnem producat. nam per se reprimendi vim habet. Hac ratione sæpe rimæ callo quodam implentur; estque ea ossis velut cicatrix. & latius fracta ossa, si qua inter se non
30 cohærebunt, eodem callo glutinantur. estque id aliquanto melius velamentum cerebro, quam caro, quæ exciso osse increfcit. Si vero sub prima curatione febris intenditur, brevesque somni, & iidem per

K k 3

som-

518 A. CORN. CELSI Lib. 8.
somnia tumultuosi sunt, ulcus madet, ne-
que * alitur, & in cervicibus glandulæ
oriuntur, magni dolores sunt, cibique super
hæc fastidium increfcit; tum demum ad
manum scalprumque veniendum est. 5

Duo vero sub ictu calvariæ † pericula
sunt; ne vel findatur vel medium defidat.
Si fissum est, possunt oræ esse compressæ:
vel quia altera super alteram excessit; vel
etiam, quia vehementer rursus se commi-
ferunt. Ex quo evenit, ut humor ad mem-
branam quidem descendat, exitum vero non
habeat; ac sic eam irriter, & graves inflam-
mationes moveat. 100

At ubi medium os defedit, eandem ce- 110
rebri membranam urget: interdum etiam
ex fractura quibusdam velut aculeis pun-
gentibus. His ita succurrendum est, ut
tamen quam minimum ex osse dematur.
Ergo, si ora alteri infedit, satis est id, quod 200
eminet, plano scalpro excidere. Quo sub-
lato, si rima hiat aliquantum, curationi
satis est. At, si oræ inter se comprimuntur,
à latere ejus, interposito digiti spatio, tere-
bra foramen faciendum est: ab eoque scal- 250
per duabus lineis ad rimam agendus, ad si-
militudinem literæ A; sic, ut vertex ejus à
foramine, basis ad rimam sit.

Quod si rima longius patet, ab altero
foramine rursus similis sinus fieri debet: 300
& ita nihil latere sub eo osse confractum
potest, abundeque exitus datur intus h læ-
dentibus. Ne si fractum quidem os dese-
dit, totum excidi necesse est: sed, si ve to-
tum

* i. e. coalescit. Scaligerana prima, pag. 7. † H.
F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. 1. C. 2. h Alii
lateralibus.

tum perfractum est, & ab alio ex toto recessit, siue circumpositæ calvariæ inhæret exigua parte, ab eo, quod naturaliter se habet, scalpro dividendum est. Deinde in eo, 5 quod defedit, juxta rimam, quam fecimus, foramina facienda sunt, si in angusto noxa est, duo; si latius patet, tria; septaque eorum excidenda: & tum scalper utrinque ad rimam agendus sic, ut lunatum finum 10 faciat, imaue pars ejus intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. Deinde, si qua i labant, & ex facili removeri possunt, forcipe ad id factò colligenda sunt, maximeque ea, quæ acuta membranam infe- 15 stant. Si id ex facili fieri non potest, subjicienda lamina est, quam custodem ejus 512, membranæ esse, proposui: & super eam, 21. quicquid spinosum est, & intus eminet, excidendum est. eadem lamina, quicquid 20 deorsum insedit, attollendum. Hoc genus curationis efficit, ut, qua parte fracta ossa tamen inhærent, solidentur: qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub medicamentis tempore excidant, spaciūque inter 25 hæc satis illis magnum ad extrahendam saniem relinquatur, plusque in osse propugnaculi cerebrum habeat, quam habiturum fuit, eo exciso.

His factis, ea membrana acri aceto re- 30 spargenda est; ut, siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur, siue intus concretus cruor remanet, discutiatur: tum idem medicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollitum, ipsi membranæ im-

ponendum est: cæteraque eodem modo
facienda sunt, quæ ad linteolum illitum,
& lanam succidam pertinent: collocandus-
que is loco intepido: & curandum quotidie
vulnus; bis etiam, æstate.

Quod si membrana per inflammationem
intumuerit, infundenda erit rosa tepida. Si
usque eo tumebit, ut super ossa quoque
emineat, coercebit eam bene trita lenticu-
la, vel folia vitis contrita, & cum recenti
vel butyro, vel adipe anserino mixta: cer-
vixque & molliri debebit liquido cerato, ex
irino facto. At, si parum pura membrana
videbitur, par modus ejus emplastri &
mellis miscendus erit; idque superinfun-
dendum; ejusque continendi causa unum
aut alterum linamentum injiciendum; &
super linteolo, cui emplastrum illitum sit,
contegendum. Ubi satis pura membrana
est, eadem ratione adjiciendum emplastro
ceratum, ut carnem producat.

Quod ad abstinentiam vero, & primos
ulterioresque cibos potionesque pertinet,
eadem, quæ in vulneribus præcepi, servan-
da sunt: eo magis, quo periculosius hæc
pars afficitur. Quinetiam, cum jam non
solum sustineri, sed aliis cibis quoque *opor-
tebit, tamen erunt vitanda, quæcunque
mandenda sunt: item fumus, & quicquid
excitat sternutamentum. Spem vero cer-
tam faciunt, membrana mobilis ac sui co-
loris, caro increfcescens rubicunda, facilis
motus maxillæ atque cervicis. Mala signa
sunt, membrana immobilis, nigra, vel livi-
da,

k Alii *illiniri*. * Pantin. Edit. *adparebunt*. l Al.
mollis.

da, vel aliter coloris corrupti, dementia,
acris vomitus, nervorum vel resolutio vel
distentio, caro livida, maxillarum rigor,
atque cervicis. Cætera, quæ ad somnum,
5 cibi desiderium, febrem, puris colorem
attinent, eadem, quæ in cæteris vulneribus,
vel salutaria, vel mortifera sunt.

Ubi bene res cedit, incipit ab ipsa mem-
brana; vel, si os eo loco duplex est, inde
10 quoque caro increfcens id, quod inter ossa
vacuum est, replet: nonnunquam etiam
super calvariam excrescit. Quod si incidit,
inspergenda squama æris est, ut id repri-
mat & cohibeat, eaque carni superdanda,
15 quæ ad cicatricem perducant. Omnibus-
que ea locis commode inducitur, excepta
frontis ea parte, quæ paululum super id est,
quod inter supercilia est. Ibi enim vix fieri
potest, ut * non per omnem ætatem sit exul-
20 ceratio: quæ linteolo, medicamentum ha-
bente, contegenda erit. Illa utique, capite
fracto, servanda sunt, ut, donec jam valida
cicatrix erit, vitentur sol, ventus, frequens
balneum, major vini modus.

45

CAP V.

De Naso fracto. 2

IN naribus vero, & os, & cartilago frangi
solet, & quidem modo adversa, modo à late-
30 re. Si adversa fracta sunt, alterumve ex
his, nares desidunt, difficulter spiritus tra-
hitur. Si à latere os fractum est, is locus ca-
vus est: si cartilago, in alteram partem na-
res declinantur. Quic-

* Deest Edit. Pantin. a Æginet. VI, 91. Hippocrat.
de Articul. T. XXX. XXXI. Vectar. T. V. Petr. de
Marchettis Observat. Medico-Chirurg. Observ. 26. 27.
exempla refert.

Quicquid è cartilagine concedit, excitandum leniter est, aut subjecto specillo, aut duobus digitis utrinque compressis: deinde in longitudinem implicata linamenta, & molli pellicula cineta circumfutaque, intus injicienda sunt; aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo; aut grandis pinna, gummi, vel fabrili glutine illita, & molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilaginem non finunt. Sed, si adversa ea fracta est, æqualiter utraque naris implenda est. Si à latere, id, quod inferitur, crassius esse debet ab ea parte, in quam nasus jacet, ab altera tenuius. Extrinsecus autem circumdanda habena est mollis, medio illita mixtis inter se similia & thuris fuligine: eaque ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est. id enim corpori quasi gluten inhærescit, & cum induruit, nares commodè continet. Sin, quod intus inditum est, lædit; sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, exercitatae nares eadem tantummodo habena continendæ sunt: deinde, post quatuordecim dies idipsum demendum est. Resolvitur autem aqua calida; eaque tumens locus quotidie fovendus est.

Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est: atque ubi adversum id ictum est, utraque naris implenda est; ubi à latere, ea, in quam os impulsus est: imponendumque ceratum, & paulo vehementius deligandum est; quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo

§25,
18.

modo, sed etiam ad tumorem increfcit. à tertio die fovendum id aqua calida eft, tantoque magis, quanto propius eſſe ſanitati debet. Quod ſi plura erunt fragmenta, nihilominus intrinſecus ſingula in ſuas ſedes digitis erunt compellenda; imponendaque extrinſecus eadem habena, & ſuper eam ceratum; neque ultra fascia adhibenda eſt.

- 10 At, ſi quod fragmentum undique reſolutum cum cæteris non glutinabitur intelligetur quidem ex humore, qui multus ex vulnere feretur; vulſella vero extrahetur: finitiſque inflammationibus, imponetur ali-
- 15 quod medicamentum ex iis, quæ leniter reprimunt. Pejus eſt, ubi aut oſſi aut cartilagini fractæ cutis quoque vulnus acceſſit. id admodum raro fit. Si incidit, illa quidem nihilominus eadem ratione in ſuas
- 20 ſedes excitanda ſunt: cuti vero ſuperimponendum emplaſtrum aliquod ex his, quæ recentibus vulneribus accommodata ſunt: ſed inſuper nullo vinculo deligandum eſt.

C A P. VI.

De Auribus fractis. 2

- 25 **I**N aure quoque interdum rumpitur cartilago. Quod ſi incidit, antequam puſoriatur, imponendum glutinans medicamentum eſt. ſæpe enim ſuppurationem prohibet, & aurem confirmat. Illud & in hac & in naribus ignorari non oportet; non quidem cartilaginem ipſam glutinari, circa tamen carnem increſcere, ſolidarique
- eum

eum locum. Itaque, si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinque fuitur. Nunc autem de ea dico, quæ, cute integra, frangitur. In ea vero si jam pus natum est, aperienda altera parte cutis, & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est; deinde utendum est medicamento leniter sanguinem supprimente, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat: tum imponendum linteolum cum emplastro, sic, ut pingue omne vitetur: & à parte posteriore lana mollis auri subjienda est, quæ, quod est inter hanc & caput, compleat: tum leniter ea deliganda est; & à tertio die, vapore, ut in naribus posui, fovenda. Atque in his quoque generibus abstinentiâ primis temporibus necessaria est, donec inflammatio finiatur.

C A P. V I I.

De Maxilla fracta, & quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. ^a

AB his ad maxillam venturus indicanda quædam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur os, modo rectum, ut lignum in longitudinem finditur; modo frangitur transversum; interdum obliquum: atque id ipsum nonnunquam retusa habet capita, nonnunquam acuta. quod genus pessimum est: quia neque facile committuntur, quæ nulli retuso innituntur; & carnem vulnerant, interdum quoque nervum aut musculum. Quin-
etiam

etiam aliquando plura fragmenta à fragmento sunt. Sed in aliis quidem ossibus ex toto sæpe fragmentum à fragmento recedit: Maxillæ vero semper aliqua, parte etiam
5 vexata, ossa inter se cohærent.

Igitur imprimis digitis duobus utrinque prementibus, & ab ore, & à mento, omnia ossa in suam sedem compellenda sunt: deinde, si maxilla transversa fracta est (sub quo
10 casu fere dens super proximum dentem excidit) ubi ea in suam sedem collocata est, duo proximi dentes, aut si hi labant, posteriores inter se * feta deligandi sunt. id in alio genere fracturæ supervacuum est. cætera
15 eadem facienda. Nam linteolum duplex, madens vino & oleo, superinjiciendum est, cumque eo simila & thuris fuligo: deinde aut fascia, aut mollis habena, medio in lon- 522,
gitudinem incisa, ut utrinque mentum 16.
20 complectatur; & inde capita ejus supra caput adducta ibi ligentur.

Illud quoque ad omnia ossa pertinens dictum erit; famem primum esse necessariam: deinde, à die tertio, humidum cibum;
25 sublata inflammatione, paulo plenior, eumque, qui carnem alat: vinum per omne tempus esse alienum. Deinde tertio die resolvi debere; foverique per spongiam vapore calidæ; eademque, quæ primo foverant,
30 superdari: idem quinto die fieri, & donec inflammatio finiatur; quæ vel nono die, vel septimo fere solvitur: ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut, si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. neque id esse
sol-

solvendum, nisi duæ partes ejus temporis, intra quod quæque ossa confervent, transferunt.

Fere vero inter quartumdecimum & unum & vigesimum diem sanescunt, maxilla, 5
malæ, jugulum, pectus, latum os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta: inter vigesimum & trigessimum diem, crura brachiaque: inter septimum & vigesimum & quadragesimum, 10
humeri & femora.

Sed de maxilla illud quoque adjiciendum est, quod humidus cibus diu assumendus sit. Atque etiam, cum tempus processit, in lagano similibusque aliis perseverandum est, neque quicquam edendum, donec ex toto maxillam callus firmaverit. Itemque, primis utique diebus, habendum silentium. 15

C A P. V I I I.

20

De Jugulo fracto.

JUGULUM vero, si transversum fractum est, nonnunquam per se recte coit, &, nisi movetur, sanari sine vinctura potest: 25
nonnunquam vero, maximeque ubi motum est, elabitur; fereque id, quod à pectore est, super id, quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. Cujus ea ratio est, quod per se non movetur; sed cum 30
humeri motu consentit. Itaque, eo consistente, super id humerus agitur. Raro vero admodum in priorem partem jugulum inclinatur; adeo ut magni professores nunquam

quam se vidisse memoriæ mandaverint. Sed locuples tamen ejus rei author Hippocrates est.

Verum, ut dissimilis uterque casus est,
5 sic quædam dissimilia requirit. Ubi ad scapulas jugulum tendit, simul dextra manu plana propellendus in posteriorem partem humerus est, & illud in priorem attrahendum. Ubi ad pectus conversum est, ipsum
10 quidem retro dandum, humerus autem in priorem partem adducendus est: ac, si is inferior est, non id, quod à pectore est, depressendum est, quia immobile est; sed humerus ipse attollendus: sin autem superior
15 est, id, quod à pectore est, implendum lana, & humerus ad pectus deligandus est. Si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet; & ex ossibus ea, quæ carnem vulnerant, præcidenda; tum retusa ossa committenda sunt; &, si quod ab aliqua parte eminet, opponendum est triplex linteolum in vino & oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemque intus incerato, ne fascia
20 diducatur. quæ jugulo composito circumdanda est sæpius potius, quam valentius. quod ipsum quoque in omnibus fractis perpetuum est. A dextro vero jugulo, si id fractum est, ad alam sinistram; à sinistro, ad
25 dexteram, rursusque sub ala sua fascia dari debet: post hæc, si jugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus; si in partem priorem, ad cervicem deligandum est: supinusque homo collocandus. cætera eadem

dem facienda, quæ supra comprehensa sunt.

2. *De diversis ossium curis.*

Sunt vero plura ossa fere immobilia, vel dura, vel cartilaginosa, quæ vel franguntur, vel forantur, vel colliduntur, vel finduntur, ut malæ, pectus, latum os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta. Horum omnium eadem curatio est. Si supra vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. quo sanescente, rimas quoque ossis, aut, si quod foramen est, callus implet. Si cutis integra est, & os læsum esse, ex dolore colligimus, nihil aliud, quam quiescendum; imponendumque ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

C A P. I X.

De Costis fractis.^a

PROPRIE tamen quædam de costis dicenda sunt; quia juxta viscera sunt, & gravioribus periculis is locus expositus est. Costa igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars ejus, quæ rara est, lædatur: interdum sic, ut eam totam is casus perruperit. Si tota fracta non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quicquam suppurat, nisi admodum raro, nec dolor magnus est; tactu tamen is locus leviter indolescit: sed abunde est eadem, quæ supra scripta sunt, facere; & à media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. Ab uno vero & vigesimo die,

^a Æginet, VI, 96.

die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum cibus uberioribus est, ut corpus quam plenissimum fiat, quo melius os vestiatur: quod illo loco tenerum adhuc injuriæ sub tenui cute expositum est. Per omne autem tempus curationis, vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus vehementior corporis, fumus, pulvis, & quicquid vel tussim vel sternutamentum
10 movet: ne spiritum quidem magnopere continere expedit.

At, si tota costa perfracta est, casus asperior est. Nam & graves inflammationes, & febris, & suppuratio, & sæpe vitæ periculum sequitur, & sanguis spuitur. Ergo, si vires patiuntur, ab eo brachio, quod super eam costam est, sanguis mittendus est: si non patiuntur, alvus, tamen sine ullo acriducenda est; diutiusque inedia pugnandum. Panis vero ante septimum diem non
20 assumendus; sed una sorbitione vivendum: imponendumque ei loco ceratum ex lycio factum, cui cocta quoque resina adjecta sit, aut Polyarchi malagma; aut panni ex vino
25 & rosa & oleo; superque imponenda lana succida mollis, & duæ fasciæ à mediis orsæ, minimeque adstrictæ. Multo vero magis omnia vitanda, quæ supra posui; adeo, ut ne spiritus quidem sæpius movendus
30 sit. Quod si tussis infestabit, ad id potio sumenda erit, vel ex trixagine, vel ex ruta, vel ex herba stœchade, vel ex cumino & pipere. Gravioribus vero doloribus urgentibus, cataplasma imponi quoque con-

veniet, vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adjecta. Et id quidem interdiu superjacebit: noctu vero idem aut ceratum, aut malagma, aut pan- ni; quia potest cataplasma decidere. Ergo 5
quotidie quoque resolvetur, donec jam ce- rato aut malagmate possimus esse contenti. Et decem quidem diebus extenuabitur fa- me corpus; ab undecimo vero ali incipiet. 10
ideoque etiam laxior, quam primo, fascia fit, qua ligabitur. Fereque ea curatione ad quadragesimum diem perveniet.

Sub qua si metus erit suppurationis, plus malagma, quam ceratum ad digerendum proficiet. Si suppuratio vicerit, neque per 15
quæ supra scripta sunt, discuti potuerit; om- nis mora vitanda erit, ne os infra vitietur: sed, qua parte maxime tumebit, demitten- dum erit candens ferramentum, donec ad pus perveniat; idque effundendum. Si nus- 20
quam tumor se ostendit, ubi maxime pus subsit, sic intelligemus. creta cimolia to- tum locum illinemus, & ficcari patiemur: quo loco maxime humor intus persevera- bit, ibi pus proximum erit; eoque uri de- 25
bebit. Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum; demit- tendumque linamentum, aut aliquid ex penicillo. quod summum lino sit devin- ctum, ut facile educatur. Reliqua eadem, 30
quæ in cæteris adustis, facienda sunt. Ubi purum erit ulcus, ali corpus debebit, ne ta- bes, perniciofa futura, id malum subsequa- tur. Nonnunquam etiam, levius ipso osse affecto,

affecto, & inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam muco similis, intus coit; mollescitque contra cutis. In qua simili uestione utendum est.

5

2. De spina fracta. 2.

In spina quoque est, quod proprie notemus. Nam si quid ex vertebra excidit, aut aliquo modo fractum est, locus quidem concavus fit; punctiones autem in eo sentiuntur: quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. quo fit, ut homo in anteriorem partem subinde nitatur. Hæc noscendæ rei causa sunt. Medicamentis vero iisdem opus est, quæ prima parte hujus capitis exposita sunt.

15

CAP. X.

De Humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum, vel evulforum, communibus curationibus.

20

SIMILES rursus ex magna parte casus curationesque sunt humeris & femoribus.

Communia etiam quædam humeris, brachiis, femoribus, cruribus, digitis: si quidem ea minime periculose media franguntur: at, quo propior fractura capiti vel superiori vel inferiori est, eo pejor est. nam & majores dolores adfert, & difficilius curatur. Earum maxime tolerabilis est simplex, eaque transversa: pejor, ubi obliqua, atque ubi fragmenta: pessima, ubi eadem acuta sunt. Nonnunquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius excidunt, aliudque super aliud effer-

25

30

Ll 2

tur,

tur. idque ante omnia considerari debet: & sunt notæ certæ. Si suis sedibus sunt mota, resima, punctionesque sensum repræsentant, & tactu inæqualia sunt. Si vero non adversa, sed obliqua junguntur (quod fit, 5 ubi loco suo non sunt) membrum id altero latere brevius est, & musculi ejus tu-
ment.

Ergo, si hoc deprensus est, protinus id membrum oportet extendere. Nam nervi 10 musculique, intenti per ossa, contrahuntur: neque in suum locum veniunt, nisi illos per vim aliquis intendit. Rursus, si primis diebus id omissum est, inflammatio oritur. Sub qua & difficile, & periculose, 15 vis nervis adhibetur. nam distentionem nervorum vel* cancer sequitur; vel certe, cum mitissime agitur, pus. itaque, si ante reposita ossa non sunt, post eam reponenda sunt. Intendere autem digitum vel aliud quod- 20 que membrum, si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest; cum alteram partem dextra, alteram sinistra prendit. Valentius membrum duobus eget, qui in diversa contendunt. Si firmiores nervi sunt, ut in vi- 25 ris robustis, maximeque eorum feminibus & cruribus evenit; habenis quoque, vel lineis fasciis utrinque capita articulorum deliganda, & per plures & in diversa du- cenda sunt. Ubi vero paulo longius, quam 30 naturaliter esse debet, membrum vis fecit; tum demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt: indiciumque ossis repositi est dolor sublatus. At membrum alteri
æqua-

æquatum, involvendum duplicibus triplicibusve pannis in vino & oleo tinctis: quos lineos esse, commodius est.

- Fere vero fasciis sex opus est. Prima brevissima adhibenda: quæ circa fracturam ter voluta sursum versum feratur, & quasi in cochleam serpat; satisque est, eam ter hoc quoque modo circuire. Altera dimidio longior ea: quæ, si qua parte os eminet, ab
 10 ea, si totum æquale est, undelibet super fracturam incipere debet, priori adversa, deorsumque tendere; atque iterum ad fracturam reversa, in superiore parte ultra priorem fasciam desinere. Super has injicien-
 15 dum latiore linteo ceratum est, quod eas contineat. Ac, si qua parte os eminet, triplex ei pannus objiciendus, eodem vino & oleo madens. Hæc tertia fascia comprehendenda sunt, quartaque, sic, ut semper in-
 20 sequens priori adversa sit, & tertia tantum in inferiore parte, tres in superiore a finiant: quia satius est sæpius circuire, quam adstringi: siquidem id, quod adstrictum est, alienatur, & cancro opportunum est. Arti-
 25 culum autem quamminime vincire opus est: sed, si juxta hunc os fractum est, necesse est.

294, 31.
300, 17.

- Deligatum vero membrum in diem tertium continendum est. Eaque vinctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit,
 30 non tamen laxa visa sit; secundo laxior; tertio jam pene resoluta. Ergo tum rursum id membrum deligandum, adjiciendaque prioribus quinta fascia est, iterum-

Ll 3

que

que quinto resolvendum est, & tum sex fasciis involvendum, sic, ut tertia & quinta infra, cæteræ supra finiantur. Quotiescunque autem solvitur membrum, calida aqua fovendum est. Sed, si juxta articulum fractura est, diu instillandum vinum est, exigua parte olei adjecta, eademque omnia facienda, donec ab eo inflammatio solvatur, vel tenuius quoque, quam ex consuetudine, id membrum fiat. quod si septimus dies non dedit, certe nonus exhibet. tum facillime ossa tractantur.

Rursus ergo, si parum commissa sunt, committi debent: si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt: deinde eodem modo membrum deligandum, ferulæque superaccommodandæ sunt, quæ fissæ circumpositæque ossa in sua sede contineant: & in quam partem fractura inclinat, ab eo latior valentiorque ferula imponenda est. Easque omnes circa articulum esse oportet resimas, ne hunc lædant, nec ultra adstringi, quam ut ossa contineant: & cum spatium laxentur, tertio quoque die pauium habenis suis coartari; ac, si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere, donec duæ partes ejus temporis, quo os quodque confervet, compleantur: postea levius aqua calida fovere; quia primo digeri materiam opus est, tum evocari. Ergo cerato quoque liquido id ^b leniter est ungendum, perfricandaque summa cutis est; laxiusque id deligandum est. Tertio quoque die solvendum, sic, ut remota calida aqua,

aqua, cætera eadem fiant; tantummodo singulæ fasciæ, quoties resolutæ fuerint, subtrahantur.

2. De Humero fracto. c

- 5 Hæc communia sunt: illa propria. Siquidem humerus fractus est, non sic, ut membrum aliud, intenditur: sed homo collocatur alto sedili, medicus autem humiliore adversus. Una autem fascia, brachium amplexa, ex cervice ipsius, qui læsus est, id sustinet: altera, ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum: tertia, vincto imo humero deorsum demittitur, ibi quoque capitibus ejus inter se vinctis.
- 15 Deinde ab occipitio ipsius, minister sub ea fascia, quam secundo loco posui, porrecto, si dexter humerus ducendus est, dextro, si sinister, sinistro brachio, demissum inter femina ejus, qui curatur, baculum tenet:
- 20 medicus super eam fasciam, de qua tertio loco dixi, plantam injicit dextram, si sinister, sinistram, si dexter humerus curatur; simulque alteram fasciam minister attollit, alteram premit medicus: quo fit, ut leniter
- 25 humerus extendatur. Fasciis vero, si medium aut imum os fractum est, brevioribus opus est; si summum, longioribus: ut ab eo sub altera quoque ala per pectus ad scapulas porrigantur. Protinus vero brachium, cum deligatur, sic inclinandum est,
- 30 ut id, quod afficitur, ante fasciis quoque sic figuratum sit, ne postea suspensum aliter, atque cum deligabatur, humerum inclinet: brachioque suspenso, ipse quoque

humerus ad latus leniter deligandus est. per quæ fit, ut minime moveatur: ideoque ossa sic se habent, ut aliquis composuit. Cum ad ferulas ventum est, extrinsecus esse earum longissimæ debent: à lacerto breviores; sed sub ala brevissimæ. Sæpiusque resolvendæ sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est, ne ibi nervi rigescant, & inutile brachium efficiatur. Quoties solutæ sunt, fractura manu continenda; cubitus aqua calida fovendus, & molli cerato perfricandus; ferulæque vel omnino non imponendæ contra eminentia cubiti, vel aliquanto breviores sint.

De Brachio fracto. d

At, si brachium fractum est, in primis considerandum est, alterum os, an utrumque comminutum sit: non quo alia in ejusmodi casu curatio sit admovenda; sed primum, ut valentius extendatur, si utrumque os fractum est, quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, cosque intendente: deinde, ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. nam, ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fasciis ferulisque est. Deligari autem brachium debet, paululum pollice ad pectus inclinato; siquidem is maxime brachii naturalis habitus sit: idque involutum mitella commodissime excipitur. quæ latitudine ipsa brachio, perangustis capitibus collo injicitur: atque ita commode brachium ex cervice suspensum est. Idque pau-

paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet.

4. De Cubito fracto.

5 Quod si ex summo cubito quid fractum sit, glutinare id vinciendo alienum est. fit enim brachium immobile. Ac, si nihil aliud quam dolori occurendum est, idem, qui fuit, ejus usus est.

5. De Cruribus Femoribusque fractis. f

10 In crure æque ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. commune vero ei femorique est, quod, ubi deligatum est, in canalem conjiciendum est. Is canalis ab inferiori parte foramina habere debet, per quæ, si quis humor excesserit, descendat: & à planta moram, quæ simul & sustineat eam, & delabi non patiatur: & à lateribus cava, per quæ loris datis, moræ quædam crus femurque, ut collocatum est, 20 detineant. Esse etiam is debet, à planta, si crus fractum est, circa poplitem; si femur, usque ad coxam; si juxta superius caput femoris, sic, ut ipsa quoque ei coxa insit, Neque tamen ignorari oportet, si femur 25 fractum est, fieri brevius, quia nunquam in antiquum statum revertitur: summisque digitis postea cruris ejus insisti. ex quo multa debilitas est; foedior tamen, ubi fortunæ negligentia quoque accessit.

30

6. De Digito fracto.

Digitum satis est ad unumg furculum deligari post inflammationem.

L 15

7. Com-

f Æginet. VI, 102. Hippocrates de Fractur. XXIII.
g Al. furunculum.

7. *Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosque confractos pertinentes.*

His proprie ad singula membra pertinentibus, rursus ista communia sunt: primis diebus fames: deinde tum, cum jam increfcere callum oportet, liberalius alimentum: longa à vino abftinentia: fomentum aquæ calidæ, dum inflammatio eft, liberale; cum ea defuit, modicum: tum etiam longior ulterioribus, è liquido cæto, membris & mollis tamen unctio. Nec protinus exercendum id membrum, fed paulatim ad antiquos ufus reducendus eft.

Gravius aliquanto eft, cum offis fracturæ carnis quoque vulnus accessit; maximeque, fi id musculi femoris aut humeri fenferint. nam & inflammationes multo graviores, & promptiores cancrôs habent. Ac femur quidem, fi offa inter fe cefferunt, fere præcidi necesse eft. Humerus vero quoque in periculum venit; fed facilius confervatur. Quibus periculis etiam magis id expositum, quod juxta ipfos articulos ictum eft. Igitur curioſius id agendum eft, & per mediam plagam musculus tranſverſus præcidendus: ſanguis vero, fi parum fluxit, mittendus: corpus inedia in decimum diem extenuandum. Ac reliqua quidem membra lentius intendenda, & lenius in his offa in ſuam ſedem reponenda ſunt: his vero neque intendi nervos, neque offa tractari, ſatis expedit. ipſique homini permittendum eft, ut ſic ea collocata habeat, quem-

quemadmodum minimum læduntur. Omnibus autem his vulneribus imponendum primo linamentum ex vino madens, cui rosæ paulum admodum adjectum sit: cætera eadem. Deliganda fasciis sunt, aliquanto, quam vulnus, laxioribus; scilicet laxius, quam si ea plaga non esset, quantoque facilius & alienari & occupari cancro vulnus potest. h numero potius fasciarum id agendum est, ut laxæ quoque æque contineant.

Quod in femore humerove sic fiet, si ossa forte recte concurrerint: sin aliter se habebunt, eatenus circumdari fascia debet, ut impositum medicamentum contineat. Cætera eadem, quæ supra scripsi, facienda sunt. præterquam quod neque ferulis, neque canalibus, inter quæ vulnus sanescere non potest; sed pluribus tantummodo & latioribus fasciis opus est: ingerendumque subinde in eas est calidum oleum, & vinum; i magisque hoc. In principio fame utendum; vulnus calida aqua fovendum; frigusque omni ratione vitandum est, & transeundum ad medicamenta, quæ puri movendo sunt. Majorque vulneri, quam ossi cura adhibenda. ergo quotidie solvendum nutriendumque est.

Inter quæ si quod parvulum fragmentum ossis eminet, id, si retusum est, in suam sedem dandum: si acutum, ante acumen ejus, si longius est, præcidendum; si brevius, limandum, & utrumque scalpro lævandum: tum ipsum recondendum est. ac, si id manus facere non potest, vulsella, quali

quali fabri utuntur, injicienda est acutæ
offis prominentis cuspidi, ab ea parte, qua
sima est; ut ea parte, qua gibba est, eminens
os in suam sedem compellat. Si id ma-
jus est, membranulisque cingitur, finire
oportet has sub medicamentis resolvi, id-
que os, ubi jam nudatum est, abscin-
dere; quod maturius scilicet faciendum est.
postque ea ratione & os coire, & vulnus
sanescere; illud suo tempore; hoc, prout
se habet.

Nonnunquam etiam in magno vulnere
evenit, ut fragmenta quædam velut emo-
riantur, neque cum cæteris cocant. quod
hic quoque ex modo fluentis humoris col-
ligitur. Quo magis necessarium est, sæpius
ulcus resolvere, quam nutrire: sequitur-
que fere, ut id os per se post aliquot dies
excidat; aut, cum jam ante misera conditio
vulneris sit, tamen id interdum majus diu-
turniusque faciat. Sæpe etiam integra cute
os abrumpitur, protinusque prurigo & do-
lor oritur. Quare solvere, si accidit, ma-
turius oportet, & fovere aqua, per æstatem,
frigida; per hiemen, egelida: deinde ce-
ratum myrteum imponere.

Interdum fractura quibusdam velut acu-
leis carnem vexat. Quo à prurigine &
punctionibus cognito, aperire id medicus,
eosque aculeos præcidere necesse habet.
Reliqua vero curatio in utroque hoc casu
eadem est; quæ, ubi plagam ictus protin-
us intulit. Puro jam ulcere, cibis hic
quoque utendum est carnem producenti-
bus,

bus. Si brevius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis & lævissimi generis inter ea demitti debet, sic, ut capite paululum emineat; isque quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. Tum paxillus removendus, vulnusque sanandum est. Cicatrix vero inducta fovenda aqua frigida est, in qua myrtus, hederæ, aliæve similes verbenæ decocta sint: illinendumque medicamentum, quod siccet. & magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur.

Si quando vero ossa non conferbuerunt, quia sæpe soluta, sæpe mota sunt, in aperto deinde curatio est. possunt enim coire. Si vetustas occupavit, membrum extendendum est, ut aliquid lædatur: ossa inter se manu dividenda, ut concurrente exasperentur, & si quid pingue est, eradatur, totumque id quasi recens fiat. magna tamen cura habita, ne nervi musculive lædantur. Tum vino fovendum est, in quo malicorium decoctum sit; imponendumque id ipsum ovi albo mixtum: tertio die resolvendum, fovendumque aqua, in qua verbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. quinto die idem faciendum, ferulæque circumdandæ: cætera, & ante, & post, eadem faciendæ, quæ supra scripsi. Solent tamen interdum adversa inter se ossa¹ conservare: eoque & brevius membrum, & indecorum sit, & si capita acutiora sunt, assidue punctoræ sentiuntur. Ob quam causam frangi
rursus

¹ Al. Cohære vel coalescere.

rursus ossa & dirigi debent. Id hoc modo fit. Calida aqua multa id membrum fovetur, & ex cerato liquido perfricatur, intenditurque: inter hæc, medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo, manibus ea ducit, compellitque id, quod eminet, in suam sedem: & si parum valuit, ab ea parte, in quam os se inclinat, involutam lana regulam objicit; atque ita deligando, assuescere iterum vetustæ sedi cogit.

Nonnunquam autem recte quidem ossa conferbuerunt, superincrevit vero nimius callus; ideoque locus intumuit. Quod ubi incidit, diu leniterque id membrum perfricandum est ex oleo, & sale, & nitro; multumque aqua calida falsa fovendum; & imponendum malagma, quod digerat; adstrictiusque alligandum: oleribusque, & præterea vomitu utendum. per quæ cum carne callus quoque extenuatur: conferturque aliquid de sinapi cum ficu in alterum pariter membrum impositum, donec id paulum erodat, eoque evocet materiam. Ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitæ revertendum est.

C A P. XI.

De Ossibus luxatis.

AC de fractis quidem ossibus hætenus dictum fit. Moventur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modo, quæ juncta sunt, inter se dehiscunt: ut cum latum os scapularum ab humero recedit; & in brachio, radius à cubito; & in crure, tibia à sura;

à fura; &, interdum saltu, calcis os à talo; quod raro tamen fit: modo articuli suis sedibus excidunt. Ante de prioribus dicam.

Quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus cavus est, depressusque digitus finum invenit. deinde gravis inflammatio oritur; atque in talo præcipue: siquidem febres quoque, & cancos, & nervorum vel distentiones, vel rigores, qui caput scapulis annectunt, movere consuevit. Quorum vitandorum causa, facienda eadem sunt, quæ in ossibus mobilibus læsis. Atque id ubi incidit, protinus his locis imponenda, quæ supra proposita sunt, ut dolor tumorque per ea tollantur. Nam diducta ossa nunquam rursus inter se junguntur: & ut aliquid decoris eo loco, sic nihil usus admittitur.

Maxilla vero & vertebræ, omnesque articuli, cum validis nervis comprehenduntur, excidunt aut vi expulsi, aut aliquo casu nervis vel ruptis, vel infirmatis; faciliusque in pueris & adolescentulis, quam in robustioribus. Hique elabuntur in priorem & in posteriorem, in anteriorem & in posteriorem partem: quidam omnibus modis, quidam certis. Suntque quædam communia omnium signa, quædam propria cujusque. Siquidem semper ea parte tumor est, in quam os prorumpit; ea sinus, à qua recessit. Et hæc quidem in omnibusprehenduntur, alia vero in singulis. quæ, simulatque de quoque dicam, proponenda erunt.

Sed ut excidere omnes articuli possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim nunquam compellitur, neque in spina vertebra, neque ea maxilla, quæ, utraque parte prolapsa, antequam reponeretur, inflammationem movit. Rursum, qui nervorum vicio prolapsi sunt, compulsi quoque in suas sedes iterum excidunt. Ac, quibus in pueritia exciderunt, neque repositi sunt, minus quam cæteri crescunt: omniumque, quæ loco suo non sunt, caro emacrescit, magisque in proximo membro, quam ulteriore. utputa, si humerus loco suo non est, major in eo ipso fit macies, quam in brachio; major in hoc, quam in manu. Tum pro sedibus, & pro casibus, qui inciderunt, aut major aut minor usus ejus membri relinquitur: quoque in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur.

Quicquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illa occupavit, dum conquiescat, laceessendum non est: ubi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Multum autem eo confert & corporis & nervorum habitus. Nam, si corpus tenue, si humidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponitur; sed & multo facilius excidit, & postea minus fideliter continetur. Quæ contraria his sunt, melius continent: sed id, quod expulsum est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem levare, succida lana ex aceto superimposita: à cibo, si valentioris articuli casus est, triduo; interdum

tum medici digiti pollices, linteolis vel fasciis, ne dilabantur, involuti in os ejus conjiciendi, cæteri extrinsecus admovendi sunt. ubi vehementer maxilla apprehensa est, si una parte procidit, concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est: tunc simul & caput adprehendendum, & excitato mento, maxilla in suam sedem compellenda, & os ejus comprimendum est, sic, ut omnia pene uno momento fiant. Sin utraque parte prolapsa est, omnia eadem facienda; sed æqualiter retro est maxilla agenda. Reposito ossẽ, si cum dolore oculorum & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Cum omnibus vero, quorum ossa mota sunt, primo liquidioribus conveniat, tum his præcipue: adeo ut sermo quoque frequens, motu oris temporum nervos lædat.

C A P. XIII.

De Capite luxato.

CAPUT duobus processibus in duos finis summæ vertebræ dimissis super cervicem contineri, in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt: quo fit, ut nervi sub occipitio extendantur, & mentum pectori adglutinetur, neque bibere is, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emittat. quibus celerrime mors supervenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio ejus rei ulla sit; sed ut res indiciiis cognosceretur, & non putarent sibi me

medicum defuisse, si qui sic aliquem perdissent.

C A P. XIV.

De Spina luxata. 2

5 **I**DEM casus manet eos, quorum in spina
vertebræ exciderunt. Id enim non po-
test fieri, nisi & medulla quæ per me-
dium; & duabus membranulis, quæ per
10 duos à lateribus processus feruntur; & ner-
vis, qui continent, ruptis. Excidunt autem
& in posteriorem partem, & in priorem; &
supra septum transversum, & infra. Si in
utramvis partem exciderint, à posteriore
15 parte vel tumor, vel sinus erit. Si super se-
ptum id incidit, manus resolvuntur, vomit-
us, aut distentio nervorum sequitur, spiri-
tus difficulter movetur; dolor urget, & aures
obusæ sunt. Si sub septo, femina resolvun-
20 tur, urina supprimitur, interdum etiam
sine voluntate prorumpit. Ex ejusmodi
casibus, ut tardius, quam ex capitis, sic ta-
men intra triduum homo moritur. Nam,
quod Hippocrates dixit, vertebra in exte-
25 riorem partem prolapsa, primum hominem
collocandum esse, & extendendum, tum cal-
ce aliquem super ipsum debere consistere, &
intus impellere: in his accipiendum est,
quæ paululum excefferunt; non in his, quæ
30 toto loco motæ sunt. Nonnunquam enim
nervorum imbecillitas efficit, ut, quamvis
non exciderit vertebra, paululum tamen in
priorem partem promineat. id non jugu-
lat. Sed ab interiore parte non contingit

M m 2 quidem

quidem propelli. Ab exteriori si quid propulsum est, plerumque iterum redit: nisi, quod admodum rarum est, vis nervis destituta.

CAP. XV.

De Humero luxato. 2

HUMERUS autem modo in alam excidit, modo in partem priorem. Si in alam delapsus est, ei junctus cubitus recedit ab latere, sursumque ad ejusdem partis aurem cum humero porrigi non potest, longiusque altero id brachium est. Si in priorem partem, summum quidem brachium extenditur, minus tamen, quam naturaliter; difficilisque in priorem partem, quam in posteriorem cubitus porrigitur. 10
15

Igitur, si in alam humerus excidit, & vel puerile adhuc est corpus, vel molle, certe imbecillibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili; & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lati scapularum ossis leniter reducat; alteri, ut brachium extendat: ipsum posteriore parte residentem, humerum genu sub ala ejus cogere, simulque & latum os, & altera manu brachium ejus ad latus impellere. 20
25

At, si vastius corpus, nervive robustiores sunt, necessaria est spatha lignea, quæ & crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala usque ad digitos pervenit. in qua summa capitulum est rotundum, & leniter cavum; ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit: inque 30

que ea bina foramina tribus locis sunt, inter se spatio distantibus; in quæ lora mollia conjiciuntur. Eaque spatha, fascia involuta, quo minus tactu lædat, ad alam à brachio 5 dirigitur, sic, ut caput ejus summæ alæ subjiciatur: deinde, loris suis ad brachium deligatur; uno loco, paulum infra humeri caput; altero, paulum supra cubitum; tertio, supra manum. cui rei protinus 10 intervalla tunc quoque foraminum aptata sunt. Sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum trajicitur, ita altæ, ut consistere homo ipse non possit; simulque in alteram partem corpus demittitur, in alteram 15 brachium intenditur: eoque fit, ut capite ligni caput humeri impulsus in suam sedem, modo cum sono, modo sine hoc compellatur. Multas esse alias rationes, scire facile est uno Hippocrate lecto; sed 20 non alia magis usu comprobata est.

At, si in partem priorem humerus incidit, supinus homo collocandus, fasciaque, aut habena, media ala circumdanda est, capitaeque ejus post caput hominis ministro 25 tradenda; brachium alteri; præcipiendumque, ut ille habenam, hic brachium extendat: deinde medicus, caput quidem hominis sinistra debet repellere; dextra vero cubitum cum humero attollere, & os in 30 suam sedem compellere. faciliusque id in hoc casu, quam in priore revertitur. Repolito humero, lana alæ subjicienda est; si in interiore parte os fuit, ut ei opponatur; si in priore, ut tamen commodius deligetur.

tur. Tum fascia, primum sub ala obvoluta, caput ejus debet comprehendere, deinde per pectus ad alteram alam, ab eaque ad scapulas, rursusque ad ejusdem humeri caput tendere, sæpiusque ad eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. Vinctus hac ratione humerus commodius continetur, si adductus ad latus sit, & ad id quoque fascia deligetur. 5

C A P. X V I.

10

De Cubito luxato. a

IN cubito autem tria coire ossa, humeri, & radii, & cubiti ipsius, ex his, quæ prima parte hujus voluminis posita 15 sunt, intelligi potuit. Si cubitus, qui annexus humero est, ab hoc excidit, radius, qui adjunctus est, interdum distrahitur, interdum subsistit. In omnes vero quatuor partes excidere cubitus potest. sed, si in 20 priorem prolapsus est, extensum brachium est, neque recurvatur: si in posteriorem, brachium curvum est, neque extenditur, breviusque altero est; interdum b febrem, vomitumque bilis movet: si in exteriori 25 rem, interioremve, brachium porrectum est, sed paululum in eam partem, à qua os recessit, recurvatur.

Quicquid incidit, reponendi ratio una est (neque in cubito tantum, sed in omni- 30 bus quoque membris longis, quæ per articulum longa testa junguntur) utrumque membrum in diversas partes extendere, donec spatium inter ossa liberum sit; tum id

a Hippocrat. de Articulis. T. XXI. & Vestrar. T. IX. b Hippocrat. de Artic. T. XXII, 1.

id os, quod excidit, ab ea parte, in quam prolapsus est, in contrarium impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout nervi valent, aut ossa huc illucve se dederunt. Ac modo manibus solis utendum est, modo quædam alia adhibenda.

Ergo, si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus, interdum etiam habenis adjectis, satis est: deinde rotundum aliquid, à lacerti parte ponendum est, & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in aliis casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quæ, fracto humero supra posita est, & tum ossa reponere.

Reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. Celerius tantum sæpiusque id resolvendum est; multoque magis aqua calida fovendum, & diutius ex oleo & nitro ac sale perfricandum. In cubito enim celerius, quam in ullo alio articulo, si extra remanet, si intus revertit, callus circumdatur, isque, si per quietem increvit, flexus illius postea prohibet.

C A P. XVII.

De Manu luxata. a

MANUS quoque in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinatur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut ad pollicem, aut ad mini-

M m 4

mum.

mum digitum convertitur, & reponi non
 difficillime potest. Super locum autem du-
 rum & renitentem ex altera parte inten-
 di manus, ex altera brachium debet, sic, ut
 prona sit, si in posteriorem partem os exci- 5
 dit; supina, si in priorem; si in interiorem ex-
 terioremve, in latus. Ubi fatis nervi didu-
 cti sunt, si usque in alterutrum latus proci-
 dit, manibus in contrarium repellendum
 est. At his, quæ in priorem posterioremve 10
 partem prolapsa sunt, superimponendum
 aliquid durum, idque supra prominens os
 manu urgendum est, per quod os vis ad-
 jecta facilius in suam sedem compellit.

C A P. XVIII.

15

De Palma luxata.

I N palma quoque ossa interdum suis se-
 dibus promoventur, modo in priorem
 partem, modo in posteriorem. In latus 20
 enim moveri, paribus ossibus oppositis,
 non possunt. Signum id solum est, quod
 omnium commune est. tumor ab ea parte,
 in quam os venit: sinus ab ea, à qua recef-
 sit. Sed sine intentione, digito tantum- 25
 modo bene pressum os in suam sedem re-
 vertitur.

C A P. XIX.

De Digitis luxatis.

30

557, 4.

A T in digitis totidem fere casus, ea-
 demque signa sunt, quæ in mani-
 bus. Sed in his extendendis non æ-
 que vi opus est; quod articuli breviores, &
 nervi

nervi minus validi sint. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem vel in posteriorem partem exciderunt; tumque palma compelli: ut ita in locum, unde lapsus est digitus, restituatur.

C A P. XX.

De Femore luxato. 2

10 CUM de humeris dixerim; de his quoque, quæ in cruribus sunt, videri possum dixisse: siquidem in hoc casu quædam similitudo est femori & humero, tibiæ & cubito, pedi & manui. quædam tamen separatim quoque de his dicenda sunt.

15 Femur in omnes quatuor partes promovetur: sæpissime in b interiorem; deinde in anteriorem; raro admodum in priorem, aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsus est, crus longius altero & valgius
20 est: extra enim pes ultimus spectat. Si in anteriorem, brevius, varumque fit, & pes intus inclinatur; calx ingressu terram non contingit, sed planta ima; meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu,
25 fert, minusque baculo eget. Si in priorem, crus plicari non potest, extensumque alteri cruri ad calcem par est; sed ima planta minus in priorem partem inclinatur: dolorque in hoc casu præcipuus est; & maxime
30 urina supprimitur. Ubi cum dolore inflammatio quievit, commode ingrediuntur, rectusque eorum pes est. Si in posteriorem, extendi non potest crus, breviusque est; ubi consistit, calx quoque terram non contingit.

M m 5

Magnum

Magnum autem femori periculum est, ne vel difficulter reponatur, vel repositum rursus excidat. Quidam semper iterum excidere contendunt: sed Hippocrates, & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum authores, ex toto se restituisse memoriæ prodiderunt. Neque tot genera machinamentorum quoque, ad extendendum in hoc casu femur, Hippocrates, Andreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, faber quoque quidam reperissent, si id frustra esset. Sed ut hæc falsa opinio est; sic illud verum: cum ibi valentissimi nervi musculique sint, si suum robur habent, vix admittere, ut reponatur: si non habent, repositum non continere.

Tentandum igitur est, &, si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram à genu intendi: si validius, melius adducent, qui easdem habenas ad valida bacula deligarint; tumque eorum fustium imas partes oppositæ moræ objecerint, superioresque ad se utraque manu traxerint. Etiamnum valentius intenditur membrum super scamnum, cui ab utraque parte axes sunt, ad quos habenæ illæ deligantur: qui, ut in torcularibus, conversi, rumpere quoque, si quis perseveraverit, non solum extendere nervos & musculos possunt. Collocandus autem homo super id scamnum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus, sic, ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsus est; ea etiam inferior,

ferior, à qua recessit. Nervis extensis, si in priorem partem os venit, rotundum aliquid super inguem ponendum; subitoque super id genu adducendum est eodem modo, eademque de causa, qua idem in brachio fit; protinusque, si complicari femur potest, intus est.

In cæteris vero casibus, ubi ossa paululum inter se recesserunt, medicus debet id, quod eminet, retro cogere; minister contra coxam propellere. Reposito osse, nihil novi aliud curatio requirit, quam ut diutius is in lecto detineatur; ne, si motum femur fuerit adhuc laxioribus nervis, rursus erumpat. Potest tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo contineri.

C A P. XXI.

De Genu luxato.^a

GENU vero & in anteriorem, & in interiorem, & in posteriorem partem excidere, notissimum est. In priorem non prolabi, plerique scripserunt. potestque id vero proximum esse; cum ibidem opposita patella, ipsa quoque caput tibiæ contineat. Meges tamen cum, cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse, memoriæ prodidit.

In his casibus intendi nervi rationibus iisdem, quas in femore retuli, possunt. Et id quidem, quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoque eo crure, recondi-

conditur. Cætera vero manibus simul, tum ossa in diversas partes compelluntur.

C A P. XXII.

De Talo luxato.

5

TALUS quidem in omnes partes prolabitur. Ubi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem convertitur. Ubi huic contrarius casus, contrarium etiam signum est. At, si in priorem partem prorumpit, à posteriore latus nervus durus & intentus est; simulque iis pes est. Si in posteriorem, calx pene conditur, planta major fit. Reponitur autem is quoque per manus; prius in diversa pede & crure diductis. Et in hoc quoque casu diutius in lectulo perseverandum est; ne is talus, qui totum corpus sustinet, parum confirmatis nervis, ferendo oneri cedat, rursusque prorumpat. Calceamentis quoque humilioribus primo tempore utendum; ne vinctura talum ipsum lædat.

C A P. XXIII.

De Planta luxata.

25

PLANTARUM vero ossa iisdem modis, quibus in manibus, prodeunt; iisdemque conduntur. Fascia tantummodo calcem quoque debet comprehendere, ne, cum mediam plantam, imumque ejus vinciri necesse est, liber talus in medio relictus, materiam plenioram recipiat, ideoque suppuret.

C A P.

CAP. XXIV.

De Digitis luxatis. a

IN digitis nihil ultra fieri debet, quam
 5 I quod in his, qui sunt in manu, positum
 est. 552. 30.

CAP. XXV. a

De his, quæ cum vulnere loco moventur.

10 HÆc facienda sunt in his casibus, ubi
 sine vulnere ossa exciderunt: sæpe
 tamen cum vulnere loco moventur.
 Hic vero & ingens periculum est, & eo
 gravius, quo majus membrum est, quove
 15 validioribus nervis aut musculis contine-
 tur. Ideoque ab humeris, femoribusque,
 metus mortis est; ac, si reposita ossa sunt, spes
 nulla est: non repositis tamen, nonnullum
 periculum est. Eoque major in utroque ti-
 20 mor est, quo propius vulnus articulo est.
 Nam Hippocrates b nihil tuto reponi posse,
 præter digitos, & plantas, & manus, dixit:
 atque in his quoque diligenter esse agen-
 dum, ne præcipitentur ægri. Quidam bra-
 25 chia quoque & crura repofuerunt: &, ne
 cancri, distentionesque nervorum oriren-
 tur (sub quibus in ejusmodi casu fieri solet
 mors matura) sanguinem ex brachio mise-
 runt. Verum ne digitus quidem (in quo mi-
 30 nimum, ut malum, sic etiam periculum est)
 reponi debet aut in inflammatione, aut
 postea, cum jam vetus res est. Si quoque,
 reposito osse, nervi distenduntur, rursus id
 protinus expellendum est.

Omne

a Æginet. VI, 116. a Æginet. V. 121. b Hipocrat.
 Vætar. XIX, 5.

Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neque repositum est, sic jacere convenit, ut maxime cubantem juvat: tantum ne moveatur, neve dependeat. In omni tali morbo magnum ex longa fame præsidium est: deinde ex curatione eadem, quæ proposita est. Ubi ossibus fractis vulnus accessit, si nudum os eminet, impedimento semper futurum est, ideo, quod excedit, abscindendum est; imponendaque super arida linamenta sunt, & medicamenta non pingua; donec, quæ saltem esse in ejusmodi re sanitas potest, veniat. nam & debilitas sequitur, & tenuis cicatrix inducitur: quæ necesse est facile noxæ postea pateat.

F I N I S.



BRE-

B R E V I O R A

V A R I O R U M A U C T O R U M

In

C E L S I L I B R O S

S C H O L I A.

PAg. 10. l. 22. *Quid optime digeratur*] Legi potest, *sed quam id optime digeratur.* Jo. Cæsarius.

p. 10. 34. *Non eloquentia, sed remediis curari* [Hinc Virgilinus *mutas artes* vocat. XII. *Æneid.* Casaub. Vide Reies Camp. Elys. *jucund.* Quæst. Quæst. VII. pag. 61. & seqq.

p. 11. l. 1. *Discreta*] *Discretus* legit Cæsarius.

p. 11. l. 25. *Nam ne uterum quidem*] Auctor noster uterum sumit pro ventre seu abdomine, ita enim lib. IV. cap. 1. *At sub corde atque pulmone, transversum ex valida membrana septum est, quod à præcordiis uterum diducit.* Martial. l. 3. Epigr. 71. *Isidorus Orig. XI. cap. 1. Uterum sola mulieres habent in quo concipiunt, ad similitudinem cauliculi.* (Martinius *Canaliculi*, forte *cuniculi*.) Tamen autores uterum pro utriusque sexus ventre plerumque ponunt, nec poeta tantummodo sed & ceteri. Doctissimus Casp. Bartholinus *Exercitatione IX.* observat Tacitum, uterum Navis ob cavitatem dixisse; Lactantius de *Opificio Dei* c. 11. *uterum* pro vesica aut simili cavo corpore posuit. Columell. XII. 4. *quod in utero doli est.*

p. 19. l. 22. *Facilius in denso cælo, quam in tenui; facilius hieme, quam æstate*] Quibusdam videtur hic legendum potius, *in tenui cælo, quam in denso: & æstate, quam hieme*, propterea quod Hippocrates dicat lib. I. *Aphor. Ventres hieme & vere sunt calidissimi. Quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda.* Et Paulus Aegineta libro itidem primo cap. 53. *Hieme quidem & fortiori exercitatione, & pleniore cibo utendum est.* Nisi eo referas quod in denso cælo & per hiemem corpora sunt robustiora, atque ideo etiam facilius quamlibet molestiam ferant. Cæsar.

p. 22. l. 17. *Gravibus*] Hic gravis opponitur salubri. *Const.* Sic ipse explicat pag. 24. *neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus satis tutus est.*

p. 25. l. 15. *Os amarum*] Modo biliosus non sit, nam *πικροχόλοις* adversatur inedia, Hippocrat. de Victu Acutor. Galen. Meth. Med. VIII. ergo hic Celsus indistincte. *Constant.*

p. 28. l. 15. *Somnus plenus*] Integer nec abruptus ante justum dormiendi tempus. *Constant.*

p. 36. l. 21. *Qui his opportunus est*] *Opportunus* pro *obnoxius*. Sic p. 42. l. 1. *Corpora periculis opportuna*. 81, 10. *Opportuniores injuria partes*. 194, 17. *Opportuniores nervos frigori reddidit*. 199. 32. *Partes opportuniore virio jam savienti*. *Casaub.*

p. 42. l. 20. *Ex tempestatibus*] *Tempestatas* non est proprie nomen simplex τὸ τῆς ἑτέρας τεταρτομόριον, sed ὥρα, hoc est, ἡ ποιά κατάστασις. *Casaub.*

p. 42. l. 22. *Plana*] Prorsus legendum *plena*, hoc enim & Aphor. 11. 35. ubi πλάτος ἔχειν, &c. & in Prognost. unde & sequentia desumfit. *Constant.*

p. 43. l. 3. *Regionum sorte*] Pro sorte situs & positurae regionum pro climatis varietate. *Constant.*

p. 43. 16. *Corpus habilissimum*] Mediae staturae explicat Brodæus Miscel. l. IV. c. 19.

p. 45. l. 27. *Quam φρενίτιν appellant*] Φρενίτιν tum hic tum alibi apud Celsum non Phrenesis, sed Phrenitis (ut & Hermolaus Barbarus nos admonet) legendum est. Quamvis apud Martialem Juvenalemq; non Phrenitis, sed Phrenesis quoque legant. Idque tamen (ut Barbarus suspicatur) ex vulgari imperitorum consuetudine. Doctiores secundum Despauterium legunt, *Cum furor hand dubius, cum sit manifesta Phrenitis*. Cæsar.

p. 46. l. 26. *Glandula*] Nomen est hic partis, pro ejus morbo atque inflammatione Hippocrat. *πρίσθμια* i. tonsillae ἀντιάδες, pro parte autem l. 4. c. 1. *Constant.*

p. 50. l. 20. *Sub fine*] Sub finem; sic κρίσιν i. e. judicationem videtur appellare. *Constant.*

p. 55. l. 11. *Ad viscera transierunt*] Lumbos & ilia i. χαλόνας vel κενεῶνας ut habet Hippocrates, & pro φρένας vel διάφραγμα, id est, præcordia vel septum, transversum, substituit viscera non mendacio sed innovatione. *Constant.*

p. 56. l. 30. *Diutius trahere*] Sicut dicimus Galli de male sano & affecto, *il traine toujours*, si quis in eo morbo diutius traxit. mox; autumno qui cætera anni parte traxerint, *resolvuntur*. p. 137. *agri sub cautioribus medicis trahebantur*, & 138. *agros Medici diutius tractos non expediverunt*. *Casaub.*

p. 57. l. 5. *Democritus*] Qui περὶ ἀνθρώπων scripserat, ut quibusdam placet. vid. ad *Laert. Casaub.*

p. 57. l. 6. *Certas notas esse, proposuit*] Scaliger ad *Manilium* l. V. pag. 308. putat *Celsum* *Democriti* librum, περὶ ἀνθρώπων, quem *Plinius* *Heraclidæ* adscribit, indigitasse: verum refutat illustrissimum virum *clar. Menagius* in *Observationibus* ad *Diogen. Laert. Proem.* pag. 5. Ed. *Lond.*

p. 57. l. 19. *Responderit*] Respondere *Celfo* est σοχάζεσθαι, vel potius commode cedere, ἐνδοθεῖν, & sic passim. *Casaub.*

p. 58. l. 26. *Terram edunt*] Id est, malacia aut pica laborant.

p. 59. l. 7. *Desidendi*] Sic honeste τὸ οὐχέστιν exprimit. 86, 24. 224, 33. *Casaub.*

p. 59. l. 4. *Et coxis est*] Coxas pro lumbis, illa pro lumborum partibus mollioribus posuit. *Constant.*

p. 62. l. 20. *Lienis tumet*] Lienis pro lien amat dicere *Celsus*. Lienes male habent. 74, 24. & 94, 6. 176, 22. Ita *Cato* de R. R. Cap. 157. Si lienes turgent. *Casaub.*


p. 62. l. 31. *In pectus*] Pectus pro septo transverso posuit. *Constant.*

p. 76. l. 3. *Isque morbus mediocris vix sanatur*] Ita *Hippocrates* Section. II. Aph. 42. in quem latius inquit *Reies Campi Elysi jucundar* *Question. Quæstion. LXXIX.* Vide doctissimum *Librum Justi Cornummi de Morbo Attonito.*

p. 80. l. 1. *Capibus*] Id est, capitis dolore, Aph. V, 68. oculorum, Aph. VI, 31. VII, 46. dysuria, Aph. V, 36. stranguria, Aph. VII, 48.

p. 82. l. 30. *Cucurbitular. vero duo genera sunt: aneum & corneum*] Quam frequens cucurbitarum, ut eas vocare amat *Cælius Aurelianus*, apud veteres fuerit usus norunt ii, qui in antiquis scriptoribus sæpius sese recreant; testis est *Plutarchus* in conviviis, qui dicit propter usum non parum laudis id remedii genus invenisse. Has vero in quovis corporis loco agglutinabant, defigebant, & accommodabant, ut loquitur *Celsus*, vel cum, vel sine ferro, seu scarificatione, quas leves vocat *Cælius Aurelianus* *Acut. Morb. I. Cap. II.* idque mediante aqua calida, ut refert *Albucasis*, vel igne quas idcirco arentes & siccatas nominavit; idem *Cælius Aurelianus* *Acut. Morb. I. cap. II.* Materiam qua constabant duplicem vocat *Celsus*. De corneo autem cucurbitularum

genere vide sis Thom. Bartholinum de unicornu c. XXXII. & pag. 322. & seqq. formam vero describit clar. Smetius *Antiquitatum Neomagens.* pag. 80. hisce verbis: *Cucurbitulae sunt aeneae aut figlinae, aeneae tres, figlinae septem, formae omnes rotundae, fundo plano, tumido ventre, & in superioris orbis acclivis centro os habent rotundum & patens, quod pollicem crassiusculum admittit. Ligula parva angusto foramine isdem pro manubrio est. Cujus è cimeliarchio, ut eo melius forma cucurbitularum appareat, effigiem hic apponi curavimus.*



p. 91. l. 27. *Lecti fulcimentum*] Celsus accipit non pro fulcro lecti, sed pro quovis fulcimento quod pedi lecti, sive clinopodio subjicitur. Scaliger ad Manil. lib. 1. pag. 195.

p. 93. l. 8. *Arena calida*] De remedio calentium arenarum & arundinum Augustus apud Suetonium c. LXXX. & Gellius XIX, VIII. *Casaub.*

p. 95. l. 22. *Utriculi*] Vocantur αἰνοὶ sive φασκοὶ πυρρατοί. *Const.*

p. 97. l. 20. *Infirmissimus, cibarius panis*] Joan. Cajus Tilebomenius in conjecturis ad Petronii fragment. Tragarian. pag. 92. tollit distinctionem, & legendum putat, *infirmissimus cibarius panis.*

p. 97. l. 28. *Sarculorum valentiores*] Ἀκρόδρυα intelligit *Casaub.*

p. 99. l. 16. *Elota quadam genera frumenti*] Eadem occurrunt infra 103, 16. 131, 9. & alibi passim. an hic cibus commune quid habet cum eo, quem vocamus Galli, *orge mondé?* namque non ex oryza solum, sed ex quovis alio etiam frumenti genere paratur. *Casaub.*

p. 99. l. 18. *Aqua madens panis*] Gall. *potage*, *Casaub.* Hunc unum eundemque esse, quem Galenus (lib. I. c. 5. *de Alimentor. Facul.*) lotum, Plinius vero (XXII. c. 25.) panem aquaticum vocat, arbitratur Mercurialis *Variar. Lection. lib. VI. cap. 17.* qui videndus est.

p. 100. l. 4. *Aqua levissima pluviatilis*] Vide sis Brodæi *Miscell. l. IV. c. 38.*

p. 101. l. 25. *Trunculique*] Suspicio verbum *trunculi* corruptum esse hoc loco, & legendum esse *ventriculi*, idque Pselli autoritate, apud quem legitur de ratione vitæ. *Inter ea quæ crudos humores generant hoc modo: Ceterorum animalium partes, ventres, intestina, vulva &c.* Et apud eundem non multo post; inibi, inter ea quæ nutriunt multum, & omnium inquit *volucrum ventres.* Non tamen me fugit esse doctissimum virum, qui priorem lectionem non improbet. Unde idem trunculos opinatur esse edulii genus frustulatim concisis carnibus constans, *Casar.*

p. 102. l. 23. *Petiolis*] Id est, parvis pedibus, a Catone *pedicini* in L. de R. R. appellati. *Const.*

p. 105. l. 28. *Lactentia*] Leg. *lactaria* & in hac & in sequenti proxime pagina. In historiis sæpe *lactarios* invenias & *dulciarios.* *Casaub.*

p. 110. l. 16. *Git.*] Μελάγδιον. sic & 233, 24. *Casaub.* Ita etiam explicat Marcellus de Medicam. C. XXII. pag. 341.

p. 118. l. 22. *Ego autem*] Notandum hic, isthæc à Celso dici non tanquam ἰατρίῳ, sed potius tanquam Medico artis suæ bene gnaro ac sententiam super illis, quæ in controversiam venire, ferenti. Eandem elocutionem etiam infra videas 143, 24. 176, 1. Casaub.

p. 131. l. 8. *Intrita ex aqua calida*] *Ex vino*, infra 153, 13. Et est quidem elegans usus hujus voculæ *ex*, pro συν, vel ἐν, apud Celsum & Plinium. Noster 344, 19. *emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum*, h. e. cum. mox, *terra ex aceto subacta*, h. e. in. sic & 361, 3. *Ex aceto tenent*. Vid. Victor. Var. Lect. xxxii, iv. Casaub.

p. 132. l. 22. *Potio esse debet magis liberalis*] *Liberalis* pro copiosus & multus vox Celso peculiaris. Casaub.

p. 138. l. 25. *Duo pitacia*] Hic pittacium non pro panniculo sed corio medicamento illito, capiti aut præcordiis applicando positum rectissime observat Bynæus de Calc. Hebræor. l. 1. c. 2. ubi de pittacio multa.

143. l. 12. *Altero quoque die*] Idem est ac si *tertio quoque die* diceret. 124, 21. *cibus tertio quoque die commodissime datur*, ut alter febrem minuat, alter viribus subveniat. Casaub.

p. 148. l. 23. *Logia aliena*] Expressio hæc est ab Hippocrate qui ἁλλοφάσσειν ait τὰς παραφρονέοντας. Casaub.

p. 151. l. 7. *Caput impleatur*] Implere caput, hic pro fovere, rigare, ἐμβρίχειν. sic lib. iv. c. 2. Constant.

p. 181. l. 21. *Ut ab egelidis tamen initium fiat*] Ex hoc facile colligitur, falli eos, qui egelidam pro frigido usurpant, est enim χλιαρός Casaub.

p. 182. l. 27. *Stomachus interior ad ventriculum fertur*] *Stomachus* Celso ipsa gula, per quam transeunt alimenta priusquam ad ventriculum veniant, qui vulgo *stomachus* appellatur. Medici vocant œsophagum. Casaub. Laetant. de Opificio Dei c. xi. *fistulam cibalem* vocat.

p. 182. l. 27. *Alt. stomachum*] *Stomachus* hic pro ipsa gula accipitur ut & infra l. iv. c. 5. quamvis aliquando & pro ventriculi parte inferiore stomachi utatur Celsus, ut cum ait: *Stomachus vero intestineram præcipuum est*. Constant.

p. 195. l. 24. *e pullis*] Alii a pullis sed quidam libri scripti habent *apalis*: ut noster etiam quidam, satis antiquus & fidelis, qui servatur in Medicea Bibliotheca.

Cum autem videatur alterum horum, id est aut *apalis*, aut *mollibus* scholion esse, verisimilius est Græcum ἀπαλός, declarationem fuisse latinæ vocis *mollibus*, quæ sequitur; quis enim unquam crederet Romanum scriptorem, & eum quidem purum atque elegantem in media oratione sua Græcam vocem usurpasse, &c. *Victorius Variar. Lect. l. xxix. c. 3.* Scribonius Largus Composit. Medic. N. CIV. hac voce utitur: *secundum quæ apala ova proderunt.* Ad quem locum multa congeffit doct. J. Rhodius, qui apud Celsum *hapalis* restituendum putat. Cæl. Aurelian. Acut. Morb. I, 10. Marcell. de Medic. Cap. XX.

p. 201. l. 6. *Pituitam citat*] Hoc est, movet, 211, 5. vel trahit ut 211, 33. loquitur. admodum familiare hoc verbum Celso. 1210, 7. *humorem citare.* 297, 6. *pus citare.* 450, 16. *sanguinem citare.* & alibi plurimis locis. *Casaub. dentem citat*, 383, 8.

p. 202. l. 8. *Aliis vero vinum*] Columella de Re Rustica, lib xii. cap. 32. commendat ex marrubio; cap. 33. vinum scylliten.

p. 202. l. 12. *Ex gingivis*] Hoc mihi sæpe evenit. *Casaub.* Jacobo Usserio hæc hæmorrhagia erat periodica, teste Arnaldo Bootio Observ. cap. 7.

p. 207. l. 31. *Sumbruinarumque*] *Subcutiliarumque* mihi legendum videtur. Nam cujusmodi sint *Sumbruinæ aquæ*, nondum apud quenquam reperi scriptorem idoneum & probatum: de *Subcutiliis* vero *Plinius* l. 31. c. 2. quas in *Salinis calidissimas* esse dicit, & *suctu quodam corpora invadere, aptissimas stomacho, nervis, universo corpori.* Idem & de *Cutiliis* l. 2. c. 97. & l. 31. c. 6. quas inibi *bituminatis*, aut *nitrosis bibendo utiles* esse, atque *purgationibus* tradit. De *Cutiliis* item *Vitruvius* l. 8. c. 3. ubi scilicet de aquæductibus tractat. *Cæsar.* Adde hic quæ habet *Lilius Gyraldus* Dialogismo X. pag. 424. Tom. 2. Facis Critic.

p. 207. l. 30. *Cutiliarum Sumbruinarumque*] Male quidam *Succutiliarum.* Ald. Manut. de Quæst. per Epist. Q. I. Consule de lacu *Cutiliensi* *Merulam* *Cosmogr. Part. 11. lib. iv. Cap. xii.*

p. 213. l. 13. *Trunculorum*] *Ventriculorum* vel *tyrunculorum.* Cæsar.

p. 215. l. 12. *Venterque intentus est*] Ita *cappadox* apud *Plautum* in *Curcul. II, 1.*

Nam jam quasi zona liene cinctus ambulo.

Geminos in ventre habere videor filios.

Nihil metuo, nisi ne medius disrumpar miser.

p. 215. l. 17. *Exercitatione & labore*] Hoc remedium Palinurus præscribit Cappadoci (Curcul. II, 1.) ambula, id lieni optimum est.

p. 224. l. 18. *Frequens dejiciendi cupiditas*] Galen. *ποδυμνα τὰ ἀπορριπτιν.* Casaub.

p. 235. l. 18. *Nuclei pini*] Omne medium nucleus erat veteribus. Celsus, quem dixi, aliquoties similiter frequentaverat: at hodie trunculi reperies corrupte: *Internuculi* vero sive *nuclei* germanum esse, meliorum aliquando codicum opera monstasse sperabo, Pontan. ad. *Macrob. Saturn.* II, 14.

p. 235. l. 23. *Vitare autem oportet rutam, &c.*] Duo hic præcipit extrema cavenda Celsus, primum ne nimium exstinguentibus semen utatur medicamentis, inter quæ refertur ruta; dein ne supinus dormiat, qui situs feminis fluxum augere solet. Ettmüller de feminis retentione læsa. An autem ruta, mentha & aliæ plantæ calidæ venerem adtingeant, hebetent, atque extinguere valeant jucundissime inquit Gaspar. a Reies, Quæst. XLIV. Camp. Elys. Jucund. Quæst. pag. 309.

p. 241. l. 17. *Herophilus, deductique ab eo viri*] Convenit cum Græca loquendi ratione καὶ οἱ ἀπ' αὐτῶν, Casaub.

p. 244. l. 32. *Sapius fascia circuire debet*] Galli dicimus: *faire plusieurs tours.* p. 533. l. 8. Casaub.

p. 246. l. 31. *Sordes ex gymnasio*] Γλοῖον intelligit. Casaub.

p. 249. l. 3. *In uncia pondus &c.*] Multi sunt qui de ponderibus & mensuris medicis scripsere, quorum indiculus exstat apud Merklinum in Lindano Renovato. Omnium tamen, si Celsum spectamus, optimus est Joan. Rhodius, cujus dissertationem de ponderibus & mensuris veterum Medicorum, imprimis Corn. Celsi, edidit Th. Bartholinus Hafniæ 1672. quam huic nostræ editioni subungere ipsa vetat crassities. Ad pleniorē vero ponderum notarum in Celso occurrentium notitiam J. Manardi epistolam, quæ est IV. lib. XVII. adjicere consultum duximus.

J. MANARDUS,

J. PAULO CASTILIONO

S. D.

„ Alexandrum Capelinum, licet antea magna mihi
 „ familiaritate conjunctum, tuâ etiam causa benignif-
 „ sime excepi, quantumque pro tempore valui, salutem
 „ hominis consului: vix enim duobus diebus apud nos
 „ fuit. Ex eo poteris de mea valetudine intelligere. De
 „ Celsi vero characteribus quid sentiam, breviter sub-
 „ scribam. p. pondo intelligo. X vel * denarium, sep-
 „ timam videlicet (ut ipsemet seipsum declarat) unciam
 „ partem. Per notas quæ sequuntur, denariorum nume-
 „ rum accipio. Atque ut hæc exemplis reddantur cla-
 „ riora, ubi in primo malagmate lib. v. legitur, *Æru-*
 „ *ginis rasæ & thuris singulorum p. xii.* intelligo accipien-
 „ dos singulorum, æruginis scilicet, & thuris binos de-
 „ narios. Cerae vero & squammæ viii. subdit enim
 „ xviii. sicubi vero in antiquioribus exemplaribus,
 „ jam diu videlicet excusis, scribuntur duo χ. ut in ma-
 „ lagmate sequente ad jecur dolens, per primum intelligo
 „ pondus denarii: per secundum, denariorum numerum,
 „ ut accipiamus *lachrymæ balsami denarios duos & viginti,*
 „ *& costî cum reliquis, quæ sequuntur, sexdecim.* Simili
 „ modo in Andreae malagmate ubi scribitur p. xxx. in-
 „ telligendum pondus viginti denariorum. Idem in simi-
 „ libus intelligendum, ita tamen, ut sciamus per p. non
 „ semper simpliciter pondus accipiendum, sed interpre-
 „ tandum pondo, hoc est, libram: ut in Mosci malag-
 „ mate, ubi scribitur p. ii. ego duas libras intelligo: nisi
 „ forte in exemplari nota desit denarii, ut scilicet sit le-
 „ gendum p. xii. tunc enim duos denarios intelligeremus.
 „ Ubi vero p. iz. octavam partem libræ: vel si χ desit,
 „ octavam partem denarii: & pro triente, tertiam libræ
 „ partem. Legitur & quandoque apud eundem Celsum

p. sextantem, ubi ego intelligo sextam libræ partem,
 „ binas videlicet uncias: sicut & per bessem, octo uncias.
 „ Hæc habui, alioqui in profitendi munere occupatus:
 „ quæ de ponderibus Celsi scriberem. Si quid vero adhuc
 „ in his desideraveris mihi per literas significato. Vale. Ex
 „ Ferraria, x i i. Kalend. Decemb. M. D. XXXIII.

Ad cætera vero quæ in Celfo occurrunt intelligenda faciunt Sorani Ephesii verba quæ subjungere idcirco voluimus Cap. x x i i i. & Præfatio Plinii de Re Medica.

p. 250. l. 7. *Ant cerato*] Leg. ut *cerato*, sic enim sæpe emplastra ceratis emolliuntur ut 517, 24. nec emplastra, sed & aliud, ut *cervicem liquido cerato molliri* dicit, p. 520, 12. *Casaub.*

p. 253. l. 29. *Sub anthore Medo*] Forte legendum *Medio*; Plinius enim N. H. cap. iv. lib. xx. Medium quendam præducit. Galenus adversus Erasistratæos cap. 2. (pag. 409. Tom. x. Ed. Chart.) Medium quoque citat, quo tamen loco legendum *Mndias* putat Menagius ad Diogen. Laertium pag. 129. B. qui, an idem sint, an diversi hætenus expositum non est. nos nihil certi statuere possumus, expectantes avide Medicorum historiam à viris clarissimis Menagio & Meibomio pollicitam, qui nodum hunc forte sint soluturi.

p. 260. l. 22. *Choacon emplastrum*] Legendum fortassis *chiacum*, ut apud Georgium Vallam de cura oculi; nisi malis *Coacon*, quod inter Hippocratis opera liber habeatur, qui inscribitur de *Coacis prænotionibus*, unde nomen deductum videri potest. *Cæsar.*

p. 280. l. 19. *Athenionis*] de *Athenione* quodam, sed non Medico (reor) habes in vita Maximini patris & filii apud *Julium Capitolinum*. *Cæsar.*

p. 286. l. 26. *pars per naturam*] Eleganter non minus quam honeste genitales partes naturam vocavit. Sic etiam Cicero de Divination. l. ii. c. 70. *Parere quadam matrona cupiens, dubitans, essetne prægnans, visa est in quiete obsignatam habere naturam.* Sæpius Plinius alique. Hippocrates vero ea significatione usus est verbo φύσις. Hesychius Φύσεις, πυραι ἐπὶ ἐδάφους ἀνδρακίαι, καὶ αἱ τῶν γυναικῶν φύσεις ἐξώσπαι τετραγῶνα. Hieron. epist. 61. *Pars corporis nostri secretior φύσις, a nobis natura dicitur.* Usurpaturque hæc vox tam de muliebribus quam virilibus partibus uti in commentario ad Carm. x x x v i i i. Priap. videre est.

p. 296. l. 22. *Ex aqua frigida*] Videtur ex hoc loco sibi contradicere auctor, siquidem l. 111. c. 9. dixit frigida inimica vulnere, uti etiam docet Hippocrates Aph. v. 20. Quin mox præcipit ipse saniem aqua calida removendam, quoniam calor naturæ prodest. Sed scitissime Celsus aquam frigidam commendat, quia sanguinis timenda in vulneribus fluxio est, transfuditque hunc locum ex Hippocr. libr. de humid. usu T. xi, 27. τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ κτείνον, πλὴν ὁ κόσος αἰμορραγέειν ἐλπὶς. Celsus pag. 293. *Levis plaga juvatur etiam, si ex aqua frigida expressa sponsa imponitur.* Confirmat hoc experimentum quod refert. Doct. Caspar. Bartholinus *Exercitatione VII.* pag. 129. Panarol. Pentec. v. Obs. 27.

p. 305. l. 22. *In filice*] Vera lectio: *in filicis hastula.* De filice impacta corpori & arundine eadem habet Marcellus de Medicam. cap. xxxiv. & Plinius xxiv, xi. Casaub.

p. 309. l. 21. *Psylli*] Bochart. Hieroz. T. 2. l. 4. c. 19. p. 587.

p. 309. l. 21. *Psylli*] Miramur vulgo cum legimus, esse, qui venenatas bestias, & serpentes tuto tractent, & eorum venenum adimant. Desinet mirari qui Celsi hæc legerit. Sed & Dio quoque *Psyllis* aliud nihil tribuit, quam τὸ ἐκμυξάν. Hodie similis gens vagatur per Italiam, quæ a D. Paulo originem generis stulte refert. Casaub. De *Psyllis* vide Turneb. Advers. xvi. 6. Ettmuller. ad Schroder. p. 184.

p. 311. l. 3. *Spumet.*] Spumare hic est ζυμῶσθαι, id est fermentari, Galen. de Atra bile. Constant.

p. 313. l. 7. *Cum incubant*] Bochart. Hieroz. Tom. 11. l. 3. cap. xi. pag. 415.

p. 319. l. 16. *Cano simile*] Constans hæc fere lectio est. Ronsseus in marg. habet ovo vel cavo. Ego hæctenus, quamvis locum sanum non putem, nihil muto. Vir quidam doctus margini editionis Cæsarianæ hanc transpositionem inscripsit. *Id ulcus inæquale est, inestque multus humor glutinosus, cano similis, odor, &c.*

p. 322. l. 19. *Chironium*] Χειρώνιον ἔλεγον, quidam ita dictum putant, quod Chirone Medico indigeat. Idem & τηλεφίον dicitur à Telepho, qui huic vitio obnoxius fuit. Casar.

p. 323. l. 5. *Ex frigore hiberno ulcera*] hoc genus ulceris Græcis χίμετλον dicitur. Hefychius χίμετλον, inquit, τὸ ἐν χειμῶνι γινόμενον ἔλκος ὑπὸ ψύχσει. Latinis autem Pernio dicitur. Casar.

p. 335. l. 2. *Exigunt*] Editio 1497, Aldina 1528. hanc servant lectionem, alii tamen è codicibus malunt *adigunt*, alii *ambunt*, minus, ut puto, recte, neque enim *radices exigere*, aut *adigere*, aut *ambire*, apud antiquos legitur, quapropter *substituo* vel *agunt*, vel *exserunt*, ita enim Columella l. II. c. 10. de nasis *quia non in ventrem lateſcunt, ſed tenuem radicem deorſum agunt, & V. 6. ac ne radices altius agunt, alibi exſerere radicem dixit.*

p. 336. l. 21. Φλυζάκιον] Galenus Commentario IV. in Hippocrat. de Vi&ct. Ration. in morb. acut. ait φλυζάκιον ſignificare φλυκταίνην, unum idemque eſſe puſtularum genus, Celfus tamen diſtinguere in duo genera videtur.

p. 338. l. 33 *Sicut de pecoribus propoſui*] Nullus dubito quin Auctor indigitat libros ſuos de *Re Ruſtica* quorum paſſim meminit Columella. An ad eos referri poſſit quod dicat lib. IV. c. 7. *Attamen ſine his ruſticos noſtros epota ex aqua trixago ſatis adjuvare dicitur*, judicent docti.

p. 340. l. 3. *Sub authore Protarcho*] Ita infra 402, 17. *ſub authore Dionyſio*. Caſaub.

p. 344. l. 8. *Ulcus durum*] Bochart. Hieroz. part. II. l. 6. cap. 6. pag. 827.

p. 348. l. 3. *Vetumque eſt*] Eleganter hoc poſitum pro eo, quod Græci dicebant ἀγαπητόν ἂν εἴη. Caſaub.

p. 350. l. 12. *Lana mollis bene carpta*] Cum *lanam carpere* dicatur de muliere nente ξαινέσθῃ, non videtur hæc interpretatio huic Celfi loco convenire, qui de *lana* potius *carminata* eſt intelligendus. Equidem Latine dicimus, *lanam carpere*; ſed an *carptam lanam* itidem dixerint Veteres accuratori indagatione indiget. Caſaub.

p. 386. l. 29. *Rhus quem Syriacum vocant*] Vide ſis de hac herba, Plinium lib. XXIV. cap. XI. Manardi Epistolam IV. lib. I. qua contendit voce Græca *rhus* ſcribendum eſſe. Rhodium in Lexico Scriboniano & Bodæum a Stapel in Theophraſti lib. III. cap. XVIII. Hiſtor. Plantar.

p. 403. l. 28. Πτερύγιον Græci appellant] *Reduviam* vel *rediviam* vocant Latini. Caſaub.

p. 411. l. 15. *Fortuna hinc illucve discernit*] *Lege decernit.*
Cafaub.

p. 422. l. 29. *Χαλὰζια*] Bochart. Hieroz. Part. II. l. 5.
c. 9. pag 721.

p. 424. l. 7. *Ρυάδα Græci vocant*] *Rhyada* non *Rhypada*,
ut hactenus, legendum est, idque partim ratione vocabuli
ad rei significationem alludentis, respondentisque, partim
quod huic lectioni *Symon Genuensis* adstipulari videtur;
ex sententia *Demosthenis* cujusdam, quem crebro ille citat,
cujus & hæc verba citat, quibus *rhyada* ille ita descri-
bit: *Rhyas*, inquit, est *continuus lachrymæ fluor*. Quam-
quam dicat idem author, qualis qualis est, apud Celsum
rhypada legi. Quin & huic sententiæ meæ adstipulari vi-
detur *Hermolaus Barbarus* in suis *Corollaris*. Quid quod
& apud ipsum *Galenum* l. 14. *θεραπευτικῆς* legitur, ubi
de oculorum vitiis agit, *ρυάδες*que appellat, de quo hic
differit *Celsus*, oculorum vitium. *Casar*.


p. 455. l. 34. Quæ *ἐλευτροειδής*] Nicolaus Loënsis cum
quibusdam codicibus *ἐρυθροειδής* legendum esse putat, *Mis-*
cellan. l. 9. c. 7.

p. 473. l. 6. *Infibulare quoque adolescentulo*] Fibula hæc
simile aliquid habet iis, quæ vocamus *Cadenats*. Mira
sunt, quæ super his narrantur de Monachis Turcarum.
Cafaub.

p. 477. l. 27. *Plaga lunata*] Vide sis Th. Bartholinum
de Unicornu cap. XXIII. pag. 194.

p. 483. l. 3. *Hapsus lanæ mollis*] *Hapsus* est lanæ parti-
cula molliter in globulum formata. *Floccum* dicit *Plin.* 30.
15. reperitur prætea hæc vox etiam apud *Caprum de verbis*
dubis, & in *Glossario Isidori*, ubi tamen *hapsum* ἀντὶ τῆς hap-
sus scribendum esse docetur, ipsaque vox per *vellus lanæ*
explicatur. *Cafaub.*

p. 483. l. 3. *Hapsus lanæ mollis*] *Hapsus* non est *πίλημα*
(lanas coactas Latini dicunt & coactilia) inepte enim
dixisset *hapsum lanæ mollis*. quod coactum molle non
est, sed durum. Est vero *hapsus* (παρὰ τὸ ἀπλομαί ἄφομαι)
quantum lanæ uno runcinarum contactu & factu carmi-
natores discriminarunt. Vulgo vocant *paumées à palma*.
Ergo lanæ *δράκκα* & quantum vola capere possit per hap-
sum



sum intelligo. usus est etiam ea voce lib. IV. Cap. VI. *Constant.*

p. 488. l. 27. *Quod earum naturalia, &c.* [Ἀπὸ τῆς νο-
cari quos Latini *imperforatos* dicunt, unicuique notum est;
at amplissimus Gisb. Cuperus in Harpocrate pag. 28, 29.
novissimæ editionis, *Harpocratianos*, ejusmodi homines
vocatos fuisse eleganter ex Ptolomæo demonstrat, quem
locum etiam interpretatur Rutgerius Variar. Lection.
lib. III. c. XVIII. quo quid *concreti, confertum virginal, ob-*
signata natura, sint, exponit. de Atretis & imperforatis
consule Schenkium Observation. l. IV. pag. 529. & seqq.
ubi varia exempla recensentur; Patinum Epistol. Gallicar.
No. 60. edit. tertiæ.

p. 489. l. 7. *Vel vulsella*] *vulsella* quæ & *vulsella* dicitur,
instrumentum fuit veteribus usitatissimum, quo non modo
partes tenebant aut emplastra, & officula ex vulneribus
extrahebant, sed virgines quin & viri molliores illius ope
pilos, tam è barba quam supercilio evelebant; unde *acum*
obliquam apud Juvenal. Sat. II. v. 94. *vulsellam* interpre-
tatur Ptolom. Flavius Conjectaneor. c. 67. vide Mercerum
ad Tertullian. de Pallio pag. 768. Græcis vocatur in Phi-
loxeni Glossario *Τεχνολογίον, μαδισήριον*. harum varias
figuras in tyronum gratiam adpingi curavimus.

p. 491. l. 3. *Demitti debet uncus*] Mortui fœtus extractio-
nem, uti & instrumenta, quibus veteres medici usi sunt,
describit Tertullianus; cujus verba libro de anima cap.
XXV. hæc sunt. *At quin & in ipso adhuc utero infans*
trucidatur, necessaria crudelitate, quum in exitu obliquatus
denegat partum, matricida, ni moriturus. Itaque & inter ar-
ma medicorum & organum est, quo prius patefcere secreta co-
guntur, tortili temperamento, cum annulo cultrato, quo intus
membra caduntur anxio arbitrio, cum hebetè unco, quo totum
facinus extrahitur violento puerperio. Est etiam aneum spicu-
lum, quo jugulatio ipsa dirigatur, cæco latrocinio, ἐμβρυοσφάκτεν,
appellant, de infanticidii officio utique viventis infantis perem-
ptorium.

p. 503. l. 24. *Scoptula operta*] Lego: *lata scapularum ossa*
526, 61. 542, 35. 548, 22. Vid. p. 506, 23. & 171, 5.
ubi diserte dicit ὀμοπλάτας Græcorum Latine dici *ossa*
scapularum. quare ista lectio procul dubio mendosa est,
cum nunquam alibi hæc vox reperiatur, *Casaub.*

574 VARIOR. AUCTOR. IN &c.

p. 515. l. 1. *Hippocrates memoria tradidit*] Locusest L.V. *Epidem.* Sed eum librum non esse genuinum Hippocratis fœtum existimant eruditi. *Casaub.*

p. 515. l. 5. *Levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt*] Vid. *Plutarchus* lib. πῶς ἂν τις αἰσδοίτο ἑαυτοῦ προκόπτειν ἐπ' ἀρετῇ. & *Quintil. Inst. Orat. L. M.C. III.* *Casaub.*

p. 533. l. 24. *Alienatur*] ita infra p. 539, 7. *quanto facilius & alienari & occupari cancro vulnus potest.* *Casaub.*

p. 545. l. 33. *Scorteo pulvino*] *Pulvinum scorteam* vocat Criticus προσκεφάλαιον σκύτινον ἢ δερμάτινον, id est, coriaceum. *Constant.*



INDEX

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| quibus non. | 298 | tem perducitur. | 772 |
| Anthonius Alexandrinus. | 406 | Aqua inter cutem sequitur sup- | |
| Anthonius λιθοτόμος. | 481 | pression. hemorrhoid. | 286 |
| Α'νατομήν. | 243 | Aqua minime terribilis. | 688 |
| Α'νατομώσεις. | 203 | Aquilo quos facit morbos. | 444 |
| Α'νατομωτικά malagmata. | 257 | Arabs medicus. | 254 |
| Anatome necessaria. | 20 | Α'ραχνοειδής oculi tunica. | 4322 |
| Α'γκύλαι. | 257 | Aranei ictus curatio. | 3111 |
| Α'γκυλοελεφάρε curatio. | 425 | Archagathus. | 2677 |
| Andreas. | 241. 252. 254. 554 | Aræarum duo genera. | 3444 |
| Andron. | 269. 395 | Curatio. | 3485 |
| Andronium medicamentum. | 389 | Aride medicamentorum mistu- | |
| Angina. 196. curatio. ibid. | | ra. | 2711 |
| Anginâ subito finitâ ad pulmo- | | Aristogenes. | 2577 |
| nes malum transit. | 64 | Ariston. | 2588 |
| Ani vitia. | 399 | Ars non statim culpanda. | 577 |
| Ani vitiorum Cheirurgia. | 493 | Α'ρσενικόν auripigmentum. | 2433 |
| Ani fissis pastillus. | 269 | Arteria. | 2811 |
| Ani fistula. | 414 | Arteriæ asperæ situs. | 182. 1833 |
| Α'νώδυνα. | 278 | Arteria incisa non coit. | 811 |
| Α'νδρῶν compositiones. | 385. | Artes excitant artificis inge- | |
| 388. 389. 390. 395 | | nium. | 133 |
| Α'ντιδῶς. | 445 | Articulorum dolores. | 2377 |
| Antidotorum apparatus. | 274 | Articulorum vulneratorum cura- | |
| Α'φθαι. | 386 | ratio. | 2977 |
| Apollonius Mus. | 241 | ad Articulos malagma. | 2577 |
| Apollonii duo. | 406 | 258. 259. | |
| Apollophanes. | 252 | Asclepiades. | 143. 149. 1500. |
| Apoplexia. | 177 | 152. 163. 175. 194. 2000. | |
| Α'πυρον sulphur. | 254 | 204. 230. 241. | |
| Aquæ consideratio. | 100 | Asclepiades invenit frictionem | |
| Aqua frigida prodest capiti. | 35 | & gestationem. | 877 |
| Aqua frigida distillatione, | | Asclepiades nihil præcepit | |
| gravedine, stomacho labo- | | quod ab Hippocrate non est | |
| rantibus prodest. | 36. 39 | comprehensum. | 888 |
| Aqua frigida sanguini suppri- | | Aspidum morsus. | 3100 |
| mendo. | 397 | Α'σπίς. | 1988 |
| Aqua inter cutem ex acuto | | Athenien. | 2800 |
| morbo orta, raro ad sanita- | | Α'δρῶματα. | 4200 |
| | | Α'τροφία. 167. Curatio. | 1688 |
| | | Atro- | |

RERUM & VERBORUM.

| | |
|--|-------|
| <i>Atrophia testiculorum.</i> | 399 |
| <i>Attalum emplastrum.</i> | 262 |
| <i>Auditorii meatus compressionis curatio.</i> | 375 |
| <i>Auditus gravis curatio.</i> | ibid. |
| <i>Aurium foramina & sinus.</i> | 500 |
| <i>Auribus fractis medendi modus.</i> | 523 |
| <i>Aurium doloris curatio.</i> | 370 |
| | 371 |
| <i>Aurium mali odoris curatio.</i> | 372 |
| <i>Aurium ulceris sordidi curatio.</i> | 374 |
| | 375 |
| <i>Aurium foratus curatio.</i> | 376. |
| | 377 |
| <i>Aurium morbi manum exigentes.</i> | 438 |
| <i>Auster quos morbos inducat.</i> | 44 |
| | 44 |
| <i>Austri à prima hieme ad ultimum ver si continuarint, quos generent.</i> | 45 |
| <i>Αὐτόπυρον.</i> | 97 |
| <i>Autoribus antiquis sua reddenda.</i> | 88 |
| <i>Autumnus periculosissimus est.</i> | 42 |
| | 42 |
| <i>Autumnus siccus Aquilonibus perflatus quos morbos inducat.</i> | 46 |
| <i>Auxilium quid agat.</i> | 77 |
| <i>Auxilium anceps melius quam nullum.</i> | 79 |
| <i>Auxilium vehemens succurrit vehementi malo.</i> | 84 |
| <i>Auxilium etiam morbis decrescentibus necessarium est.</i> | 89 |

B.

| | |
|--|------|
| B <i>Alneum quando conveniat.</i> | 93 |
| <i>Balneum ingressurus imbecillus homo quid vitare debeat.</i> | 94 |
| <i>Balneum vulnere parum puro res infestissima.</i> | 298 |
| <i>Balneum obest gangrena.</i> | 304 |
| <i>Barbarum emplastrum.</i> | 260 |
| <i>Βασικὸν emplastrum.</i> | 260 |
| <i>Bacula valida.</i> | 554 |
| <i>Boëthius.</i> | 270 |
| <i>Brachii ossa.</i> | 504 |
| <i>Brachii perfracti medicina.</i> | 531. |
| | 536 |
| <i>Βρογχοκήλη ejusque Cheirurgia.</i> | 447 |
| <i>Βρῆνοκήλη.</i> | 459. |
| <i>Curatio.</i> | 471 |

C.

| | |
|---|-------|
| K <i>Αχῆζία.</i> | 167. |
| | 169 |
| <i>Κακόνδεσ.</i> | 317. |
| <i>Calceamenta humiliora talo luxato.</i> | 556 |
| <i>Calcis os.</i> | 507 |
| <i>Calculosi qui dignoscantur.</i> | 61 |
| <i>Calculorum diagnostica signa.</i> | 480 |
| <i>Calculi ex vesica sectio.</i> | 475 |
| <i>ex urethra.</i> | 474 |
| <i>Calculi majoris in vesica fissio.</i> | 481 |
| <i>Calculorum in fœminis curatio.</i> | ibid. |
| <i>Calculo expellendo pastillus.</i> | 269 |
| <i>Calculo evulso quæ facienda.</i> | 482 |
| | 00 |
| | Calc. |

I N D E X

| | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Calefacientia.</i> | 105. 110 | <i>Carcinomatis leniendis mala-</i> | |
| <i>Calli curatio.</i> | 542 | <i>gma.</i> | 256 |
| <i>ad Callum in articulis mala-</i> | | <i>Cardiacus morbus</i> | 156. <i>ejus</i> |
| <i>gma.</i> | 259 | <i>curatio.</i> | 157 |
| <i>Calor adjuvat quæ frigus in-</i> | | <i>Cariæ ossium curatio.</i> | 508 |
| <i>festat.</i> | 39 | <i>Caro corrupta in pus vertitur</i> | |
| <i>Calor quid efficiat.</i> | 40. 44 | | 325 |
| <i>Calvaria ossa & sutura.</i> | 498 | <i>Carni putri continenda.</i> | 272 |
| <i>Calvaria fracta medela.</i> | 514 | <i>Carni coercenda emplastrum.</i> | |
| <i>Cancer qui oriatur.</i> | 300. <i>Ejus</i> | | 265 |
| <i>signa.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Carnem alentia.</i> | 247 |
| <i>Cancro oris curatio.</i> | 390 | <i>Καρὸς nervi.</i> | 502 |
| <i>Cancro in cole curatio.</i> | 396 | <i>Carni supercrescenti exedenda.</i> | |
| <i>Cancro exsectio è vesica calculo</i> | | | 271. 273 |
| <i>supervenientis signa & cu-</i> | | <i>Cartilagine in ossium omnium</i> | |
| <i>ratio.</i> | 485 | <i>extremis.</i> | 505 |
| <i>Canini dentes.</i> | 501 | <i>Cartilaginis narium fractæ cu-</i> | |
| <i>Cantharidum assumptarum cu-</i> | | <i>ratio.</i> | 522. <i>aurium.</i> 523 |
| <i>ratio.</i> | 313 | <i>Cassius qui febrem sanat.</i> | 18 |
| <i>Capillorum profluvium.</i> | 342 | <i>Cassius.</i> | 223. 281 |
| <i>Caput luxatum inmedicabile.</i> | | <i>Cataplasmata calefacientia,</i> | |
| | 546 | <i>iis, quibus calculi è vesica</i> | |
| <i>Capitis subitus dolor.</i> | 72 | <i>exsecti, noxia.</i> | 483 |
| <i>Capitis dolores ex vento qui</i> | | <i>Catapotiomm recensio.</i> | 278 |
| <i>finiantur.</i> | 70 | <i>Causa veri quæ dicitur.</i> | 16 |
| <i>Capitis doloris curatio.</i> | 188 | <i>Causæ abdite quæ.</i> | 4 |
| <i>Capitis dolor ex febre levatur.</i> | | <i>Causæ evidentes quæ.</i> | 5 |
| | 138 | <i>Κεφαλαία.</i> | 186. <i>Ejus causa</i> |
| <i>Capitis dolores frictio levat.</i> | 89 | <i>& curatio.</i> | 187 |
| <i>Capitis tubercula.</i> | 420 | <i>Κεφαλινά.</i> | 261 |
| <i>Capiti fracto emplastrum.</i> | 261. | <i>Cerasti ictus curatio.</i> | 311. 312 |
| | 263 | <i>Κερατοειδὲς oculi tunica.</i> | 432 |
| <i>Capiti prodest aqua frigida.</i> | | <i>Κερκίς.</i> | 504 |
| | 35. 36 | <i>Cerebri ejusve membrana per-</i> | |
| <i>Capite infirmo laboranti quid</i> | | <i>cuisse signa.</i> | 286 |
| <i>agendum.</i> | 34. 35 | <i>Κηρίον ulcus.</i> | 333. <i>Ejus dua</i> |
| <i>Carbunculi curatio.</i> | 315. 316 | <i>species. ibid. Curatio. ibid.</i> | |
| <i>Carbunculi in cole nati curatio.</i> | | <i>Cervix inversa mortem indi-</i> | |
| | 398 | <i>cat.</i> | 55 |
| <i>Καρυνοειδῆ tubera.</i> | 255 | <i>Cervicis morbi.</i> | 193 |
| <i>Carcinoma ubi proveniat.</i> | 317 | <i>Cernisse opota curatio.</i> | 314 |
| <i>curatio.</i> | 317 | <i>Κα-</i> | |

RERUM & VERBORUM.

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Χαλαζίων curatio. | 422 | Et quibus. | 85. 86 |
| Χάλανθρον. | 242 | Κοιλιακὸς morbus. | 220. Ca- |
| Χιασμὸς. | 489. 516 | ratio. | ibid. |
| Chiragra quibus indicatur. | 59 | Cælum pessimum quod agrum | |
| Chiragra quæ solvitur. | 68 | fecit. | 43 |
| Chironium ulcus quale. | 322 | Cogitatio infirmo capite labo- | |
| Chirurgia vetustissima medici- | | ranti tuta non est. | 35 |
| ne pars. | 2 | Κολικὸς morbus. | 221 |
| Cheirurgiæ præstantia ac origo. | | Colicus dolor quibus sedatur. | |
| | 405 | | 37 |
| Cheirurgi officia. | 406 | Κολικὸν Cassii. | 223. 224. 281 |
| Chersydri ictus curatio. | 312 | Colis inflammati tumor. | 393. |
| Choacōn emplastrum. | 260 | Ulcera. | 394. Cancer. |
| Χοινίκιον, modiolus. | 510 | Phagedæna. | 397. Carbu- |
| Cholera. | 217. Curatio. | culus. | 398 |
| Χόρδα. | 221 | Collisum corpus quæ tractetur. | |
| Χοριοειδὴς oculi tunica. | 432 | | 294 |
| Chrysippus. | 3. 258 | Collyrium Acharistum. | 352. |
| Cibi concoctio quæ fiat. | 6 | In Ani fistulis. | 415. An- |
| Cibi varii non facilius coquun- | | drea. | 359. Asclepias. |
| tur. | 131 | Βασιλικόν. | 365. Casa- |
| Cibus unde debeat incipere. | 23 | rianum. | 364. Canopite. |
| Cibus humidus fatigatis conve- | | 362. Cleonis. | 351. Cy- |
| nit. | 26 | thium. | 352. Διὰ κέρα- |
| Cibus egro quando dandus. | | τῶ. | 360. Διὰ πρόκ. |
| 114. Febricitanti. | 119 | Διὰ λιγάν. | 357. Eucl- |
| ad. 27. 131. Humidus ap- | | pidis. | 352. 360. 361. 362. |
| tissimus. | 130. Ex tenuissi- | 365. Hermionis. | 362. |
| ma materia. | 131 | Hieracis. | 364. Μεμυγμέ- |
| Ciborum variae proprietates. | | von. | 360. Nilei. |
| | 100 | Philetis. | 357. Philonis. |
| Cicatrix quomodo indicatur vul- | | 351. Phynon. | 361. Pyxi- |
| neri. | 300. 306 | num. | 362. Rhinion. |
| Cicentiam si quis bibit, quomo- | | Smilion. | 360. Spharion. |
| do curari debeat. | 313 | 361. Tephriion. | 352. |
| Κερσουλαν. | 458 | Theodoti. | ibid. Trygodes. |
| Clavi oculorum. | 431 | | ibid. |
| Clavus in pedibus nascitur. | 335 | Colubra tuto estur. | 309 |
| Curatio. | ibid. | Comitialis morbus. | 172. Ejus |
| Cleophauntus. | 143 | medela. | 173. seqq. |
| Clysteres quando conveniunt | | Comitialis morbus quando | |
| | | | sol- |

I N D E X

| | | | |
|--|--------------|---|--------------|
| <i>Solvitur.</i> | 68 | <i>Corpus obesum hebes.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Communia attendi voluit The- mison eaque tria.</i> | 15. 17 | <i>Corporis semper aliqua imbecil- la pars est.</i> | 28 |
| <i>Communia & propria observan- da.</i> | 17. 18. 19 | <i>Corpora affectibus mutantur.</i> | 11 |
| <i>Concoctio quæ fiat non sciunt eruditi, sed conjectura proje- quantur.</i> | 13 | <i>Corvus, ferramentum scroto incidendo.</i> | 463 |
| <i>Concoctio tarda quæ adjuvetur.</i> | 38 | <i>Costarum emaneratio.</i> | 503 |
| <i>Concoctio omnibus vitiis occur- rit.</i> | 39 | <i>Costarum fistule.</i> | 412 |
| <i>Concubitus rarus corpus exci- tat, frequens solvit.</i> | 21. | <i>Costis fractis opitulandi ratio.</i> | 528 |
| <i>Quis utilis. ibid. Quando convenit.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Coxarum os.</i> | 506 |
| <i>Condita inutilia.</i> | 23 | <i>Coxarum dolor. 235. Pro- gnosis. 75. Curatio. 236</i> | |
| <i>Condylomatis ani curatio.</i> | 400. | <i>Crato.</i> | 394 |
| | 494 | <i>Cratonis compositio ad aurium malum odorem.</i> | 373 |
| <i>Consuetudini quod contrariatur noxium est.</i> | 27 | <i>Κρεμασῆρες, nervi.</i> | 455 |
| <i>Contentio post cibum inutilis.</i> | 36 | <i>Creta singularis.</i> | 32 |
| <i>Cor musculosum est.</i> | 183 | <i>Crimen professoris non est artis.</i> | 57 |
| <i>Cordis percussi signa.</i> | 285 | <i>Κριδῆς curatio.</i> | 422 |
| <i>Corporis natura noscenda.</i> | 27. | <i>Cruris ossa.</i> | 506 |
| | 28 | <i>Crurum fractorum sanatio.</i> | 531. |
| <i>Corpus quænam calefaciant.</i> | 31 | | 537 |
| <i>Corpus quænam refrigerent. ib.</i> | | <i>Κρυσαλλοειδῆς oculi humor.</i> | 432 |
| <i>Corpus quænam humident, aut siccent.</i> | 31. 32 | <i>Cruditatem quænam indicent.</i> | 58 |
| <i>Corpus exedentia. 245. Adu- rentia.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Ctesiphon.</i> | 258 |
| <i>Corpus quid impleat.</i> | 28 | <i>Cubiti ossa.</i> | 505 |
| <i>Corpus quid extenuet. ibid.</i> | | <i>Cubiti fracti curatio.</i> | 537 |
| <i>Corpus quæ commodè exerceant.</i> | 23 | <i>Cubiti luxati cheirurgia.</i> | 550 |
| <i>Corpus integrum quo denotetur.</i> | 22 | <i>Cucurbitula ænea & cornea.</i> | |
| <i>Corpus quadratum optimum.</i> | 43 | <i>82. Earum usus præci- pius. 83. In morbis longis & acutis.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Corpus gracile infirmum. ibid.</i> | | <i>Curtorum in auribus, labiis, ac naribus cheirurgia.</i> | 439 |
| | | <i>Cutem purgantia.</i> | 248 |
| | | <i>Κυνικὸς σπασμὸς.</i> | 189 |
| | | | <i>Ejus</i> |

RERUM & VERBORUM.

| | |
|---|----------|
| <i>Ejus curatio.</i> | 190 |
| Κορυζα. | 191 |
| D. | |
| Δαρτ. | 456 |
| <i>Dejectio quando conveniat.</i> | 31 |
| <i>Dejectio quæ bona.</i> | 68. 69 |
| <i>Dejectio periculosa phthisicis.</i> | 71 |
| <i>Dejectio quæ aliis.</i> | 73 |
| <i>Dejectio in omnibus morbis molita.</i> | 84 |
| <i>Dejectio quibus medicamentis.</i> | ibid. |
| <i>Dejectio infirmat hominem.</i> | ibid. |
| <i>Dejectio lippienti prodest.</i> | 69 |
| <i>Dejectio supprimitur vomitu.</i> | ibid. |
| <i>Dejectionem subitam quid indicet.</i> | 59 |
| <i>Delirium cui prodest.</i> | 69 |
| <i>Denarii pondus.</i> | 249 |
| <i>Dentium ordo.</i> | 501 |
| <i>Dentium doloris varia remedia.</i> | 381 |
| <i>Dentium vitiatorum cheirurgia.</i> | 443 |
| <i>Denti exeso remedium.</i> | 382 |
| <i>Desidia & luxuria adversæ valetudinis causæ.</i> | 2 |
| <i>Desperatus non curandus.</i> | 283 |
| <i>Destillatio. 190. ejus curatio.</i> | 191. 192 |
| <i>Destillationes quæ vitentur.</i> | 36 |
| <i>Dexius.</i> | 259 |
| Διάβρωσις. | 203 |
| Διὰ δαφνίδων emplastrum. | 263 |
| <i>Dieta hiemalis, verna, æstiva, & autumnalis.</i> | 33. 34 |
| Διάφραγμα. | 183 |
| <i>Dies Critici.</i> | 121 |
| <i>Dies sereni saluberrimi.</i> | 42 |

| | |
|--|--------------------|
| <i>Digerentia malagmata.</i> | 253 |
| <i>Digitorum ossa.</i> | 505 |
| <i>Digitorum ulcera.</i> | 403 |
| <i>Digitorum coherentium & curvatorum curatio.</i> | 497 |
| <i>Digitorum fractorum curatio.</i> | 531. 537 |
| <i>Digitorum luxatorum cheirurgia.</i> | 552. 557 |
| <i>Diocles Carystius. 3.</i> | 175. 221. 418. 554 |
| <i>Diogenes.</i> | 265 |
| <i>Dionysius.</i> | 402 |
| <i>Dipsadis ictus curatio.</i> | 311 |
| <i>Discutientia.</i> | 246 |
| <i>Distentio nervorum quando timenda.</i> | 62. 64 |
| <i>Diuretica conveniunt morsis a serpentibus.</i> | 310 |
| <i>Dolor deorsum tendens sanabilior.</i> | 69 |
| <i>Dolorem qui non sentiunt his mens laborat.</i> | 62 |
| <i>ad dolorem omnem malagma.</i> | 257. 258 |
| <i>Dolores quinam mortem indicent.</i> | 55 |
| <i>Doloribus leniendis catapotia.</i> | 278 |
| <i>Durities testiculorum.</i> | 398 |
| Δύσπνοια. | 198 |
| Δυσεντερία. 224. | Curatio. ibid. |

E.

| | |
|--|---------------|
| E Brius qui obmutuit, qui intereat & servietur. | 55 |
| Εκτροπή curatio. | 430 |
| Ε'λαιώδες pus. | 288. 289. 290 |
| Ε'λαιώδες acorū. | 277 |
| Ε'λεφαντίασις. | 176 |
| O o 3 | Ele- |

I N D E X

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|
| <i>Elephantinum emplastrum.</i> | 266 | <i>Exercitatio cibum antecedere</i> | |
| <i>Ελαιοειδὺς tunica.</i> | 455 | <i>debet.</i> | 23 |
| <i>Emollientia.</i> | 110 | <i>Exercitatio implet corpus.</i> | 28 |
| <i>Empeirici quinam.</i> | 3 | <i>Exercitationis finis sudor aut</i> | |
| <i>Empeirici quid statuunt.</i> | 8 | <i>lassitudo.</i> | 23 |
| <i>Emplastrorum differentia.</i> | 249 | <i>Experientia plurimum ad me-</i> | |
| <i>Emplastrorum formule.</i> | 260 | <i>delam confert.</i> | 13 |
| <i>Emplastra, quæ calvaria cau-</i> | | <i>Experimenta sunt necessaria.</i> | |
| <i>sa componuntur.</i> | 517 | <i>5. initia medicina.</i> | 9 |
| <i>Emplastrum Barbarum.</i> | 260 | <i>Experiri quomodo oporteat.</i> | 112 |
| <i>Εμπροσδότων &. 193. cura-</i> | | <i>ad Extrahendam materiam</i> | |
| <i>tio.</i> | 194 | <i>malagma.</i> | 250 |
| <i>Εναίμα Emplastrum.</i> | 260 | <i>Exulceratio stomachi.</i> | 205 |
| <i>Εγκανθίδος medicatio.</i> | 425 | <i>Exusto in sole quid agendum.</i> | 27 |
| <i>Εγχεῖσα.</i> | 277 | | |
| <i>Ενεαφάρμακον. emplastrum.</i> | | | |
| | 272. 484 | | |
| <i>Εντροπήλη. 456. curatio.</i> | 464 | F <i>Aber quidam machina-</i> | |
| <i>Εφελίς. 345. ejus curatio.</i> | 346 | <i>mentorum ad extenden-</i> | |
| <i>Ephesium emplastrum.</i> | 266 | <i>dum femur luxatum reper-</i> | |
| <i>Επιουκτίς,</i> | 336 | <i>tor.</i> | 554 |
| <i>Epilepsia.</i> | 172 | <i>Faciei contuse malagma.</i> | 256 |
| <i>Επιτολήλη. 456. curatio.</i> | | <i>Fames.</i> | 24 |
| | 467 | <i>Famem qui ferant facilius, qui</i> | |
| <i>Epirotes Philippus.</i> | 161 | <i>difficulter.</i> | 19 |
| <i>Επισπασμὸν malagma.</i> | 250 | <i>Fascia quæ & qualis requira-</i> | |
| <i>Επισπασμὰ emplastra.</i> | 263 | <i>tur. 294. æstate, hieme. ibid.</i> | |
| <i>Erasistratus. 204. 219. 222.</i> | | <i>Fascia sex ad ossa fracta.</i> | 533 |
| | 240. 241. 394 | <i>Fatigatio animi inutilis post</i> | |
| <i>Ερπύς.</i> | 319 | <i>cibum.</i> | 36 |
| <i>Eruditi imbecilles.</i> | 21 | <i>Fatigatis quid agendum.</i> | 25 |
| <i>Erysipelas periculum adfert si</i> | | | 26 |
| <i>circa cervicem aut caput</i> | | <i>Fatigatis inutilis frigida potio.</i> | |
| <i>constitit. 301. quomodo cu-</i> | | | 26 |
| <i>randum.</i> | 302 | <i>Fatigatis ex ambulatione quid</i> | |
| <i>Euclystus Phlegetis F.</i> | 406 | <i>agendum.</i> | 27 |
| <i>Evocantia & educantia.</i> | 247 | <i>Faucium morbi.</i> | 196 |
| <i>Euthyleus.</i> | 257 | <i>Faucium exulceratio.</i> | 199 |
| <i>Εξανθήματα.</i> | 336 | <i>ad Favum malagma.</i> | 255 |
| <i>Excitare caput, pro attollere.</i> | | <i>Febris quid secundum Eras-</i> | |
| | 517 | <i>istratum.</i> | 16 |
| | | <i>Febrim genera.</i> | 115 |
| | | | Fe- |

R E R U M & V E R B O R U M.

Febrim quartana simpliciores sunt. *ibid.*
Tertianarum duo genera. 116
Febrim quotidianarum varia genera. *ibid.*
Febris presentis signa pulsus & calor. 129. *Alia.* 130
Febriculam instantem quid indicet. 59
Febris nulla inordinata. 117
Febris à cubito in posteriora delapso mota. 550
Febris ardens horrore sanatur. 70. 71
Febris subito finita revertitur. 60
Febris acuta periculosa. 52
Febres mala. 51. 52
Febris quæ mala vulnere. 296
Febris pestilentis curatio. 133
Febris ardentis. *ibid.*
Febris sæpe prodest. 70
Febres longæ abscessus, & articularum dolores indicant. 64
Feminarum naturalia clausa quæ aperiantur. 488. 489
Femoris luxati cheirurgia. 553
Femorum fracturæ curatio. 531. 537
Femur ossa. 506
Fibulas adolescentibus applicandi ratio. 473
Firmus pro sano. 21
Fistularum genera plura. 328.
Quomodo dignoscuntur. 329.
330. Simplicium curatio. 330.
callosarum. 331. *duplicium seu multiplicium.* 332
Fistularum cheirurgia. 412
Flatus excitantia. 104
Feminarum calculi. 481

Fætus imbecillitas quæ cognoscatur. 62
Fætus sanitas. *ibid.*
Fætus mortui eductio. 489
Fomenta calida quæ sint. 95
Fortuna non præstat arte in morbo. 111
Fortune in sanandis morbis potentia. 405
Fricatio convenit partibus longe à vulneribus disitis. 298
Fricationis utilitas. 194
Frictionem aliis auxiliis prætulit Asclepiades. 87
Fricatio corpus durat, molli, minuit, implet. 88. *Longa obest.* 89. *Quando adhibenda.* 89. *eius numerus præscribi non potest.* 90
Frigus quid in febre. 116
Frigus quibus inimicum. 39
Quid efficiat. 39. 40
Frigoris in febribus curatio. 140
Frontis fractura cicatricem difficulter recipiens. 521
Fungi in ano vel vulva curatio. 403
Fungos inutiles si quis assumserit. 314
Furunculus 324. ejus curatio. 324. 325
Furoris signa. 63. 64

G.

G *Ræca litera γ ferramenti ad diducendam carnem comparati modulus.* 417
Gallinaceus pullus divisus imponitur morsui serpentium. 310
Γάγγλια, eorumque cheirurgia. 420
 004 Γά-

I N D E X

| | |
|--|---|
| <i>Γαγγραινα.</i> 301. In quibus partibus fit, & difficile sanatur. 301. Ejus curatio. 303. corrupti corporis est. | <i>Hæmorrhoidum suppressiōem quæ sequantur.</i> 62 |
| | <i>Hæmorrhoidum cheirurgia.</i> 494 |
| <i>Gangrana sectio.</i> 304 | <i>Hæmi retusi.</i> 436 |
| <i>Gargarizationes.</i> 497 | <i>Hæsus lana mollis.</i> 483 |
| <i>Gemini dentes.</i> 274 | <i>Hæsus lana sulphurata.</i> 210 |
| <i>Genu luxati cheirurgia.</i> 501 | <i>Hecateus.</i> 264 |
| <i>Genuum dolor.</i> 555 | <i>Hedera bacca dentem findit.</i> 383 |
| <i>Genua contracta mortem indicant.</i> 237 | |
| <i>Gestatio in lethargo prodit.</i> 54 | <i>Hepatis morbi.</i> 213 |
| | <i>Hepatis vulnerati signa.</i> 286 |
| <i>Gestationem invenit Asclepiades.</i> 87. Ea quibus convenit morbis. 90. 91. Genera ejus varia. 91 | <i>Ἡπατικός morbus.</i> 213. Curatio. 214 |
| <i>Gingivarum marcescentium curatio.</i> 443 | <i>Heraclides Tarentinus.</i> 145. 280. 426. 554 |
| <i>Gingivarum tubercula.</i> 387 | <i>Heras.</i> 273 |
| <i>Ulcera.</i> 388 | <i>Hernia.</i> 456. Curatio. 460 |
| <i>Glandis nude contactio.</i> 471 | <i>Heron.</i> 448 |
| <i>Glandis contacta apertio.</i> 472 | <i>Herones duo.</i> 406 |
| <i>Glandium plumbearum extractio.</i> 418 | <i>Herophilus.</i> 3. 241. 432 |
| <i>Glandula in cervicibus.</i> 518 | <i>Hiems sicca si septentrionales ventos habeat, ver pluvias exhibeat qui morbi subeant.</i> 45 |
| <i>Gorgias.</i> 406. 448 | |
| <i>Græcorum in nominandis absque circuitu partibus obscenis imprudentia.</i> 392 | <i>Hiems salubris est.</i> 42 |
| <i>Γραφίσκον Διοκλῆς.</i> 418 | <i>Hiems senibus inimica.</i> 46 |
| <i>Gravedo.</i> 190. Ejus curatio. 191. 192. 193 | <i>Hieme quid & quomodo esse conveniat.</i> 33 |
| <i>Grævedines qui vitentur.</i> 36 | <i>Hippocrates.</i> 227. 327. 405. 547. 549. 554. 557 |
| | <i>Hippocrates omnia presagivit.</i> 41 |
| H. | <i>Hippocrates à futuris deceptus.</i> 515 |
| H æmorrhoidis ictus curatio. 311 | <i>Hirundinis pullus angina remedium.</i> 197 |
| <i>Αἱμορροΐδες earumque curatio.</i> 401 | <i>Ἡ μοῦλαται.</i> 503 |
| | <i>Horror quid.</i> 116 |
| | <i>Horror à biliosis.</i> 141 |
| | <i>Horroris in febr. curatio.</i> ibid. |
| | <i>Hu-</i> |

RE RUM & V E R B O R U M.

| | | | |
|--|-------------------|---|----------|
| <i>Humeri ossa.</i> | 504 | 271. <i>Catapodium.</i> | 281 |
| <i>Humerorum dolores qui tollantur.</i> | 69 | <i>Infirmetas omnis morbis obnoxia.</i> | 31 |
| <i>Humeri luxati Cheirurgia.</i> | 548 | <i>Inflammationis notæ.</i> | 139 |
| <i>Humeri fracti curatio.</i> | 531. 535 | <i>Inflammatio stomachi.</i> | 205 |
| <i>Ἰσχυρὸς.</i> | 432 | <i>Inflammatio testiculorum.</i> | 398 |
| <i>Ἰσχυρὸν κεφάλον,</i> | 187. 189 | <i>Inflammatio uvæ.</i> | 389 |
| <i>Ἰσχυρὸν κήλη.</i> | 458. Curatio. 468 | <i>ad Inflammationes vulvæ pefsus.</i> | 271 |
| <i>Hydrophobia curatio.</i> | 308 | <i>Inflatio stomachi.</i> | 205 |
| <i>Hydrops. 160. Ejus species & curatio.</i> | 160. 161 | <i>Inguinum abscessus raro secandi.</i> | 408 |
| <i>Hydropicis quomodo aqua emitatur.</i> | 451 | <i>Insania quando expectanda.</i> | 62. 63 |
| <i>Hydrops quartana supervenit.</i> | 161 | <i>Intemperantia quæ tutior.</i> | 23 |
| <i>Hysocyami poti curatio.</i> | 314 | <i>Intestinum jejunum.</i> | 184 |
| <i>Ἰσχυρὸς.</i> | 367 | <i>Intestinum cæcum.</i> | ibid. |
| <i>Hymen imperforatum.</i> | 488 | <i>Intestinum tenuius.</i> | ibid. |
| I. | | <i>Intestinorum morbi.</i> | 217 |
| Ἰσχυρὸς <i>saniei species.</i> | 288 | <i>Intestini plenioris morbus.</i> | 223 |
| Malus. | 289 | <i>Intestini tenuioris morbus.</i> | 221 |
| <i>Icterus.</i> | 175 | <i>Intestini tenuioris morbi mala signa.</i> | 74 |
| <i>Ictericis jecur durum fieri malum.</i> | 74 | <i>Intestinorum levitas.</i> | 226 |
| <i>Jecur.</i> | 183 | <i>Intestinorum levitas quæ facile depellatur.</i> | 69 |
| <i>ad Jecur dolens malagma.</i> | 251 | <i>Intestinorum levitas quæ periculosa.</i> | 74 |
| <i>ad Jecur sanandum catapotia.</i> | 280 | <i>Intestinorum vulneratorum notæ.</i> | 287 |
| <i>Jecinoris vomica.</i> | 67 | <i>Intestinorum è ventre vulnerato prolabantium Cheirurgia.</i> | 452 |
| <i>Ignavia corpus hebetat.</i> | 20 | <i>Jollas.</i> | 277 |
| <i>ad Ignem sacrum.</i> | 274. 277 | <i>Ireneus.</i> | 341 |
| <i>Eidsos.</i> | 221 | <i>Jugale os.</i> | 500 |
| <i>Imbecillis quæ observanda.</i> | 22 | <i>Judeus Medicus.</i> | 263. 273 |
| <i>Imbres quos morbos causent.</i> | 45 | <i>Juguli fracti sanatio.</i> | 526 |
| <i>Impetiginis quatuor species.</i> | 339 | <i>Juvenes hieme optime valent.</i> | 46 |
| <i>Inediam qui facile ferant.</i> | 32 | | |
| <i>Infanti mortuo ejiciendo pessus.</i> | | | |

I N D E X

L

| | |
|--|---|
| L Rima in cranio faciente modulus. 518 | nibus apta est. 32 |
| Labor firmat corpus. 20 | Lectio clara nocet capite labo- ranti. 35 |
| Labor vitandus si inedia fu- tura est. 24 | Lectio promovet concoctionem. 38 |
| Laborem qui facile ferant. 25 | Λευκίον. 489 |
| Laboris mutatio levat lassitu- dinem. 26 | Lenia quanam. 102 |
| Labrorum curtorum Cheirurgia. 439 | Lenia emplastra. 267 |
| Labrorum fissorum curatio. 447 | Lenticularum species. 345 |
| Lac convenit phthysicis. 170. | Λετρί. 513 |
| Veneno est in capitis dolo- ribus, & acutis febribus. ibid. | Lethargus, 158. Curatio. 159 |
| Lac in mammis, quibus men- ses deficiunt. 76 | Λευκὰ emplastra. 266 |
| Lac è mammis profluens fœ- tum imbecillum notat. 62 | Λευκόν. 341 |
| Levantia. 247 | Leucophlegmatie curatio. 164 |
| Laganum iis, quibus maxilla perfracta est, comedendum. 526 | Lien. 183 |
| Λαγωφδάμυς sanatio. 430 | Lienes magni quos causent morbos. 62 |
| Lapillus, pulex, & s. quomodo ex aure extrahantur. 378 | Lienosis mala tormina. 74 |
| Lassitudinem levat laboris mu- tatio. 26 | ad Lienem malagma. 251 |
| Laterum dolores. 209 | Lienis morb. 215. Curatio. ibid. |
| Lateris dolor quando exspe- ctandus. 62. Finitur. 67 | Lienis icti signa. 286 |
| Lateris doloribus catapotium. 280 | Lingua ulcera. 387 |
| ad Laterum dolorem malagma. 252 | Lingua resolutio. 190 |
| Latinorum à fœdioribus verbis abstinentia. 392 | Lingua cum subiecta parte iuncta Cheirurgia. 446 |
| Lavatio calida pueris & se- | Λεπὰ emplastra. 267 |
| | Lippitudo arida. 364 |
| | Lippitudo quibus indicetur. 60 |
| | Lippitudinis levioris nota. 347 |
| | Lippientis dieta. 349 |
| | Λιδοτόμ. 481 |
| | Livori faciei malagma. 256 |
| | Longus morbus quis. 111. |
| | Acuto par. 112. Quis cognoscatur. 113 |
| | Lucubratio quando convenit. 22 |
| | Lun. |

RERUM & VERBORUM.

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|--------------|
| <i>Lumbrici lati, teretes.</i> | 227. | <i>Medicina ab experimentis de-</i> | |
| <i>Curatio.</i> | <i>ibid.</i> | <i>ducta.</i> | 9 |
| <i>Lunata plaza.</i> | 524 | <i>Medicina debet esse rationalis.</i> | |
| <i>Lycium.</i> | 524. 529 | | 20 |
| <i>Lyssas.</i> | 251 | <i>Medicine genera differunt pro</i> | |
| | <i>M.</i> | <i>natura loci.</i> | 8 |
| M <i>Achaon Esculapii fi-</i> | | <i>Medicina perpetua præcepta vix</i> | |
| <i>lius. 1. Vulneribus</i> | | <i>habet.</i> | 17 |
| <i>auxilium attulit.</i> | 2 | <i>Medicina prior inventa, dein</i> | |
| <i>Macor insuetus malum deno-</i> | | <i>ratio quasita.</i> | 9 |
| <i>tat.</i> | 48 | <i>Medicina nihil proficit repu-</i> | |
| <i>Mala immobiles.</i> | 501 | <i>gnante natura.</i> | 112 |
| <i>Malagmatum differentia.</i> | 249 | <i>Medicina est ars conjecturalis.</i> | |
| <i>Malagmatum variae formulæ.</i> | | | 13. 57 |
| | 250 | <i>Medicine quæ fides est.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Manuum ossa.</i> | 505 | <i>Medici primi Philosophi.</i> | 2 |
| <i>Manuum cum pedibus simili-</i> | | <i>Medicus expertus optimus.</i> | 11 |
| <i>tudo.</i> | 507 | <i>Medicus rationalis.</i> | 17 |
| <i>Manuum dolores.</i> | 237 | <i>Medicus Empiricus.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Manus luxata Cheirurgia.</i> | | <i>Medici officium juxta Ascle-</i> | |
| | 551 | <i>piadem.</i> | 117 |
| <i>Materiæ imbecillissimæ quæ-</i> | | <i>Medicus non dies sed febris ac-</i> | |
| <i>nam.</i> | 97 | <i>cessiones numerare debet.</i> | |
| <i>Materiæ mediæ.</i> | 98 | | 121 |
| <i>Materiæ valentissimæ.</i> | 98. 99. | <i>Medicus qui pulsum expræbit.</i> | |
| | 100 | | 129 |
| <i>Maxilla partes.</i> | 501 | <i>Medicus quo loco sedebit.</i> | 130 |
| <i>Maxillares dentes.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Medicus amicus utilior extra-</i> | |
| <i>Maxilla fracta Cheirurgia.</i> | | <i>neo.</i> | 19 |
| | 525 | <i>Medico parum proficienti quan-</i> | |
| <i>Maxilla luxata Cheirurg.</i> | 545 | <i>do ignoscendum.</i> | 112 |
| <i>Medicina sanitatem promittit.</i> | | <i>Medicamenta à diis petita.</i> | 2 |
| | 1 | <i>Medicamenta non omnibus</i> | |
| <i>Medicina ubique est.</i> | <i>ibid.</i> | <i>profunt.</i> | 57. 112 |
| <i>Medicina apud Græcos magis</i> | | <i>Medicamentorum usus ab As-</i> | |
| <i>excolta.</i> | <i>ibid.</i> | <i>clepiade sublatus.</i> | 241 |
| <i>Medicine scientia sapientie</i> | | <i>Medulla in spina discisse signa.</i> | |
| <i>pars. 2. Quando in</i> | 111. | | 287 |
| <i>partes divisa.</i> | 3 | <i>Medus.</i> | 253 |
| <i>Medicinam mutavit Ascle-</i> | | <i>Meges. 406. 408. 426. 448.</i> | |
| <i>piades.</i> | <i>ibid.</i> | | 479. 555 |
| | | | Mé- |

I N D E X

| | | | |
|--|----------|---------------------------------------|-----|
| <i>Mélas.</i> | 341 | <i>Morborum initia famem sitim-</i> | |
| <i>Μελίχροα saniei species.</i> | 288 | <i>que desiderant.</i> | 92 |
| <i>Mala.</i> | 289 | <i>Morbus qui acutus, qui lon-</i> | |
| <i>Μελιχροίδες. 255. Curatio.</i> | 420 | <i>gus. III. Quomodo di-</i> | |
| <i>Membrana calvariam cin-</i> | | <i>gnoskitur.</i> | 113 |
| <i>gens scalpro non laceranda.</i> | 516 | <i>Morborum acutorum notæ fal-</i> | |
| <i>Membranae cerebrum succin-</i> | | <i>laces sunt.</i> | 57 |
| <i>gentis inflammatio quomodo</i> | | <i>Morbus Comitialis post an-</i> | |
| <i>tractanda.</i> | 520 | <i>num. 25. ortus difficile fi-</i> | |
| <i>Membrum ictum certa ratione</i> | | <i>nitur.</i> | 73 |
| <i>collocari debet.</i> | 298 | <i>Morbus intestini tenuioris ex</i> | |
| <i>Membri resoluti prognosis.</i> | 75 | <i>urinae difficultate intra 7.</i> | |
| <i>Menemachus.</i> | 382 | <i>diem occidit.</i> | 74 |
| <i>Μηνιγοφύλαξ.</i> | 512 | <i>Mortis instantis signa. 54. 55</i> | |
| <i>Menophili compositio ad au-</i> | | <i>Mortis certa signa negavit:</i> | |
| <i>rium malum odorem.</i> | 373 | <i>Democritus.</i> | 57 |
| <i>Menstrua suppressa capitis do-</i> | | <i>Morsus fera habent virus:</i> | |
| <i>lores acerbos indicant.</i> | 59 | <i>quoddam.</i> | 307 |
| <i>Mentem, maxilla ima pars.</i> | 501 | <i>ad Morsus emplastra.</i> | 265 |
| | | <i>Morsus canis rabidi curatio.</i> | 307 |
| <i>Methodici.</i> | 15 | <i>Morsus serpentium quomodo cu-</i> | |
| <i>Metrodorus.</i> | 161 | <i>rentur.</i> | 309 |
| <i>Micon.</i> | 254. 257 | <i>Morsus Aspidis curatio.</i> | 310 |
| <i>Miscendi ratio.</i> | 248 | <i>Moschus.</i> | 253 |
| <i>Mithridates.</i> | 276 | <i>Motus in dolore pestifer.</i> | 545 |
| <i>Modioli descriptio.</i> | 510 | <i>Mulier gravida abortit, si</i> | |
| <i>Mollientia.</i> | 247 | <i>mammae emacuerit.</i> | 766 |
| <i>Mollientia malagmata.</i> | 253 | <i>Mulier gravida acuto morbo</i> | |
| <i>Morbi ad deor. iram relati. 2</i> | | <i>facile consumitur.</i> | 555 |
| <i>Morbi novi incidunt. 5. 13</i> | | <i>Mulier ex partu vehementibus</i> | |
| <i>Morbi remediis curantur. 10. 11</i> | | <i>doloribus pressa in periculo</i> | |
| <i>Morborum IV. genera. III</i> | | <i>mortis est.</i> | 744 |
| <i>Morborum cognitio necessaria.</i> | 4. 5. | <i>Musculus latus praecidendus.</i> | 291 |
| <i>Morbi incrementis signa. 113</i> | | <i>Mutatio subitanea noxia. 235</i> | |
| <i>Morbi vernaes.</i> | 43 | <i>Μυδρίασις. 368. Ejus cura</i> | |
| <i>Morbi aestivi. ibid.</i> | | <i>tio. ibid.</i> | |
| <i>Morbi autumnales. 44</i> | | <i>Μυρμηκίων.</i> | 335 |
| <i>Morbi hiemales. 45</i> | | <i>Μυρσάλατοι. 216. 251</i> | |

RERUM & VERBORUM.

N.

| | |
|--|---------------------|
| N arium ossa & foramina. | 500 |
| Nares acuta mortem indicant. | 54 |
| Narium hæmorrhagia quid indicet. | 62 |
| Nares exulcerata aqua calida fovenda. | 378 |
| Narium curtarum cheirurgia. | 439 |
| Naso fracto medendi ratio. | 521 |
| Natura agri noscenda. | 14 |
| Naturæ contemplatio non facit medicum. | 13 |
| Nauseanti ex navigatione quid agendum. | 27 |
| Nervi νεύρας. | 502 |
| Nervos præcisos debilitas partis sequitur. | 297 |
| Nervorum distentio quibus indicetur. | 58 |
| Nervorum dolor. 179. | Ejus curatio. 180 |
| Nervorum tremor. 180. | Ejus curatio. ibid. |
| ad Nervos malagma. | 257 |
| Nervis utilia acopa. | 276. 277 |
| Nervorum resolutioni ætas tenera prodest. | 69 |
| Nigritiei ossium curatio. | 509 |
| Nigrum Diogenis emplastrum. | 265 |
| Nileus. | 253. 554 |
| Νόσος costæ. | 503 |
| Notæ in acutis morbis fallaces sunt. | 57 |
| Notitiæ subtrahere. | 358 |
| Noxarum corporis genera. | 282 |
| Nuces Græcæ. | 200. 201. 217. 276 |

Numenius.

259. 271

Nymphædorus.

554

O.

| | |
|-------------------------------------|----------|
| O besi quo morbo intereunt. | 47 |
| O Colós. | 249 |
| Obscænarum partium vitia. | 392 |
| Ocium. | 25 |
| Oculi natura. | 432 |
| Oculorum foramina. | 500 |
| Oculi variis casibus patent. | 346 |
| Oculorum vitia. | 421 |
| Oculi sponte interdum sanescentes. | 405 |
| Oculorum caliginis curatio. | 366. |
| | 367 |
| Oculorum imminutio. | 358 |
| Oculorum scabrorum curatio. | 365 |
| Oculorum suffusionis curatio. | 367 |
| Oculorum resolutionis curatio. | ibid. |
| Oculorum imbecillitatis curatio. | 368 |
| Oculorum ictorum curatio. | 369 |
| Oculi tumoris nota. | 347 |
| Oculi quibus curantur. | 348 |
| Oculorum varia collyria. | 351 |
| | & seqq. |
| Oculorum ulcerum curatio. | 361 |
| Oculorum inflammatio. | 363 |
| Oculorum pituitæ fluxus cohibendus. | 353. 354 |
| Oculorum carbunculi. | 356 |
| Oculorum pustula. | 357 |
| | Ocul. |

I N D E X

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|
| Oculorum pituita Cheirurgia. | 427 | tantes. | 427 |
| | 435 | Panthemus. | 253 |
| Oleum bibendum qui venenum | | ad Panem malagma. | 255 |
| hausit. | 313 | Papularum duo genera. | 340 |
| Omentum. | 185 | Curatio. | ibid. |
| Omenti a vulnere corrupti ex- | | Παρακολητικὸν emplastrum. | 261 |
| cisio. | 453 | Παράλυσις. | 178 |
| O'φίασις. | 345 | Παράσυναγχη. | 196 |
| O'πισθότον⊙. | 193. | Παράτιδες. | 255. 391 |
| Curatio. | 194 | ad Parotidas malagma. | 255. |
| O'πιδόρνοια. | 198 | | 258 |
| Oriularius Clyster. | 483. | Partes aliter lamine mortuo | |
| Oriularium specillum. | 495 | apparent, aliter vivo. | 11 |
| Os aqua frigida fovendum. | 22 | Parti laboranti primum succur- | |
| Quibus. | 36 | rendum. | 28 |
| Oris resolutio alvo cita finitur. | 69 | Partium extremarum frigus | |
| | | quando mortem indicat. | 55. |
| Oris vitia quæ Cheirurgum po- | | | 90 |
| stulant. | 443 | ex Partu laborantibus catapo- | |
| Oris Cancer. | 390 | tum. | 281 |
| Oris ulcerum curatio. | 385 | Παραλίδες. | 387 |
| Ossium positus & figura. | 498 | Pastillorum differentia. | 249 |
| Os pectoris. | 503 | Pastillorum formula. | 268 |
| Ossium vitiatorum signa & cu- | | Patella, os. | 506 |
| ratio. | 507. 525. 528 | Pecten, os. | ibid. |
| Ossium fracturam differentia. | 524 | Pedes cum digitis & unguibus | |
| | | in gravi morbo nigrescant. | 66 |
| Ossium luxatorum Cheirurgia. | 542 | Pedum cum manibus similitudo. | 507 |
| | | | 507 |
| Ossibus resolvendis emplastrum. | 265 | Pedum dolores. | 237 |
| ad Ossa & nervos malagma. | 257 | Pedum doloribus malagma. | 259 |
| | | | 259 |
| O'σχεόν, scrotum. | 456 | Pediculi palpebrarum. | 358 |
| Oxana curatio. | 379. | Περλυμένον ceratum. | 250 |
| Cheirurgia. | 442 | in Præcipiti periculo multa | |
| | | recte sunt alias omittenda. | 150 |
| | | | 150 |
| P alma luxata Cheirurgia. | 552 | Περπνευμονία. | 211. |
| | | Curatio. | 212 |
| Palmule. | 24 | | 212 |
| Palpebrarum pilis oculum irri- | | Περιτόναι⊙. | 186. 417 |
| | | | 186. |

RERUM & VERBORUM.

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|
| Πισοί. | 270 | Podagra quibus indicatur. | 59 |
| Pestilentia occupato quid obser- | | Podagra quae solvitur. | 68 |
| vandum. | 40. 41 | ad Podagras calidas malagma. | 250 |
| Petron. | 137 | Podalirius Aesculapii filius. | 1 |
| Παγέδαινα in cole orta. | 397 | Vulneribus auxilium attulit. | 2 |
| Phalangii ictus curatio. | 312 | | |
| Φανία. | 345 | Polyarchus. | 253. 529 |
| Philocrates. | 264 | Polyidas. | 268 |
| Philotas. | 261 | Polypus narium strangulat ho- | |
| Philotimus. | 554 | minem. 380. Curatio. ibid. | |
| Philoxenus. | 405 | | 441 |
| Φίμωσις ejusque Cheirurgia. | | ex Pomis medicamenta. | 230. |
| | 472 | | 231 |
| Φλύκταιναι ἐχκώδεις. | 336 | Ponderum ratio. | 249 |
| Φλυζάκιον. | ibid. | Porrigo 343. Ejus curatio. | ibid. |
| Phrenitis. 148. Ejus phurage- | | | |
| nera. 149. Cura. 150 seqq. | | Posca frigida. | 208 |
| Phrenitici in tenebris habiti. | ibid. | Potio frigida sudanti pernicio- | |
| 149. In luce. | ibid. | sissima. | 26 |
| Φρενίσις. | 358 | Potio fatigatis inutilis. | ibid. |
| Φρίσις. 167. Curatio. | 169 | Potio febricitantibus quando | |
| Phthysicis alvus cita vitanda. | | danda. | 127. 128 |
| 171. Vomitus frequens per- | ibid. | Procidentiae ani vel vulvae cu- | |
| niciosus. | ibid. | ratio. | 402 |
| Phthisis adolescentibus oritur. | | Proprium est aliquid loci, tem- | |
| | 71 | poris. | 18 |
| Φύγεδλῶ, panus oriens. | 255. | Proprietates rerum quare no- | |
| | 325 | scenda. | 96 |
| Φύματα. 70. 254. 325. 396 | | Πρόπτσις. | 355 |
| ad Phymata malagma. | 254. | Protarchus. | 255. 554 |
| | 255. 256. 258 | Prurigo. | 75 |
| Pituitam crassiolem qua fa- | | Psoricum quid sit. | 366 |
| ciunt. | 103 | Psylli audaces potius quam pe- | |
| Pituita oculorum Cheirurgia. | | riti. | 309 |
| | 435 | Πρεπούριον. | 467 |
| Plaga levis aqua frigida cura- | | Πρεπούρις medicatio. | 423 |
| tur. | 293 | Ptolemæus Rex. | 275 |
| Planta luxata Cheirurgia. | | Ptolemæus Cheirurgus. | 373 |
| | 556 | Pueri vere optime valent. | 46 |
| Πλευριτικός morbus. | 209. | Puerorum morbi. | ibid. |
| Curatio. | ibid. | | Pueri |

I N D E X

| | | | |
|---|----------|--|-----------|
| <i>Pueri non curantur ut viri.</i> | | <i>Quartana facile revertitur. ib.</i> | |
| | 134 | <i>Questus ex populo major.</i> | 129 |
| <i>Pulmo.</i> | 183 | <i>Quies optima.</i> | 114 |
| <i>Pulmonis morbi.</i> | 211 | <i>Quiescere post cibum oportet.</i> | 37 |
| <i>Pulmonis morbi bonum signum.</i> | | <i>Quotidiana curatio.</i> | 143 |
| | 66 | <i>R.</i> | |
| <i>Pulmonis illi signa.</i> | 285 | R <i>Abiosi canis morsus.</i> | 307 |
| <i>Pulsus venarum res fallacissi-</i> | | <i>Ramicis Cheirurgia.</i> | 468 |
| <i>ma. 129. Quibus concita-</i> | | | 471 |
| <i>tur. ibid. Non statim ex-</i> | | <i>Refectio convalescentium a mor-</i> | |
| <i>plorandus.</i> | 129 | <i>bo.</i> | 140 |
| <i>Purgantia stomachum ledunt.</i> | | <i>Refrigerantia.</i> | 105 |
| | 84 | <i>Regius morbus.</i> | 175 |
| <i>Purgationes expulit Asclepia-</i> | | <i>Remedia explorata adhibenda.</i> | |
| <i>des.</i> | 29. 118 | | 8 |
| <i>Purgationes qua perniciose.</i> | 29. | <i>Remediis contrariis saepe agri</i> | |
| | 31 | <i>curantur.</i> | 137 |
| <i>Puris natura.</i> | 288 | <i>Renes.</i> | 183 |
| <i>Puris signa.</i> | 289 | <i>Renum vitia quibus indicantur.</i> | |
| <i>Puris fontium suppressum ma-</i> | | | 60. 61 |
| <i>lum est.</i> | 72 | <i>Renum morbi. 216. Curatio.</i> | |
| <i>Pus concoquentia & moventia.</i> | | | 217 |
| | 243 | <i>Renum percussorum signa.</i> | 286 |
| <i>Puri movendo emplastrum.</i> | 262. | <i>Reprimentia.</i> | 109 |
| | 263. 264 | <i>Resolventia malagmata.</i> | 253 |
| <i>Pustularum varia genera</i> | 336 | <i>Paxadia eorumque curatio.</i> | |
| <i>Πυλωρός.</i> | 184 | | 399 |
| <i>Πυρίτης lapis.</i> | 255 | <i>Πημοχασμός.</i> | 203 |
| | | <i>Rigor quando timendus.</i> | 62 |
| <i>Q.</i> | | <i>Πίσχυρα forceps.</i> | 445 |
| Q <i>Uartana aestiva brevis,</i> | | <i>Pūs.</i> | 424 |
| <i>autumnalis longa.</i> | 76 | <i>Pύπιδες emplastrum.</i> | 264 |
| <i>Quartana curatio.</i> | 144 | | 399. 424 |
| <i>Quartana neminem jugulat.</i> | | <i>Rhus Syriacus.</i> | 386 |
| | 146 | <i>Rubrum emplastrum.</i> | 266 |
| <i>Quartana mutatur in quoti-</i> | | <i>Rufum emplastrum.</i> | 261 |
| <i>dianam.</i> | ibid. | <i>S.</i> | |
| <i>Quartana duplicis curatio.</i> | ibid. | S <i>Acer ignis.</i> | 320. Ejus |
| | ibid. | <i>dua species. ibid. Cura-</i> | |
| <i>Quartana vetus raro nisi vere</i> | | <i>tio.</i> | 321. 322 |
| <i>solvitur.</i> | 147 | <i>Sagittarum eductio.</i> | 417 |
| | | | Sano |

RERUM & VERBORUM.

| | | | |
|--|-----|--|-----------------------|
| Sanguis bonus & malus qui. | 289 | Sanitas quando suspecta. | 48 |
| Sanguis unde calefcit & refri- gefcit. | 194 | Sanus homo quid agere debeat. | 20 |
| Sanguinis color attendendus. | 82 | Σαρκονήλη. | 459 |
| Sanguis crudo non mittendus. | 79 | Σαρκόφαγος lapis. | 239 |
| Sanguis quando mittendus. | 79 | Satietas nimia nunquam uti- lis. | 23. ex nimia fame. |
| 80. Quando sistendus. | 82 | Scabies. | 338. Ejus curatio. |
| Sanguinem vomere poffiferum eft. | 56 | | ibid. |
| Sanguinis fputum. | 202 | Scala gallinaria. | 549 |
| Sanguis fpumans excretus pul- monis vitium denotat. | 61 | Scalper exciforius. | 511 |
| Sanguini evocando peflus. | 270 | Scapularum offa. | 503 |
| Sanguinis in vefica, evulfo calculo, concreti figna & curatio. | 483 | Σχιςόν alumen. | 242 |
| Sanguis ex vulneribus exiens. | 288 | Σκωρία μορίεδα. | 247. 267 |
| Sanguis in ventrem conflatus in pus convertitur. | 62 | Scroti incifio. | 462 |
| Sanguinis profluvium quod- nam malum. | 76 | Scutula operta. | 503 |
| Sanguinis profluvium quid in- dicet. | 58 | Seclio corporum neceffaria. | 7 |
| Sanguinem fupprimentia. | 242 | Secunda menfa. | 24 |
| Sanguini fupprimendo mala- gma. | 256 | Secunde, velamentum infan- tis. | 492 |
| Sanguinis profufio qui curetur. | 290 | Secundinis expellendis catapo- tium. | 281 |
| Sanguis evulfo calculo quomodo siftendus. | 482 | Securus eft aliquis in his que fape fine periculo evafit. | 49 |
| Sanguinis ex membrana cerebri profluvio coercendo. | 273 | Seminis profufio. | 235 |
| Sanguis jugulati gladiatoris epilepfie medetur. | 174 | Senes aflate optime valent. | 46 |
| Sanguis fuga fi epota fit quid agendum. | 314 | Senectus longis morbis patet. | 43 |
| Saniei natura. | 288 | Senam morbi. | 47 |
| Sanies mala. | 289 | Senes cancro, theriomate fa- cile corripuntur. | 319. Sa- cro igne. |
| | | | 321 |
| | | Septi tranfverfi percuffi nota. | 288 |
| | | Septi tranfverfi fiflula. | 412 |
| | | Σνωτινά emplafira. | 265 |
| | | Σνωτινά medicamenta. | 467 |
| | | Serpentium jejunorum iclus je- juno maxime nocent. | 319 |
| | | Pp | ber- |

I N D E X

| | | | | | |
|--|---------------|---|----------|---|----------|
| <i>Serpentium morsus quomodo curantur.</i> | 309 | <i>Sputum sanguinis.</i> | 202. | <i>Cura ratio.</i> | 203 |
| <i>Serpentium Italorum ictus curatio.</i> | 312. 313 | <i>Statura longa decora.</i> | | | 43 |
| <i>Sextantis pondus.</i> | 249 | <i>Σταφυλώματα</i> | | <i>curatio.</i> | 431 |
| <i>Siccitas quos morbos generat.</i> | 45 | <i>Στεατόματα.</i> | | | 420 |
| <i>Signa egrotantium bona.</i> | 49 | <i>Sternutamentum bonum.</i> | | | 49 |
| <i>Signa mala.</i> | 50 | <i>Sternutamentum singultum fit.</i> | 69. | <i>Difficile parturienti prodest.</i> | 69 |
| <i>Signa longa valetudinis.</i> | 53 | <i>Sternutamentum bonum lethargicis.</i> | | | 158 |
| <i>Singultus sternutamento finitur.</i> | 69. 76 | <i>ad Sternutamenta excitanda.</i> | | | 274 |
| <i>Singultus frequens hepar inflammatum denotat.</i> | 62 | <i>Stomachus;</i> | 182. 184 | | |
| <i>Smaragdinum emplastrum.</i> | 261 | <i>Stomachi cum vesica consortium.</i> | | | 486 |
| <i>Somnus qui malus.</i> | 51 | <i>Stomachum infirmum quae indigent.</i> | | | 38 |
| <i>Somnus utilis phreniticis.</i> | 151 | <i>Stomachi morbi.</i> | 205. | <i>Cura ratio.</i> | ibid. |
| <i>Somnifera.</i> | 108 | <i>Stomacho quae idoneae.</i> | | | 103. |
| <i>Sonitus ventris bonum signum.</i> | 50 | <i>Quae aliena.</i> | | | 104 |
| <i>Somno arcessendo catapotia.</i> | 278. 279. 280 | <i>Stomacho laborantibus quae agenda.</i> | | | 38 |
| <i>Sosagoras.</i> | 258 | <i>Stomachi percussi signa.</i> | | | 287 |
| <i>Sostratus.</i> | 406. 413. 448 | <i>Struma quae.</i> | 323. | <i>Fatigant medicos. ibid. plerumque resurgunt. ibid. Nascuntur in cervice, alis, &c.</i> | |
| <i>Spatha lignea humero reponendo.</i> | 548 | | 324. | <i>earum curatio.</i> | 324. |
| <i>Specillum oricularium.</i> | 495 | <i>ad Strumas malagmata.</i> | 254. | | 255. 258 |
| <i>Specilli in explorandis calvariae vitiiis usus.</i> | 511. 514 | <i>Succi boni quinam.</i> | | | 101 |
| <i>Spes interdum frustratur.</i> | 57 | <i>Succi mali quinam.</i> | | | 101 |
| <i>Σπυγίς pastillus.</i> | 268 | | | | 102 |
| <i>Spinae descriptio.</i> | 501 | <i>Sudor duobus modis elicitur.</i> | | | 93 |
| <i>Spina luxata insanaibilis.</i> | 547 | <i>Sudatio nervorum vitia curat.</i> | | | ibid. |
| <i>Spina fracta.</i> | 531 | <i>ibid. Quando conducit. ibid.</i> | | | |
| <i>Spirandi difficultas.</i> | 198. | <i>Febriticanti qui detergen-</i> | | | 130 |
| <i>Curatio.</i> | ibid. | <i>aus.</i> | | | |
| <i>Sputum quodnam malum.</i> | 70 | <i>Sudor</i> | | | |
| <i>Sputum quodnam mortem indicat.</i> | 56 | | | | |

R E R U M & V E R B O R U M.

Sudor frigidus quid indicet.

51. 53. 56. 285

Suffusionis oculorum curatio.

433

Suppurationis signa.

410

Suppurationis indicia.

62

Suppuratio variis modis excitatur.

64. 65

Suppurationes tolerabiles.

67

Suppurationes pessimæ quæ intus tendunt.

71

Suppurationum internarum curatio.

181

Sura, os.

507

Surculus quæ tollatur.

305

Surditati biliosa alvus prodest.

70

Suturarum capitis numerus & locus incertus.

499

Sutura Hæpocratem decipientes.

515

Σύνωσις.

344

Συνάχνη. 196. Ως συνάχνη.

ibid.

T.

TAbes. 167. Curatio. 169

Tabem quæ significant. 58

Tabes sequitur suppressionem hæmorrhoidum. 62. Nimias

destillationes. 64

Tabis sputum quomodo esse debeat, febris, alvus. 67

Talorum ossa. 507

Tali luxati Cheirurgia. 556

Telorum ejectio. 415

Temeritas homines sæpe resistit. 138

Tempestatum optima æquales. 42

Temporis in curationibus morborum habenda ratio. 424

Tempus matutinum agris remissus est. 125. Natura

levissimum. ibid.

Tempus meridianum agris gravius. ibid.

Tempus vespertinum pessimum. ibid.

Τερρεσμός. 228. Curatio. ibid.

Tercbrarum descriptio. 510

Terra Eretria. 344

Tertianæ curatio. 143

Testiculorum anatome. 455

Testiculorum inflammatio, durities, tumor, atrophia. 398. 399

Τέτανος. 193. Curatio. 194

Τετραπάραινα. 263

Τετραφάρμακον emplastrum. 228. 262. 396. 399

Tharrius. 159. 165

Themison. 4. 225

Theoxenus. 259

Θηρίωμα. 319. Ejus curatio. 319. 320

Thoracis dolorib. catapot. 280

Tibiz os. 507

Timæus. 274

Τιδύμαλλον, lactuca marina. 245

Τομινὸι dentes. 501

Tonsillarum tumentium curatio 383. Exulceratarum. 384

Tonsillarum induratarum Cheirurgia. 445

Tormina minus periculosa. 69

Tormina intestinerum. 224

Tormina profunt lienosis. 70

Tormina ab atra bile mortifera. 74

Torpor quando perniciosus. 75

Transitus ex loco salubri in gra-

I N D E X

| | | | | | |
|--|--------------|---|------|----------------------|----------|
| <i>gravem tutus non est.</i> | 24 | <i>facilis.</i> | 81. | <i>Febris quando</i> | |
| <i>Ἰποχόροι, pastilli.</i> | 249 | <i>V. S. requirit.</i> | | | 78 |
| <i>Tryphon pater.</i> | 406 | <i>V. S. convenit phreneticis.</i> | 150. | | |
| <i>Tubercula capitis.</i> | 420 | <i>Cachecticis.</i> | 169. | <i>Epilepti-</i> | |
| <i>Tubercula gingivarum.</i> | 387 | <i>cis.</i> | | | 172 |
| <i>Tubercula ex callo orta diffi-</i> | | <i>V. S. Elephantia laborantibus.</i> | | | |
| <i>le sanantur articulosi.</i> | 73 | | 177. | <i>Attonitis.</i> | 177. 178 |
| <i>Tumorum per se ortorum medi-</i> | | <i>Venenorum maxima pars fri-</i> | | | |
| <i>catio.</i> | 407 | <i>gore interimit.</i> | | | 310 |
| <i>Tumoris testiculorum curatio.</i> | | <i>Venenum exsugendum.</i> | | | 309 |
| | 399 | <i>Venti qui optimi.</i> | | | 43 |
| <i>Tunica oculorum.</i> | 432 | <i>Venter sani qualia reddit.</i> | | | 50 |
| <i>Tunica abscessus involvens.</i> | | <i>Ventris fluxus.</i> | 229. | <i>Curatio.</i> | |
| | 408 | | | <i>ibid.</i> | |
| <i>Tussis.</i> | 200. | <i>Ventris varices.</i> | | | 455 |
| <i>Curatio.</i> | 201 | <i>Ventris vulnera tractandi ra-</i> | | | |
| <i>Tussis hydropicis malum se-</i> | | <i>tio.</i> | | | 452 |
| <i>gnum.</i> | 72 | <i>Ventris fistula.</i> | | | 413 |
| <i>Tussis in costarum fractura in-</i> | | <i>Ventriculus.</i> | | | 184 |
| <i>festantis medicina.</i> | 529 | <i>Ventriculi vulnerati nota.</i> | 287 | | |
| <i>ad Tussim catapotium.</i> | 280 | <i>Venus hieme non pernicio-</i> | | | |
| <i>Tympanitidis curatio.</i> | 163. | | | | 33 |
| | 164 | <i>Venus vero tutissima.</i> | | <i>ibid.</i> | |
| V. | | <i>Venus aestate & autumno inu-</i> | | | |
| V <i>Alentissimum quid.</i> | 96 | <i>tilis.</i> | | | 34 |
| <i>Valitudinem adversam</i> | | <i>Venus nervorum dolore labo-</i> | | | |
| <i>futuram quæ denotent.</i> | 48 | <i>rantibus inimica.</i> | | | 39 |
| <i>Valitudinem longam.</i> | 53 | <i>Venus noxia phthificis.</i> | | | 172 |
| <i>Vari quomodo tollantur.</i> | 346 | <i>Epilepticis.</i> | | | 173 |
| <i>Varices ventris.</i> | 455 | <i>Ver saluberrimum est.</i> | | | 42 |
| <i>Varicum curatio.</i> | 495 | <i>Vere quis cibus conveniat.</i> | | | 33 |
| <i>Venarum in temporibus adu-</i> | | <i>Vere qui morbi oriuntur.</i> | | | 43 |
| <i>sio pituitæ oculorum sanan-</i> | | <i>Vertebrae spinæ.</i> | | | 501 |
| <i>da.</i> | 407 | <i>Vesica.</i> | | | 185 |
| <i>Vena quæ incidenda.</i> | 81 | <i>Vesica cum stomacho consortium.</i> | | | 486 |
| <i>Venasectio quæ, & quibus con-</i> | | | | | |
| <i>veniat.</i> | 77 | <i>Vesicæ vitium quibus indicetur.</i> | | | 61 |
| <i>Venasectio quando, quæ &</i> | | | | | |
| <i>quibus conveniat.</i> | 78. 79. | <i>Vesicæ vulnegrata signa.</i> | | | 288 |
| <i>Ubi.</i> | 80. 81. | <i>Vesicarum in palpebris medi-</i> | | | |
| <i>Quo die.</i> | 80. | <i>catio.</i> | | | 421 |
| <i>In febre vehementi jugu-</i> | | <i>Vexa-</i> | | | |
| <i>lare est.</i> | <i>ibid.</i> | | | | |
| <i>Imperitis dif-</i> | | | | | |

RERUM & VERBORUM.

| | | | |
|---|---------------------------|---|--------|
| <i>Vexatorium curatio.</i> | 407 | <i>Ulcerum digitorum.</i> | 403 |
| <i>Vincula iis, quibus calculi evulsi è vesica, non necessaria.</i> | 483 | <i>Ulcera è frigore in pedibus & manibus ortorum curatio.</i> | 323 |
| <i>Vinum quod pueris & senibus conveniat.</i> | 32 | <i>Ulcera hydropicorum non facile sanescunt.</i> | 160 |
| <i>Vinum lenè prodest capite infirmo laboranti.</i> | 35 | <i>Umbilicorum prominentium curatio.</i> | 392 |
| <i>Vinum alvo cità quodnam.</i> | 37 | <i>Umbilici vitii Cheiurgia.</i> | 448 |
| <i>Vinum vulnere inimicissimum.</i> | 295. 299 | <i>Umbilici & secundarum extracilio.</i> | 492 |
| <i>Vinum noxium dentium dolori.</i> | 380 | <i>Uncie pondus.</i> | 249 |
| <i>Virginum catuli.</i> | 481 | <i>Unctio confert corpori.</i> | 88 |
| <i>Viride emplastrum.</i> | 262. 264 | <i>Uncus infanti mortuo educendo.</i> | 491 |
| <i>Viscerum morbi.</i> | 211 | <i>Unguium ortus.</i> | 506 |
| <i>Viscera vulnerata propriam exigunt curationem.</i> | 295 | <i>Ungues pallidi mortem indicant.</i> | 55 |
| <i>Vita otiosa inutilis.</i> | 25 | <i>Unguium scabrorum curatio.</i> | 404 |
| <i>Vitiliginis species variae.</i> | 341 | <i>Unguis oculorum.</i> | 423 |
| <i>Ulcus vetusti orae livent.</i> | 300 | <i>Voci adjuvanda catapotium.</i> | 281 |
| <i>Ulcus vetus quomodo curandum.</i> | 301 | <i>Vomica hepatis.</i> | 215 |
| <i>Ulcus aridum mortis indicium.</i> | 55 | <i>Vomitus rejectus ab Asclepiade.</i> | 29 |
| <i>Ulcus implentia.</i> | 247 | <i>Vomitus quando utilis.</i> | ibid. |
| <i>Ulcerebus crustas inducentia.</i> | 246. Easdem resolutentia. | <i>Vomitus quibus inutilis.</i> | ibid. |
| | ibid. | <i>Vomitum quid exigit.</i> | ibid. |
| <i>Ulcerebus purgandis & implendis ἐγχεῖσθαι.</i> | 277 | <i>Vomitus quibus utilis.</i> | 30 |
| <i>Ulcerebus sordidis pastillus.</i> | 269 | <i>Vomitus luxuriæ causa fieri non debet.</i> | ibid. |
| <i>ad Ulcera mala, malagma.</i> | 255 | <i>Vomitus non sit quotidianus.</i> | ibid. |
| <i>Ulcerum gingivarum.</i> | 388 | <i>Vomitibus remedia.</i> | ibid. |
| <i>Ulcera oris medicatio.</i> | 385 | <i>Vomitibus supprimit dejectiones.</i> | 69 |
| <i>Ulcus circa fauces quibus indicatur.</i> | 60 | <i>Vomitibus prodest biliosis.</i> | 87. E- |
| <i>Ulcerebus faucium purgandis catapotium.</i> | 280 | <i>pileptici. ibid. Nocet sanis.</i> | ibid. |
| <i>Ulcerum linguae.</i> | 387 | | |

I N D E X &c.

| | | | |
|---|-------|---|------------|
| <i>Vomitus infirmo capite laboranti alienus est.</i> | 35 | <i>Vulnera insanabilia.</i> | 283. diff- |
| <i>Vomitus biliosus noxius vulnerato.</i> | 296 | <i>ficilia. ibid. tutiora.</i> | 284 |
| <i>post Vomitum quid agendum.</i> | 30 | <i>Vulnera, quibus ossa loco mo-</i> | |
| <i>Ureteres.</i> | 185 | <i>ventur, periculosa.</i> | 557 |
| <i>Urina sani qualis.</i> | 50 | <i>Vulneris nota.</i> | 295. 296 |
| <i>Urina mala.</i> | 52 | <i>Vulneris curatio.</i> | ibid. |
| <i>Urina bona quanam, vesicæ morbo.</i> | 66 | <i>Vulneris derafi curatio.</i> | 305 |
| <i>Urina quæ Valetudinem longam indicet. 53. quæ Mor-</i> | 56 | <i>Vulneris ligatio.</i> | 294 |
| <i>tem.</i> | | <i>Vulneris glutinatio.</i> | 291. 292 |
| <i>Urina crassa & alba articulo-</i> | | <i>Vulnus glutinantia.</i> | 242 |
| <i>rum & viscerum dolores in-</i> | 60 | <i>Vulneribus glutinandis pastilli.</i> | 268 |
| <i>dicat.</i> | | <i>Vulnus quomodo purgandum.</i> | |
| <i>Urina viridis, viscerum dolo-</i> | 60 | <i>298. implendum.</i> | 299 |
| <i>res & tumorem indicat.</i> | | <i>Vulnus aperientia. 243. pur-</i> | |
| <i>Urina purulenta vel sanguino-</i> | | <i>gantia. ibid. rodentia.</i> | 244 |
| <i>lenta ulcus renum vel vesicæ</i> | ibid. | <i>Vulnorum inflammationis cu-</i> | |
| <i>indicat.</i> | | <i>ratio.</i> | 291. 297 |
| <i>Urina crassa, carunculas, pi-</i> | | <i>collisi Vulneris curatio.</i> | 304 |
| <i>los, bullas, malum odorem,</i> | | <i>Vulpinum jecur ac pulmones</i> | |
| <i>arenam habens renum vitia</i> | | <i>asthmatis sanando.</i> | 199 |
| <i>denotat. 60. 61. liquida</i> | | <i>Vulva.</i> | 185 |
| <i>suppurationem.</i> | 63 | <i>Vulvæ natura mirabilis.</i> | 489 |
| <i>Urina alba, rufa quid indicet.</i> | 22 | <i>Vulvæ morbus. 232. Curatio.</i> | ibid. |
| <i>Urinam moventia.</i> | 108 | <i>Vulvæ dolenti catapotium.</i> | 279 |
| <i>Urinæ difficultati sanandæ ca-</i> | | <i>Vulvæ concubitus non admit-</i> | |
| <i>tapotium.</i> | 281 | <i>tentis curatio.</i> | 488 |
| <i>Urinæ nimia profusio.</i> | 234 | <i>Vulvæ procidentia.</i> | 402 |
| <i>æpopuæ vesicæ.</i> | 478 | <i>Vulvæ mollienda pessus.</i> | 270 |
| <i>Uvæ inflammatio.</i> | 389 | <i>Vulvæ percussæ signa.</i> | 286 |
| <i>Uvæ inflammata pastillus.</i> | 269 | X. | |
| <i>Uvæ inflammata excisio.</i> | 445 | <i>Ξ Ηροφδάλμια.</i> | 364 |
| <i>Vulnerato quid agendum.</i> | 295 | Z. | |
| | | Z <i>Eno.</i> | 241 |
| | | <i>Zopyrus.</i> | 275 |
| | | <i>Zurçodes os.</i> | 501 |

F I N I S.









